

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2019 г. N 585н

О КЛАССИФИКАЦИЯХ И КРИТЕРИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

В соответствии с [подпунктом 5.2.105](#) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4, ст. 534; N 23, ст. 3322; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4812; N 43, ст. 6038; N 47, ст. 6659; 2017, N 1, ст. 187; N 7, ст. 1093; N 17, ст. 2581; N 22, ст. 3149; N 28, ст. 4167; 2018, N 10, ст. 1494; N 24, ст. 3530; N 36, ст. 5634; N 46, ст. 7052; N 49, ст. 7600; N 53, ст. 8678; 2019, N 1, ст. 31; N 5, ст. 408; N 21, ст. 2563), приказываю:

1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно [приложению](#).

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40650);

[приказ](#) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. N 346н "О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г., регистрационный N 43018).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

**КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

I. Общие положения

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.

2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления групп инвалидности (категории "ребенок-инвалид").

**II. Классификации основных видов стойких
расстройств функций организма человека, обусловленных
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
и степени их выраженности**

3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, относятся:

а) нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);

б) нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

в) нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);

г) нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);

д) нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;

е) нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

5. Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами:

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с количественными системами оценки, предусмотренными приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям.

Если приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с абзацами третьим - шестым настоящего пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса.

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть выше максимально

выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 процентов.

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий

6. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

- а) способность к самообслуживанию;
- б) способность к самостоятельному передвижению;
- в) способность к ориентации;
- г) способность к общению;
- д) способность контролировать свое поведение;
- е) способность к обучению;
- ж) способность к трудовой деятельности.

7. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека, предусмотренной [пунктом 6](#) настоящих классификаций и критериев:

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены:

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических средств, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу;

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц;

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни:

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных

государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма.

8. Степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.

IV. Критерий для установления инвалидности

9. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка.

V. Критерии для установления групп инвалидности

10. Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критерием для установления инвалидности, предусмотренным [пунктом 9](#) настоящих классификаций и критериев.

11. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

12. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

13. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

14. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

Приложение N 1
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АКТГ - адренокортикотропный гормон;

АХЭП - антихолинэстеразные препараты;

ВК - врачебная комиссия;

ДН - дыхательная недостаточность;

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт;

ИМТ - индекс массы тела;

ЛПИ - лодыжечно-плечевой индекс;

МБТ - микобактерии туберкулеза;

МДС - миелодиспластические синдромы;

МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МСЭ - медико-социальная экспертиза;

НФС - нарушение функции суставов;

ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;

ПНД - психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;

СКФ - скорость клубочковой фильтрации;

СТГ - соматотропный гормон;

ТМО - твердая мозговая оболочка;

ФК - функциональный класс;

ФКУ - фенилкетонурия;

ХБП - хроническая болезнь почек;

ХАН - хроническая артериальная недостаточность;

ХЛВН - хроническая легочно-венозная недостаточность;

ХЛН - хроническая легочная недостаточность;

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;

ХСН - хроническая сердечная недостаточность;

ЦНС - центральная нервная система.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами
1	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I)			A00 - B99		

Примечание к [пункту 1](#). Количественная оценка степени нарушений функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше (дыхательной, других систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы течения (наличия (отсутствия) выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности (наличие множественной или широкой лекарственной устойчивости).

1.1			Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A15 A16		
1.1.1					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы;	Незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса

					МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных. Отсутствие ДН или наличие ДН 1 степени
1.1.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	Умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии). Наличие МБТ+ 6 и более месяцев
1.1.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой	Выраженные нарушения функции дыхательной системы при

					системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы). Наличие ДН II, III степени и ХСН IIА стадии
1.1.4					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы пищеварительной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 530 - 539	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия тяжелых полиорганных осложнений (амилоидоз, декомпенсированное хроническое легочное сердце, полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии
1.2			Туберкулез нервной системы	A17		
			Туберкулез других органов	A18		
			Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких	A19		

1.2.1				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН 1 степени</p>
1.2.2				<p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма,</p>	<p>Умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)</p>

					мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
1.2.3					Нарушения психических, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза при наличии ДН II, III степени, ХСН IIa стадии
1.2.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза

					(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, систем, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце, кахексия и прочее); Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии
1.3			Последствия туберкулеза	B90		
1.3.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799,	Незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. При отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН I степени

					В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
1.3.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН I стадии)
1.3.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и	Выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II III степени, ХСН IIА стадии

					связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
1.3.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН III степени, ХСН ПБ или III стадии
1.4			Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Бессимптомный инфекционный статус	B20 - B24 Z21		
1.4.1					Нарушение функций	Бессимптомный

					<p>системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439</p>	<p>инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая стадия). Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). Количество CD4+ - 350 и более клеток/мкл. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма</p>
1.4.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>ВИЧ - инфекция: Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. Стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные</p>

						нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ более 200 клеток/мкл
1.4.3					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл.</p> <p>Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл</p>
1.4.4					<p>Нарушение функций системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной</p>	<p>ВИЧ - инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ менее 100 клеток/мкл.</p>

					системы и метаболизма; пищеварительной системы; мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Стадия 5 (терминальная). Значительно выраженные нарушения функций организма
2	Новообразования (класс II)			C00 - D48		

Примечание к [пункту 2](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при злокачественных новообразованиях при первичном освидетельствовании зависит от клинико-морфологических факторов прогноза, локализации и размера анатомической формы роста (эндофитная, экзофитная, смешанная), темпа роста опухоли и распространения опухоли (Т), наличия и характера лимфатических узлов (N), наличия или отсутствия отдаленных метастазов (M), гистологического строения, степени дифференцировки и злокачественности опухоли (G), стадии опухолевого процесса (клиническая классификация по системе cTNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вмешательства, суTNM - по результатам лучевого, химиолучевого, химиотерапевтического, гормонального лечения). Учитываются также вид и объем проведенного радикального, комбинированного, комплексного и паллиативного (хирургического, лучевая терапия, химиотерапевтического, гормонального лечения) лечения, наличие осложнений, проводимого лечения или противопоказаний к специальному лечению.

При повторном освидетельствовании количественная оценка проводится с учетом степени нарушенных функций организма после проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также проводимого лечения в течение пяти лет.

(в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1		Злокачественные новообразования уточненных локализаций		C00 - C75		
2.1.1			Злокачественные новообразования губы	C00		

2.1.1.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439; В 310 - 399	Рак нижней губы I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (органосохранного хирургического метода лечения), без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.1.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 310 - 399	Рак нижней губы I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения, (хирургические методы лечения на первичном очаге и на лимфатическом коллекторе шеи, при проведении лучевой терапии в случае отказа пациента от хирургических методов лечения) без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.1.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 310 - 399	Рак нижней губы I, II, III стадии (T1,2,3N0,1M0) после проведенного радикального лечения. Локальный рецидив или остаточная опухоль; наличие местных и/или общих осложнений

(пп. 2.1.1.3 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.1.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, психических функций, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 399</p>	<p>Рак нижней губы IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние</p>
2.1.2			<p>Злокачественные новообразования полости рта и глотки (носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки)</p>	C01 - C14		
2.1.2.1					<p>Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 450, В 430 -</p>	<p>Рак полости рта и глотки I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (операция на первичном очаге)</p>

					439, В 510 - 539, В 310 - 399	
(пп. 2.1.2.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.2.2					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399, В 510 - 539	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения (комбинированное или комплексное лечение) без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.2.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399, В 510 - 539	Рак полости рта и ротоглотки (при локализации корень языка, миндалина, мягкое небо, задняя стенка глотки) II, III стадии (T1,2,3N0,1M0) после радикального или паллиативной медицинской помощи; с наличием местных и/или общих осложнений. При наличии неблагоприятных патологических характеристик, в особенности при локализации в области языка или дна полости рта (глубина инвазии опухоли \geq 3 - 4 мм, прорастание опухолью капсулы лимфатического узла,

						положительные края, множественные регионарные метастазы, периневральная/лимфатическая/сосудистая инвазия). Неустраняемая трахеостома
(пп. 2.1.2.3 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.2.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; языковых и речевых функций, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 399	Рак полости рта и глотки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального, паллиативного лечения, генерализации опухолевого процесса; наличием отдаленных метастазов, местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние
2.1.3			Злокачественное новообразование пищевода	C15		
2.1.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак пищевода I стадии (T1N0M0) после

					системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 540 - 559	радикального лечения (при выполнении эндоскопической резекции в пределах слизистой оболочки или подслизистого слоя) без местных и/или общих осложнений
--	--	--	--	--	---	--

(пп. 2.1.3.1 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 540 - 559	Рак пищевода I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Устраняемая гастростома, временное наличие эзофагогастрального зонда
---------	--	--	--	--	--	--

2.1.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак пищевода I, II, III стадии (T1,2,3,4N1,2M0) после радикального лечения (в том числе при комбинированном лечении) при наличии местных и/или общих осложнений. Гастростома, наличие эзофагогастрального зонда
---------	--	--	--	--	--	---

(пп. 2.1.3.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Рак пищевода IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние
---------	--	--	--	--	--	---

					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной систем, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189 В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199	
2.1.4			Злокачественное новообразование желудка	C16		
2.1.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак желудка I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (при выполнении эндоскопической резекции), без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.4.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	Рак желудка I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (при хирургическом методе лечения рака желудка) без местных и/или общих осложнений. Гастрэктомия
(пп. 2.1.4.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						

2.1.4.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак желудка I, II, III стадии (T1,2,3,4N0,1,2,3M0) после радикального, комбинированного или комплексного лечения, наличие местных и/или общих осложнений и последствий лечения
---------	--	--	--	--	---	--

(пп. 2.1.4.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199	Рак желудка IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние
2.1.5			Злокачественное новообразование тонкого кишечника	C17		
			Злокачественное	C18		

			новообразование ободочной кишки Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения	C19		
2.1.5.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак кишечника I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (при органосохранных и функционально-щадящих способах лечения (эндоскопическая резекция слизистой оболочки)
(пп. 2.1.5.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.5.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	Рак кишечника I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сигмостома (устраняемая) Еюностома (устраняемая)
2.1.5.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак кишечника II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного, радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Еюностома, сигмостома

(пп. 2.1.5.3 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.5.4					<p>Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 В 198, В 199</p>	<p>Рак кишечника IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние</p>
2.1.6			<p>Злокачественное новообразование прямой кишки</p>	C20		
2.1.6.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539</p>	<p>Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (в том числе при выполнении хирургического метода лечения методом трансанального полнослойного эндоскопического удаления опухоли)</p>

(пп. 2.1.6.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.6.2				<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539</p>	<p>Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений Сигмостома, еюностома (устраняемая)</p>
2.1.6.3				<p>Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539</p>	<p>Рак прямой кишки I, II, III стадии (T1,2,3,4N0,1,2,3M0) после комбинированного или комплексного радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Сигмостома, еюностома, ректовагинальный свищ</p>

(пп. 2.1.6.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.6.4				<p>Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 -</p>	<p>Рак прямой кишки IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние</p>
---------	--	--	--	--	--

					539, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	
2.1.7			Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	C22		
2.1.7.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения (резекции печени) без местных и общих осложнений с учетом объективной оценки функциональной состоятельности остающейся части печени)

(пп. 2.1.7.1 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.7.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений
2.1.7.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных,	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков IV стадии

					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199	(Т1,2,3,4N1,2,3M0,1), инкурабельное состояние
2.1.8			Злокачественное новообразование желчного пузыря Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей	C23 C24		
2.1.8.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей II, III стадии (Т1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.8.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей I, II, III, IV стадии (Т1,2,3,4N0,1,2M0,1) после комбинированного или

					метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539	комплексного, радикального лечения, наличие общих и/или местных осложнений
(пп. 2.1.8.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.8.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние
2.1.9			Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C25		
2.1.9.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Рак поджелудочной железы I, II, III стадии (Tis1,2,3N0,1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными осложнениями

					<p>функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539</p>	
2.1.9.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199</p>	<p>Рак поджелудочной железы IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние</p>
2.1.10			Злокачественное новообразование гортани	C32		
2.1.10.1					<p>Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной</p>	<p>Рак гортани I, II стадии (T1N0M0G1) после радикального удаления</p>

					системы; языковых и речевых функций МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399	опухоли (хордэктомия)
2.1.10.2					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399	Рак гортани I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального удаления опухоли (резекция гортани) и/или лучевой терапии по радикальной программе без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.10.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.10.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 310 - 399	Рак гортани II, III стадии (T1,2,3N1M0) после радикального лечения (ларингэктомия), наличие местных и/или общих осложнений. Постоянная трахеостома
(пп. 2.1.10.3 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.10.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Рак гортани IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального лечения с рецидивом или генерализации опухолевого процесса, наличием отдаленных метастазов, с наличием местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние

					пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199		
2.1.11			Злокачественное новообразование бронхов и легкого Карцинома in situ	C34 D02.2			
2.1.11.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак бронхов и легкого I стадии (T1,2aN0M0) после радикального хирургического метода лечения (сегментэктомия, лобэктомии, билобэктомии с медиастинальной лимфаденэктомией), без местных и/или общих осложнений	
(пп. 2.1.11.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)							
2.1.11.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429; В 430 - 439	Рак бронхов и легкого I, II стадии (T1,2,3N0,1M0) после комбинированного лечения (сегментэктомия, лобэктомия, билобэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией	в

						<p>сочетании с лучевой или противоопухолевой лекарственной терапией) без местных и/или общих осложнений.</p> <p>Пулumonэктомия (при переосвидетельствовании без признаков снижения кардиореспираторных резервов).</p> <p>Рак легкого I стадии после радикальной лучевой терапии.</p> <p>Рак легкого I стадии при проведении таргетной терапии</p>
--	--	--	--	--	--	---

(пп. 2.1.11.2 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.11.3					<p>Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429; В 430 - 439</p>	<p>Рак бронхов и легкого III стадии (T1,2,3,4N0,1,2,3M0) после комбинированного лечения без местных и/или общих осложнений.</p> <p>Рак бронхов и легкого I - III стадии (T1,2,3,4N0,1,2,3M0) после комбинированного лечения с местными и/или общими осложнениями. Рак легкого II - III стадии после проведения комбинированного лечения (при отказе пациента или по медицинским показаниям от хирургических методов лечения).</p>
----------	--	--	--	--	---	---

						При проведении лечения мелкоклеточного рака легких независимо от стадии заболевания. Пульмонэктомия при снижении кардиореспираторных резервов
(пп. 2.1.11.3 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.11.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 199	Рак легкого IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.12			Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей	C40 - C41		
2.1.12.1					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак кости II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после

					<p>системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199</p>	<p>радикального лечения без местных и/или общих осложнений.</p> <p>Сомнительный прогноз после операции по поводу саркомы Юинга, остеогенной саркомы.</p> <p>При длительном комбинированном или комплексном лечении.</p> <p>При рецидивах и метастазах опухоли.</p> <p>При наличии местных и/или общих осложнений с вовлечением соседних органов</p>
2.1.12.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 -</p>	<p>Прогрессирование заболевания после проведенного радикального лечения.</p> <p>Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах.</p> <p>Инкурабельное состояние.</p> <p>Осложнения после комбинированного или комплексного лечения</p>

					449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199	
2.1.13			Злокачественная меланома кожи	C43		
2.1.13.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849	Меланома кожи I стадии (T1a,1b,2aN0M0) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений

(пп. 2.1.13.1 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.13.2					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849	Меланома кожи I, II стадии (T1a,bN0,1M0) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений
2.1.13.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849	Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N0,1,2,3M0) после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями или локальная лучевая терапия в самостоятельном плане. Наличие местного рецидива на фоне проводимого лечения

(пп. 2.1.13.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.13.4					Нарушения функций	Меланома IV стадии
----------	--	--	--	--	-------------------	--------------------

					<p>системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 810 - 849, В 198, В 199</p>	(T1,2,3,4,N1,2,3M1), инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевого процесса
2.1.14			Меланома глаза	C43.3		
<p>Примечание к подпункту 2.1.14. Количественная оценка нарушенных функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при меланоме в) при повторном освидетельствовании производится с учетом нарушения зрительных функций лучше видящего или единственного глаза в) условиях м переносимой коррекции.</p>						
2.1.14.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229, В 810 - 849</p>	<p>Меланома глаза T1,2N0M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями.</p> <p>Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения при повторном освидетельствовании без местных и/или общих</p>

						осложнений
(пп. 2.1.14.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.14.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229 (зрения), В 810 - 849	Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями
2.1.14.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229 (зрения), В 810 - 849	Меланома глаза (T1,2,3,4N0,1M1) инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевого процесса
2.1.15			Злокачественные новообразования кожи	C44		
2.1.15.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849	Рак кожи I стадии (T1N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.15.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.15.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-	Рак кожи II стадии (T2,3N0M0) после радикального лечения

					сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 810 - 849	комплексного лечения без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.15.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.15.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849	Рак кожи III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения; рецидив, требующий специального лечения. Наличие местных и/или общих осложнений
2.1.15.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849	Рак кожи IV стадии (T1,2,3,4N2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.16			Злокачественные новообразования мягких тканей	C49		
			Новообразование	D48.1		

			неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций Десмоидные фибромы			
2.1.16.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789, В 810 - 849	Саркома мягких тканей II III стадии (T12N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу внескелетной саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, десмоидной фибромы. При длительном комбинированном и/или комплексном лечении. При рецидивах и метастазах опухоли. При наличии общих осложнений с вовлечением соседних органов и структур
2.1.16.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной,	Прогрессирующие заболевание после проведенного лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах. Инкурабельное состояние

					эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
2.1.17			Злокачественное новообразование молочной железы Карцинома in situ молочной железы	C50 D05		
2.1.17.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак молочной железы I стадии (T1N0M0) после радикального лечения (органосохраняющий хирургический метод лечения (секторальная резекция) без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.17.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.17.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и	Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения (мастэктомия) без местных и/или общих осложнений.

					метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849	Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N0,1M0) после двусторонней мастэктомии.
--	--	--	--	--	--	---

(пп. 2.1.17.2 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.17.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 49, В 540 - 559; В 810 - 849	Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1,M0) после радикального лечения (мастэктомия), двусторонней мастэктомии, при наличии медицинских противопоказаний к проведению радикального лечения. Рак молочной железы I, II, III стадии (T1,2,3N0,1M0) после двусторонней мастэктомии. Рак молочной железы II, III стадии (T2,3,4N0,1M0) после радикального лечения, (мастэктомия), наличие местных и/или общих осложнений. Проведение адъювантной противоопухолевой лекарственной терапии в дополнение к хирургическому методу лечения, лучевой терапии
----------	--	--	--	--	---	---

(пп. 2.1.17.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.17.4					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак молочной железы IV (T1,2,3,4N1,2,3M1),
----------	--	--	--	--	--	--

					<p>системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789, В 810 - 849</p>	инкурабельное состояние
2.1.18			<p>Злокачественные новообразования наружных женских половых органов</p> <p>Злокачественные новообразования влагалища</p>	<p>C51.8</p> <p>C52</p>		
2.1.18.1					<p>Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439</p>	<p>Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (при органосохранных и функционально-щадящих способах лечения)</p>

(пп. 2.1.18.1 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.18.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального комбинированного лечения без местных и/или общих осложнений
----------	--	--	--	--	--	--

(пп. 2.1.18.2 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.18.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак наружных женских половых органов, влагалища II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения; наличие местных и/или общих осложнений (неустраняемые урогенитальный, ректовагинальный свищи). Рак наружных женских половых органов, влагалища после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
----------	--	--	--	--	---	---

2.1.18.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и	Рак наружных женских половых органов, влагалища IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
----------	--	--	--	--	--	---

					метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789	
2.1.19			Злокачественное новообразование шейки матки	C53		
			Злокачественное новообразование тела матки	C54		
2.1.19.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения при органосохранных и функционально-щадящих способах лечения (конизация шейки матки с последующим выскабливанием оставшейся части цервикального канала, полости матки)
(пп. 2.1.19.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.19.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2aN0,1M0) после радикального лечения комплексного лечения без

					систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559	местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.19.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.19.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак шейки или тела матки II, III стадии (T1,2a,b,3N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного радикального лечения. Наличие местных и/или общих осложнений (урогенитальный, ректовагинальный свищи)
(пп. 2.1.19.3 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.19.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 -	Рак шейки или тела матки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние

					559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789	
2.1.20			Злокачественные новообразования яичника	C56		
2.1.20.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак яичника II, III стадии (T2,3,N1,2,3M0) после комбинированного или комплексного радикального лечения. Низкодифференцированная опухоль, рецидив, необходимость повторных операций. Наличие местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.20.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.20.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак яичника II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак яичника после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.20.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Рак яичника IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние

					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789	
2.1.21			Злокачественное новообразование полового члена	C60		
2.1.21.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639	Рак полового члена I стадии (T1a-bN0,M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.21.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639	Рак полового члена I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.21.3					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак полового члена II, III стадии (T1a-b,2,3,4N1,2M0)

					системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	после радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений
2.1.21.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак полового члена IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1, инкурабельное состояние
2.1.22			Злокачественное новообразование предстательной железы	C61		
2.1.22.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции;	Рак предстательной железы I - II стадии (T1,2N0,1M0) при динамическом наблюдении с гормональным лечением; после радикального лечения без местных и/или общих

					МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 540 - 559	осложнений
(пп. 2.1.22.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.22.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак предстательной железы II - IV стадии (T1,2,3N1M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Рак предстательной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.22.3					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189 В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В	Рак предстательной железы IV стадии (T1,2,3,4N1M1), инкурабельное состояние

					510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789	
2.1.23			Злокачественные новообразования яичка	С62		
2.1.23.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак яичка I стадии (T1N0M0, SO, SX) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.23.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.23.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак яичка ПА стадии (T1-4N1M0, SO, SX) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений
2.1.23.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	Рак яичка ПА - ШС стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0S1-3) после радикального удаления при наличии местных и/или общих осложнений
2.1.23.4					Нарушения функций	Рак яичка ПА - ШС стадии

					системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679	(Т1,2,3,4N1,2,3M1a-b), инкурабельное состояние
2.1.24			Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки Злокачественное новообразование почечных лоханок	C64 C65		
2.1.24.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак почки (T1N0M0). Рак почечной лоханки (T1N0M0) после радикального лечения, при органосохранных и функционально-щадящих способов лечения (после лапароскопического лечения) без нарушения функции второй почки
(пп. 2.1.24.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.24.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	Рак почки (T1-4N0-1M0). Рак почечной лоханки (T1-2N0M0) после радикального

					мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439; В 610 - 639	лечения, при нарушении функции контрлатеральной ("здоровой") почки без местных и/или общих осложнений
--	--	--	--	--	---	---

(пп. 2.1.24.2 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.24.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 610 - 639	Рак почки (Т1-4N0-1M0) и рак почечной лоханки (Т3-4N0-1M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений; функционирующая контрлатеральная почка, пораженная процессом, который может привести к ухудшению ее функции в будущем, при умеренно выраженных нарушениях функции второй почки
----------	--	--	--	--	---	--

(пп. 2.1.24.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.24.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	Рак почки и почечной лоханки (Т1-4N0-1M1). Рак почечной лоханки (Т3-4N0-3M1), инкурабельное состояние. Нефростома
----------	--	--	--	--	--	---

					функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 710 - 789	
(пп. 2.1.24.4 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.25			Злокачественное новообразование мочевого пузыря	<i>C67</i>		
2.1.25.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак мочевого пузыря I стадии (T1N0M0) после радикального удаления опухоли. Трансуретральная резекция мочевого пузыря и ранней однократной инстилляции противоопухолевого лекарственного препарата
(пп. 2.1.25.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.25.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639	Рак мочевого пузыря I - II стадии (T1,2a,bN0M0) после радикальной резекции мочевого пузыря без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.25.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.25.3					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак мочевого пузыря I - IV стадии (T1,2,3,4N2,3M0)

					<p>системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189</p>	<p>после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Внутрипузырная противоопухолевая лекарственная терапия продолжительностью в течение 1 года или адъювантная внутрипузырная иммунотерапия вакциной БЦЖ (в полной дозе) с поддерживающей терапией 1 год. При первичном освидетельствовании устранимая цистостома и уретерокутанеостома</p>
--	--	--	--	--	---	--

(пп. 2.1.25.3 в ред. [Приказа](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

2.1.25.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 -</p>	<p>Рак мочевого пузыря IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние. Рак мочевого пузыря после не радикального метода лечения. Цистэктомия. Неустранимая цистостома. Неустранимая уретерокутанеостома</p>
----------	--	--	--	--	---	--

					189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639, В 710 - 789	
(пп. 2.1.25.4 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.26			Злокачественное новообразование головного мозга	C71		
			Злокачественное новообразование мозжечка	C71.6		
			Злокачественное новообразование спинного мозга	C72		
2.1.26.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 230 - 249, В 310 - 399, В 430 - 439, В 710 - 789	Опухоли головного и спинного мозга 2 степени злокачественности после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.26.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с	Опухоли головного и спинного мозга 3 степени злокачественности после радикального лечения с

					<p>движением (статодинамических) языковых и речевых, сенсорных, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 230 - 249, В 310 - 399, В 430 - 439, В 710 - 789</p>	<p>наличием местных и/или общих осложнений</p>
2.1.26.3					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых и речевых, сенсорных функций, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 230 - 249, В 310 - 399, В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639; В 710 - 789</p>	<p>Опухоли головного и спинного мозга 4 степени злокачественности после радикального или паллиативного лечения, инкурабельное состояние</p>
2.1.27			Злокачественное новообразование щитовидной железы	C73		

2.1.27.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Рак щитовидной железы I стадии (T1N0M0) (высокодифференцированный рак) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.27.1 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.27.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: В 310 - 399, В 430 - 439, В 540 - 559	Рак щитовидной железы I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения (гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка, субтотальная резекция щитовидной железы или тиреоидэктомия и/или удаление центральной клетчатки на стороне опухоли) без местных и/или общих осложнений
(пп. 2.1.27.2 в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.27.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: В 310 - 399, В 430 - 439, В 540 - 559	Рак щитовидной железы (T2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак щитовидной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.27.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных,	Рак щитовидной железы (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние

					<p>скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639, В 710 - 789</p>	
2.1.28		Злокачественное новообразование надпочечника	Злокачественная феохромоцитома	<p>C74.1 (добавочный код E27.5)</p>	<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 410 - 429, В 450 - 469, В 430 - 439, В 510 - 559, В 610 - 639, В 730 - 749</p>	<p>Злокачественная феохромоцитома IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального, комплексного или комбинированного лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Злокачественная феохромоцитома после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Инкурабельное состояние</p>

2.1.29		Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций		C76 - C80		
2.1.29.1						Метастазы без выявленного первичного очага после радикального лечения
2.1.29.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 310 - 399, В 201 - 229, В 230 - 249, В 199	Метастазы без выявленного первичного очага
2.1.30		Злокачественные		C81 - C96		

		новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей				
2.1.30.1			Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)	C81		
2.1.30.1.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении полной клинико-гематологической ремиссии
2.1.30.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; дыхательной, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 430 - 439, В 440 - 449; В 410 - 429	Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении неполной клинико-гематологической ремиссии с умеренными нарушениями функций организма
2.1.30.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639	Лимфома Ходжкина III, IV стадии на фоне терапии с выраженными нарушениями функций организма. Лимфома Ходжкина II стадии при наличии осложнений терапии с выраженными нарушениями функций организма
2.1.30.1.4					Нарушения психических функций, функции системы	Лимфома Ходжкина IV стадии, резистентная к

					<p>крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	<p>лечению Трансформация в другое лимфо/миелопролиферативное заболевание. Значительно выраженные нарушения функций организма</p>
2.1.30.2			<p>Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома</p> <p>Диффузная неходжкинская лимфома</p> <p>Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы</p> <p>Другие уточненные типы Т/НК-клеточной лимфомы</p> <p>Макроглобулинемия Вальденстрема</p>	<p>C82</p> <p>C83</p> <p>C85</p> <p>C86</p> <p>C88.0</p>		
2.1.30.2.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной</p>	<p>При первичном освидетельствовании - неходжкинская лимфома любой стадии</p>

					систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	
2.1.30.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	При первичном освидетельствовании - прогрессия неходжкинских лимфом на фоне терапии со значительно выраженными нарушениями функций крови и иммунной системы, других функций организма
Повторное освидетельствование						
2.1.30.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	Неходжкинские лимфомы I, II, III стадии, при отсутствии прогрессирования заболевания или при достижении длительной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма
2.1.30.2.4					Нарушения функций	Неходжкинские лимфомы I,

					<p>системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>II, III, IV стадии с прогрессированием на фоне терапии. Выраженные нарушения функций организма</p>
2.1.30.2.5					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189</p>	<p>Прогрессирующие неходжкинские лимфомы со значительно выраженными нарушениями функций организма</p>
2.1.30.3			Множественная миелома	C90		

			и злокачественные плазмноклеточные новообразования			
2.1.30.3.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При первичном освидетельствовании - латентная, индолентная, вялотекущая формы на фоне проводимого лечения
2.1.30.3.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При первичном освидетельствовании множественная миелома любой стадии
Повторное освидетельствование						
					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789	Множественная миелома I, II, III стадии с наличием умеренных нарушений функций организма

2.1.30.3.3				<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559; В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Множественная миелома I, II, III стадии с наличием выраженных нарушений функций организма. Миеломная болезнь любой стадии, резистентная к терапии с умеренными или выраженными нарушениями функций</p>
2.1.30.3.4				<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p>	<p>Множественная миелома I, II или III стадии, резистентная к лечению; наличие значительно выраженных нарушений функций организма. Прогрессирование основного заболевания; наличие осложнений</p>

					МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789	
2.1.30.4			Хронический лимфоидный (лимфолейкоз)	лейкоз	C91.1 C91.4 - 9	
2.1.30.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз 0-I стадии по Rai (или стадия А по Binet), требующая динамического наблюдения при отсутствии необходимости в терапии
2.1.30.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 -	При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз II стадии по Rai (или стадия А по Binet) - осложнения от проводимой терапии в виде умеренных нарушений функций организма

					429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789	
2.1.30.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789	При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз III и IV стадии по Rai (или стадия В и С по Binet) после проведенной индукционной терапии при достижении ремиссии с возникновением рецидива; резистентная форма заболевания
2.1.30.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	При первичном освидетельствовании - осложнения со значительно выраженными нарушениями функций организма (значительно выраженные нарушения костно-мозгового кроветворения); терминальная стадия заболевания

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789	
Повторное освидетельствование						
2.1.30.4.5					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Достижение полной клинико-гематологической ремиссии продолжительностью не менее 1 года. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
2.1.30.4.6					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	При достижении полной или частичной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма. Хронический лимфолейкоз II или III стадии по Rai (стадия A или B по Binet), медленно прогрессирующего течения; умеренные нарушения функции организма

					МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	
2.1.30.4.7					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Отсутствие клинической ремиссии с высоким риском возможной трансформации в прогрессирующую и бластную фазу Хронический лимфолейкоз прогрессирующего течения; резистентность к терапии. Осложнения терапии и/или поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций организма
2.1.30.4.8					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения	Хронический лимфолейкоз IV стадии, резистентный к терапии. Хронический лимфолейкоз со значительно выраженными нарушениями функций организма.

					<p>функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>Опухолевая прогрессия, трансформация в другие лимфо/миелопролиферативные заболевания</p>
2.1.30.5			<p>Хронический миелоидный лейкоз (миелолейкоз).</p> <p>Моноцитарный лейкоз</p> <p>Другой лейкоз уточненного клеточного типа</p> <p>Лейкоз неуточненного клеточного типа</p> <p>Другой миелоидный лейкоз</p>	<p>C92.1</p> <p>C93</p> <p>C94</p> <p>C95</p> <p>C92.7</p>		
2.1.30.5.1						<p>При первичном освидетельствовании хронический миелолейкоз любой стадии на период лечения</p>

Повторное освидетельствование

2.1.30.5.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Хронический миелолейкоз при достижении полной клинико-гематологической, цитогенетической и молекулярной ремиссии; отсутствие или незначительные нарушения функций организма
2.1.30.5.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639	Хронический миелолейкоз при достижении клинико-гематологической ремиссии; умеренные нарушения функций организма
2.1.30.5.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639	Хронический миелолейкоз при отсутствии клинико-гематологической ремиссии; выраженные нарушения функций организма
2.1.30.5.5					Нарушения функций	Хронический миелолейкоз в

					<p>системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789, В 198, В 199</p>	<p>стадии акселерации или властного криза. Хронический миелолейкоз со значительно выраженными нарушениями функций организма</p>
2.1.30.6			<p>Острый миелобластный лейкоз</p> <p>Острый лимфобластный лейкоз</p> <p>Острый промиелоцитарный лейкоз</p> <p>Острый миеломоноцитарный лейкоз</p> <p>Острый миелоидный лейкоз с 11q23-</p>	<p>C92.0</p> <p>C91.0</p> <p>C92.4</p> <p>C92.5</p> <p>C92.6</p>		

			аномалией			
			Другой миелоидный лейкоз	C92.7		
			Острый миелоидный лейкоз с многолинейной дисплазией	C92.8		
			Миелоидный лейкоз неуточненный	C92.9		
2.1.30.6.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Острый лейкоз в развернутой стадии. Терминальная стадия острого лейкоза с полиорганной недостаточностью, резистентной к терапии, значительно выраженными нарушениями функций организма
2.1.30.6.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций	Острый лейкоз после проведенной индукционной терапии при достижении

					сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	полной клинико-гематологической ремиссии при наличии осложнений лечения и/или выраженных нарушениях функций организма
2.1.30.6.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	Острый лейкоз при достижении полной клинико-гематологической ремиссии с наличием осложнений терапии и/или умеренными нарушениями функций организма
2.1.30.7			Миелодиспластические синдромы (МДС)	D46		
2.1.30.7.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Латентная, вялотекущая, индолентная формы МДС без признаков прогрессирования с незначительными нарушениями функций организма

2.1.30.7.2				<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>МДС с умеренными нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии</p>
2.1.30.7.3				<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>МДС с выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии</p>
2.1.30.7.4				<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,</p>	<p>МДС высокого риска; терминальная стадия заболевания, со значительно выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы, трансформация в острый лейкоз</p>

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	
2.1.30.8			Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций	C97		
(пп. 2.1.30.8 введен Приказом Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.30.8.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 -	Синхронный (возникший одновременно) и метахромный (возникший последовательно через 6 месяцев после радикального лечения первичной опухоли) рак после радикального лечения

					789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 310 - 399, В 201 - 229, В 230 - 249, В 199	
(пп. 2.1.30.8.1 введен Приказом Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.1.30.8.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 310 - 399, В 201 - 229, В 230 - 249, В 199	Синхронный и метахромный рак прогрессирование основного заболевания
(пп. 2.1.30.8.2 введен Приказом Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)						
2.2			Доброкачественные новообразования	D00 - D48		

			Доброкачественные новообразования мозговых оболочек	D32		
			Доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС	D33		
			Опухоль гипофиза	D35.2		
2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849	Доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и/или органов; гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли

2.2.2				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с воздействием на положение и функцию смежных структур, гормонально активные опухоли, приводящие к умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма</p>
2.2.3				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной,</p>	<p>Доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при: быстром росте опухоли с выраженным воздействием на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее удаления;</p>

					пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849	гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма
2.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 -	Доброкачественные опухоли головного и спинного мозга при невозможности радикального хирургического лечения или после проведенного хирургического лечения со значительно выраженными нарушениями функций организма

					299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849	
2.2.5		Доброкачественное новообразование надпочечника	Доброкачественная феохромоцитома/Альдостерома	D35.0		
2.2.5.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 450 - 4469, В 510 - 559, В 730 - 749	Доброкачественная феохромоцитома/альдостерома после радикального лечения без первичной надпочечниковой недостаточности
2.2.5.2					Нарушение функции сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, мочевыделительных и двигательных функций, МКФ: В 410 - 429, В 450 - 469, В 510 - 559, В 730 - 749, В 750 - 789, В 610 - 639	Доброкачественная феохромоцитома/альдостерома после радикального лечения с развитием первичной надпочечниковой недостаточности
3	Болезни крови,					

	<p>кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представленная в других классах болезней</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Примечание к [пункту 3](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций крови, кроветворных органов и иммунной системы организмов обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования); частоты и тяжести кризов; наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритически жизнеугрожающие), от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии, наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения функции других органов и систем организма; прогноза заболевания.

3.1		<p>Другие болезни крови и кроветворных органов</p>		D70 - D77		
3.1.1			<p>Гипоспленизм. Врожденные аномалии селезенки - аспления</p>	<p>D73.0 Q89.0</p>		

3.1.1.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки
3.1.2			<p>Агранулоцитоз (наследственная нейтропения)</p> <p>Иммунодефициты преимущественной недостаточностью антител</p> <p>Комбинированные иммунодефициты</p> <p>Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами</p> <p>Обычный переменный иммунодефицит</p> <p>Другие иммунодефициты</p> <p>Дефект в системе комплемента</p>	<p>D70</p> <p>D80</p> <p>D81</p> <p>D82</p> <p>D83</p> <p>D84</p> <p>D84.1</p>		
3.1.2.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При отсутствии осложнений после проведенного эффективного лечения и достижения стойкой длительной (6 и более месяцев) ремиссии
3.1.2.2					Нарушения функций	Рецидивирующее течение

					системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639	заболевания, наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.1.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639	Непрерывно рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2		Гемолитические анемии Серповидно-клеточные нарушения Апластические и другие анемии		D55 - D59 D57 D60 - D64		
3.2.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной	Легкая форма анемии при отсутствии нарушений (клинико-гематологическая ремиссия) либо с

					системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450	незначительными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450	Средне-тяжелая форма анемии с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450	Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450	Анемии, резистентные к терапии. Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии со значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.3			Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга)	Z94.8		

Первичное освидетельствование

3.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	После аллогенной трансплантации костного мозга на срок 2 года
Повторное освидетельствование (через 2 года после трансплантации костного мозга)						
3.3.2					Нарушения функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	При наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
3.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной,	При наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма

					эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	
3.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	При наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
3.4		Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		D65 - D69		
3.4.1			Наследственный дефицит	D66		

		<p>фактора VIII (гемофилия А)</p> <p>Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия В)</p> <p>Болезнь Виллебранда</p> <p>Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия С)</p> <p>Наследственный дефицит фактора I (фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинемия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII (стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стьюарта-Прауэра); наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего); дисфибриногенемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена</p>	<p>D67</p> <p>D68.0</p> <p>D68.1</p> <p>D68.2</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами</p> <p>Ингибиторы к факторам свертывания крови</p> <p>Приобретенный дефицит фактора свертывания</p> <p>Различные комбинации врожденного дефицита II, VII, IX и X факторов свертывания</p>	<p>D68.3</p> <p>D68.4</p>		
3.4.1.1					<p>Нарушение функции системы крови и иммунной системы;</p> <p>МКФ: В 430 - 439</p>	<p>Легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы; нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью (при оперативных</p>

						<p>вмешательствах или травмах); для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента)</p>
3.4.1.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189</p>	<p>Легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующих заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента)</p>
3.4.1.3					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных,</p>	<p>Среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с повторными (более 3 раз в</p>

					<p>скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189</p>	<p>год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год;</p> <p>наличие хронического синовита и/или артропатии одного крупного сустава; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX 1 - 2% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента); регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической и гемостатической целью</p>
3.4.1.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной,</p>	<p>Тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы</p>

					<p>эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189</p>	<p>и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутрочерепного кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений;</p> <p>признаки хронического синовита и/или артропатии более чем одного крупного сустава;</p> <p>для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента);</p> <p>наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ</p>
3.4.2.			<p>Болезнь Виллебранда</p> <p>Качественные дефекты тромбоцитов</p> <p>Тромбастения, болезнь Гланцманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пулов хранения тромбоцитов,</p>	<p>D68.0</p> <p>D69.1</p>		

			<p>дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы</p> <p>Другие первичные тромбоцитопении, МУН9-ассоциированная тромбоцитопения, семейная тромбоцитопения с предрасположенностью к миелодисплазии, синдром "серых" тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопения и другие</p>	D69.4		
3.4.2.1					<p>Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439</p>	<p>Легкая форма заболевания (отсутствие кровотечений или редкие (не более 3 раз в год) кровотечения, не требующие медикаментозной и гемостатической терапии и/или не приводящие к анемизации; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови не требуется</p>
3.4.2.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с</p>	<p>Среднетяжелая форма заболевания с частотой кровотечений (3 - 10 раз в год), либо до 3-х</p>

					<p>движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639; В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>кровотечений, требующих гемостатической терапии и/или госпитализации; хроническая постгеморрагическая анемия средней степени, не требующая заместительной терапии препаратами крови; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови при оперативных вмешательствах/травмах с целью профилактики (купирования) геморрагических эпизодов</p>
3.4.2.3					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 -</p>	<p>Тяжелая форма заболевания с частыми (более 10 раз в год) либо 1 - 3 обильных кровотечений, приводящих к развитию острой постгеморрагической анемии;</p> <p>кровотечения из слизистой оболочки полости рта, макрогематурия, кровоизлияния в суставы/мышцы до 3 раз в год, во внутренние органы 2 раза в год и/или кровотечение из ЖКТ не приведшее к развитию острой или хронической постгеморрагической</p>

					539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	анемии. Использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической или гемостатической целью при оперативных вмешательствах/травмах и/или по другим показаниям
3.4.2.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Тяжелая форма заболевания с частыми (более 3 раз в год) тяжелыми кровотечениями, приводящими к развитию острой постгеморрагической анемии, либо иными жизнеугрожающими кровотечениями
3.4.3.			Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden	D68.5		

			<p>(аномалия фактора V-мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов C и S; мутация гена протромбина</p> <p>Другая тромбофилия;</p> <p>синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта</p>	D68.6		
3.4.3.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функций, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 -</p>	<p>Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)</p>

					539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	
3.4.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики
3.4.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и	Тяжелая форма заболевания с повторными не более 2-х спровоцированных или 1 не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант). И/или требующей вторичной профилактики Или тромбоз любой локализации, приведший к

					<p>метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>ПТФБ.</p> <p>Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, но более 12%</p>
3.4.3.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем 1 случаев идиопатического тромбоза, и/или 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоз эмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма.</p> <p>Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12%</p>
3.4.3.5					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной</p>	<p>Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в</p>

					<p>системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)</p>
3.4.3.6					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 -</p>	<p>Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики</p>

					789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	
3.4.4			<p>Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V- мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов С и S; мутация гена протромбина</p> <p>Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта</p>	D68.5		
				D68.6		
3.4.4.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического

					<p>метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)</p>
3.4.4.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики</p>
3.4.4.3					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной</p>	<p>Тяжелая форма заболевания с повторными случаям</p>

					<p>системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p>	<p>спровоцированного тромбоза (не более двух спровоцированных случаев или однократным случаем не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант) и/или требующий вторичной профилактики тромбоз, или тромбоз любой локализации, приведший к ПТФБ.</p> <p>Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, но более 12%</p>
3.4.4.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439, В 710 -</p>	<p>Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем однократным случаем идиопатического тромбоза, и/или двумя и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза;</p>

					789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12%
4	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, представленная в других классах болезней			E00 - E90		

Примечание к [пункту 4](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при болезнях эндокринных расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевания, клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современного лечения и реабилитации.

4.1		Болезни щитовидной железы		E00 - E07		
		Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после		E89		

		медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках				
--	--	---	--	--	--	--

Примечание к [подпункту 4.1.](#)

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных щитовидной железой, производится с учетом того, что данная патология хорошо поддается лечению современными лекарственными препаратами и не приводит к стойкому нарушению функций организма. К умеренным нарушениям функций организма могут приводить осложнения заболеваний щитовидной железы, оценка выраженности которых проводится только после достижения компенсации основного заболевания.

4.1.1			Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом	E03.0		
			Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.1		
4.1.1.1					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429	незначительные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии
4.1.1.2					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Умеренные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии

					эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429	
4.1.1.3					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429	Выраженные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии
4.1.2			Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	E05		
4.1.2.1					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 198, В 199; В 210 - 229; В 410 - 429, В 540 - 559	Осложнения, приводящие к незначительным нарушениям функций организма
4.1.2.2					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой,	Осложнения, приводящие к умеренным нарушениям функций организм

					эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 198, В 199; В 210 - 229; В 410 - 429, В 540 - 559	
4.1.2.3					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 198, В 199; В 210 - 229; В 410 - 429, В 540 - 559	Осложнения, приводящие к выраженным нарушениям психических, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы
4.2		Сахарный диабет		E10 - E14		
4.2.1			Инсулинзависимый сахарный диабет.	E10		
			Инсулиннезависимый сахарный диабет.	E11		
			Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания.	E12		
			Другие уточненные формы сахарного диабета.	E13		
			Сахарный диабет неуточненный	E14		

Примечание к подпункту 4.2.1.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных сахарным диабетом, основывается на оценке степени выраженности нарушенных функций при верифицированных осложнениях со стороны органов-мишеней: диабетическая нефропатия, ретинопатия, катаракта, неврологические осложнения (диабетическая невропатия), нарушения периферического кровотока (диабетическая ангиопатия, трофическая язва, гангрена), диабетическая остеоартропатия (стопа или сустав Шарко) и прочее.

4.2.1.1					<p>Нарушения сенсорных функций (зрения), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429; В 610 - 639</p>	<p>Сахарный диабет без поражения органов-мишеней (отсутствие осложнений) или при наличии осложнений с незначительным нарушением функций организма: диабетическая нефропатия - ХБП 1, 2 и 3а стадии; диабетическая ретинопатия с острой зрением лучше видящего или единственного глаза коррекцией > 0,3, сужено до 40°; незначительная или умеренная дистальная сенсорная и сенсомоторная полиневропатия; диабетическая ангиопатия с незначительными нарушениями функций организма</p>
4.2.1.2					<p>Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций</p>	<p>Осложнения сахарного диабета с умеренными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 3Б стадии. диабетическая ретинопатия с</p>

					эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429; В 610 - 639	остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией > 0,1 до 0,3; поле зрения - в пределах 20 - 40°; выраженная сенсомоторная невропатия с наличием пареза стоп и/или с нарушением равновесия, и/или с формированием высокого риска развития рецидива язвы стопы; диабетическая ангиопатия с умеренными нарушениями функций организма
4.2.1.3					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	Осложнения сахарного диабета с выраженными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 4 стадии (подготовка к диализу) и ХБП 5 стадии при эффективности диализа и отсутствии его осложнений; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией 0,1 - 0,05; поле зрения - от 10 до 20° диабетическая ангиопатия с выраженными нарушениями функций организма
4.2.1.4					Нарушения психических	Осложнения сахарного

					<p>функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639</p>	<p>диабета со значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней, такие как:</p> <p>диабетическая нефропатия - ХБП 5 стадии, осложнения заместительной почечной терапии;</p> <p>Диабетическая пролиферативная ретинопатия с остротой зрения лучше видящего глаза коррекцией 0,04 и ниже вплоть до слепоты; поле зрения < 10°, диабетическая ангиопатия со значительно выраженными нарушениями функций организма</p>
4.2.2			Сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения (диабетическая ангиопатия, трофическая язва)	E10.5		
4.2.2.1					<p>Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429</p>	<p>Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН 0 или I стадии</p>

4.2.2.2					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429	Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН II стадии
4.2.2.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429	ХАН III стадии с язвенным дефектом после заживления или ампутации на уровне стопы с деформацией и формированием зоны высокого риска рецидива язвы стопы одной конечности
4.2.3			Сахарный диабет с другими уточненными осложнениями (диабетическая нейро-остеоартропатия (Шарко))	E10.6		
4.2.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559	Диабетическая нейроостеоартропатия одной или обеих стоп с незначительными нарушениями статодинамических функций
4.2.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Диабетическая нейроостеоартропатия одной или обеих стоп с умеренными нарушениями

					функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559	статодинамических функций
4.2.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559	Выраженная деформация обеих стоп или одной стопы в сочетании с ампутацией другой стопы с выраженными нарушениями статодинамических функций
4.2.4			Ампутационная культя конечности			
4.2.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559	Ампутационная культя стопы, голени, бедра при отсутствии нарушений на другой конечности
4.2.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 -	Ампутационная культя бедра/голени/стопы одной конечности в сочетании с ХАН II, III стадии или диабетической нейроостеартропатией на другой конечности

					559	
4.2.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559	Ампутационные культы обеих конечностей при невозможности протезирования
4.3		Нарушения других эндокринных желез		E20 - E35		
4.3.1			Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур	E20 E89.2		

Примечание к подпункту 4.3.1.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гипопаратиреозе зависит от частоты и тяжести (судорожных сокращений скелетных мышц, дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).

4.3.1.1					Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма,	Незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких тетаний преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных изменений показателей
---------	--	--	--	--	--	---

					мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 610 - 639	фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара)
4.3.1.2					Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевого выделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 610 - 639	Умеренные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара)
4.3.2			Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы	E21		

Примечание к подпункту 4.3.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гиперпаратиреозе зависит от нарушения опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остео дистрофия, деформации костей, патологические переломы), а также от нарушений мочевой функции (проявления нефролитиаза, нефрокальциноза), функции пищеварительной системы.

4.3.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Нормокальциемическая и мягкая форма гиперпаратиреоза без клинических проявлений либо с незначительными нарушениями функций
---------	--	--	--	--	---	--

					метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	организма
4.3.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	Манифестная форма гиперпаратиреоза с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
4.3.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639	Манифестная форма гиперпаратиреоза с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
4.3.3		Гиперфункция гипофиза		E22		
4.3.3.1			Акромегалия	и E22.0		

			гипофизарный гигантизм			
4.3.3.1.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) легкого течения с незначительными нарушениями функций организма
4.3.3.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения с умеренными нарушениями функций организма
4.3.3.1.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения с выраженными нарушениями функций организма

					эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	
4.3.4		Гипофункция и другие нарушения гипофиза.		E23		
4.3.4.1			Гипопитуитаризм	E23.0		
4.3.4.1.1					Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639	Гипогонадотропный гипогонадизм, СТГ-недостаточность без карликовости; пангипопитуитаризм, состояние медикаментозной компенсации или субкомпенсации
4.3.4.1.2					Нарушения психических функций, сенсорных функций,	СТГ-недостаточность с карликовостью;

					<p>функций, нарушения функций, нарушения функций нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	пангипопитуитаризм с умеренно выраженными нарушениями функций организма
4.3.5			<p>Несахарный диабет.</p> <p>Нефрогенный несахарный диабет</p>	<p>E23.2</p> <p>N25.1</p>		
4.3.5.1					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	Несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фоне проводимой терапии

4.3.5.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849	Умеренные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии
4.3.6			Синдром и болезнь Иценко-Кушинга	E24		

Примечание к подпункту 4.3.6.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных с болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести форма), наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, переломы костей, нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические ЦНС, психические нарушения), а также наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.

4.3.6.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции;	Гиперкортицизм с отсутствием или незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии
---------	--	--	--	--	---	---

					МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	
4.3.6.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	Гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии
4.3.6.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующим течением на фоне проводимой терапии; с осложнениями, в том числе от хирургического и/или лучевого лечения опухолей, продуцирующих АКТГ; рецидив заболевания, приводящих к выраженным нарушениям функций организма
4.3.6.4					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующим течением на фоне терапии; с

					<p>функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно- сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639</p>	<p>осложнениями, в том числе от оперативного и/или лучевого лечения опухолей надпочечников или гипофиза; рецидив заболевания, приводящих к значительно выраженным нарушениям функций организма</p>
4.3.7			Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0		
4.3.7.1					<p>Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559</p>	<p>Недостаточность функции надпочечников без нарушений функций или с незначительными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии</p>
4.3.7.2					<p>Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559</p>	<p>Недостаточность функции надпочечников с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии</p>
4.3.7.3					<p>Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p>	<p>Недостаточность функции надпочечников с выраженными нарушениями функций организма</p>

					функций; МКФ: В 540 - 559, В 710 - 789	
4.3.8			Гиперальдостеронизм	E26		
4.3.8.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429	Гиперальдостеронизм с незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургической)
4.3.8.2					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 710 - 789	Гиперальдостеронизм с умеренными нарушениями функции организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
4.3.8.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 710 - 789	Гиперальдостеронизм с выраженными нарушениями функции организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
4.3.9		Другие нарушения		E27		

		надпочечников		E31		
		Полигландулярная дисфункция				
<p>Примечание к подпункту 4.3.9.</p> <p>Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при полигландулярной дисфункции и надпочечниковой недостаточности зависит от прогрессивного характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида органов системы организма, вовлеченных в патологический процесс), вида и степени нарушенных функций организма: сенсорных (снижение остроты зрения, слепота), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем, а также от наличия осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания и эффективности проводимой терапии.</p>						
4.3.9.1			Первичная надпочечниковая недостаточность	E27.1		
			Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	E31.0		
			Полигландулярная гиперфункция	E31.1		
4.3.9.1.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма,	Отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма

					<p>мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	
4.3.9.1.2					<p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического)</p>
4.3.9.1.3					<p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций</p>	<p>Выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или наличия осложнений со стороны органа и/или системы, вовлеченной в</p>

					пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	синдром
4.4		Ожирение и другие виды избыточности питания		E65 - 68		
4.4.1			Морбидное ожирение	E66.0 E67.8		
4.4.1.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559	Ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма

4.4.1.2				<p>Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559</p>	<p>Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с умеренными нарушениями функций организма</p>
4.4.1.3				<p>Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559</p>	<p>Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с выраженными нарушениями функций организма</p>
4.4.1.4				<p>Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы,</p>	<p>Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании со значительно выраженными нарушениями функций организма</p>

					эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559	
4.5		Нарушения обмена веществ		E70 - E90		
4.5.1			Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.0 E70.1		

Примечание к подпункту 4.5.1.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных фенилкетонурией, основывается на определении степени выраженности сформированных в детском возрасте стойких нарушений психических функций, а также учитывается течение заболевания, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина и прогноз.

4.5.1.1			Фенилкетонурия легкая (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая (10 - 20 мг/дл) форма Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1		
4.5.1.1.1					Нарушение психических функций	При наличии

					функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189;	незначительных нарушений функций организма: незначительное когнитивное снижение; незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 баллов)
4.5.1.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189,	При наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное снижение; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50 - 64 баллов)
4.5.1.1.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 310 - 340	При наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное когнитивное снижение; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов)
4.5.1.1.4					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189	При наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 35 баллов)
4.5.2			Нарушение обмена ароматических аминокислот	E70		
			Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и	E71		

			<p>обмена жирных кислот: болезнь "кленового сиропа" (лейциноз), изовалериановая, метилмалоновая, пропионовая ацидемия и другие</p> <p>Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Тони) (-Дебре), болезнь Хартнупа, синдром Лоу, глютарикацидурия, гомоцистинурия и другие</p> <p>Другие нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия и другие</p> <p>Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов: болезнь Фабри, Тея-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая лейкодистрофия; недостаточность сульфатазы)</p> <p>Нарушения обмена глюкозаминогликанов (мукополисахаридозы I,</p>	<p>E72</p> <p>E74</p> <p>E75</p> <p>E76</p>		
--	--	--	---	---	--	--

			II, III, IV, VI, VII типов)			
			Нарушение обмена гликопротеинов	E77		
			Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии	E78		
			Нарушения обмена пуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихена, ксантинурия	E79		
			Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглера-Найяра, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла)	E80		
			Нарушение минерального обмена (болезнь Вильсона-Коновалова, гепатолентикулярная дегенерация)	E83		

Примечание к [подпункту 4.5.2.](#)

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при редких орфанных заболеваниях обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов и других, основывается на показателях нервно-психического, физического и речевого развития, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное или рецидивирующее), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, прогнозом заболевания.

4.5.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных,	Прогредиентное течение заболевания, частично компенсируемое
---------	--	--	--	--	---	---

					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399; В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799; В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	<p>патогенетической терапией, при наличии незначительных нарушений функций организма</p>
4.5.2.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799; В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	<p>Кризовое или прогрессирующее течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии умеренных нарушений функций организма</p>

4.5.2.3				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	<p>Кризовое или прогрессивное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма</p>
4.5.2.4				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399; В 210 -</p>	<p>Кризовое или прогрессивное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии значительных нарушений функций организма</p>

					279, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639	
4.5.3			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с легочными проявлениями	E84.0		
			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с комбинированными проявлениями)	E84.1		
			Кистозный фиброз неуточненный	E84.9		

Примечание к подпункту 4.5.3.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных муковисцидозом, основывается на фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также на наличии осложнений.

4.5.3.1					Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559	Формы заболевания без клинической симптоматики или легкое течение заболевания с незначительными нарушениями функции дыхательной и пищеварительной систем
4.5.3.2					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы,	Среднетяжелая форма заболевания с умеренными нарушениями функций организма, первичный или интермитирующий высев: Р.

					эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	aeruginosa, В. ceracia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактериями, грибами рода Aspergillus и других микробных патогенов, синдром потери соли, хроническая панкреатическая недостаточность, острый и рецидивирующий панкреатит, синдром дистальной интестинальной обструкции, кровохарканье, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность
4.5.3.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 -	Тяжелая форма заболевания с выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических инфекционных осложнений, вызванных: P. aeruginosa, В. ceracia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными

					439, В 540 - 559, В 110 - 139, В 140 - 189	микобактерии, грибами рода <i>Aspergillus</i> и другими микробными патогенами, повторный синдром потери соли или синдром дистальной интестинальной обструкции, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферментах (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира), частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс
4.5.3.4					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 -	Хроническая дыхательная недостаточность с кислородозависимостью, ОФВ ₁ < 30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания трансплантации легких или печени

					449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 139, В 140 - 189	
5	Психические расстройства и расстройства поведения (класс V)			F00 - F99		

Примечание к [пункту 5](#).

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, основывается преимущественно на оценке типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также особенности течения заболевания, его стадия и прогноз, тяжесть осложнений, наличие и особенности патопластического фона, включая преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.1		Нарушения психологического развития		F80 - F89		
5.1.1.			Общие расстройства психологического развития	F84		
			Детский аутизм	F84.0		
			Атипичный аутизм	F84.1		
			Синдром Ретта.	F84.2		
			Синдром Аспергера	F84.5		

Примечание к [подпункту 5.1.1](#).

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при расстройствах аутистического спектра различного генеза основывается преимущественно на анализе степени дефицита социальной коммуникации (аутистическая отрешенность, замещение, тормозимость, снижение, вплоть до полного отсутствия социальной активности), выраженности и стойкости имеющейся симптоматики и нарушений поведения (фобии и аффективные методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, с

увлечения, патологические фантазии, "феномен тождества" или требование неизменности, постоянства; агрессивность, включая аутоагрессию). У также характер и выраженность специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, когнитивного снижения, психопатических расстройств (кататонических, пароксизмальных и подобных), а также состояние компенсаторных механизмов и адаптации в основной жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.1.1.1					<p>Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399</p>	<p>Взрослый самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения, особенно в новых социальных контактах (нервозность, робость, тормозимость). Нет активного избегания взгляда. "Поведенческий сценарий": сохранение постоянства среды за счет формирования штампов - образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер, появляются только в ситуации тревоги. Речевые навыки сформированы, в речи возможны единичные эхолалии, стереотипии, речевые "штампы". Коммуникативная функция речи сохранена. Интеллект не снижен либо снижен незначительно (IQ =</p>
---------	--	--	--	--	---	--

						65 - 69 баллов). В целом социально адаптирован, но нуждается в индивидуальном подходе, при необходимости - в социальном сопровождении
5.1.1.2					Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Взрослый самостоятельно устанавливает лишь минимальный контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во время контакта - повышенный уровень нервозности и боязни. Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта. "Поведенческий сценарий": допускаются минимальные нарушения стереотипа общения, формируются сложные виды аффективной защиты (патологические увлечения, компенсаторные фантазии, лишенные социальной направленности). Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются умеренные специфические нарушения речи (речь "штампованная", "стереотипная"). Интеллект не снижен либо снижен от незначительной

						до умеренной степени (IQ = 50 - 69 баллов). Испытывает существенные трудности адаптации в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в периодическом социальном сопровождении
5.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Взрослый самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лишь кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контакта. "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; характерны выраженные фобии. Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются выраженные специфические нарушения речи. Интеллект - выраженное снижение (IQ = 35 - 49 баллов). Возможно нарушение функции тазовых органов. Частичная дезадаптация в основных сферах

						жизнедеятельности, нуждается в постоянном социальном сопровождении
5.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Отсутствие визуального и вербального контакта, привлечь внимание невозможно. "Поведенческий сценарий": при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома. Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты. Интеллект: значительно выраженное снижение (IQ < 34 баллов). Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов. Полная дезадаптация в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью в постоянном постороннем уходе и надзоре
5.2		Умственная отсталость		F70 - F79		

Примечание к подпункту 5.2.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше граждан в возрасте 18 лет и умственной отсталости основывается на оценке степени интеллектуальной недостаточности, объективизируемой клинически и экспериментально психологически (тест WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale, предназначенный для тестирования лиц от 16 лет и старше); на наличии, клиническом уровне выраженности поведенческих нарушений (конфликтность, агрессивность, асоциальность, делинквентная направленность, аддукция, неусидчивость, моторное беспокойство, негативизм, истерические, отказные реакции и реакции ухода, индифферентность, аутизация и прочее); совокупности психопатологической и соматоневрологической симптоматики (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и др.); на клиническом и социальном прогнозе; на уровне адаптации взрослого в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социальной).

При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения речевых функций. При невозможности или затруднении оценки степени интеллектуальной недостаточности методикой Векслера в связи с отсутствием клинической симптоматики (тяжелые поведенческие расстройства, наличие патологии органов восприятия - зрения и/или слуха) оценка производится клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).

5.2.1			Умственная отсталость легкой степени	F70		
5.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Легкая умственная отсталость (IQ 65 - 69 баллов) при отсутствии либо в сочетании с незначительными расстройствами поведения, соматоневрологическими нарушениями, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Легкая умственная отсталость (IQ 50 - 64 балла) при отсутствии сопутствующей симптоматики; легкая умственная

						отсталость (IQ 50 - 69 баллов) в сочетании с умеренными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Легкая умственная отсталость (IQ 50 - 69 баллов) в сочетании с выраженными стойкими расстройствами поведения с возможностью лишь частичной их коррекции; психическими нарушениями (когнитивными, аффективным и прочими), соматоневрологическими нарушениями, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции тазовых органов
5.2.2			Умственная отсталость умеренная	F71		
					Нарушения психических, языковых и речевых функций;	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) при отсутствии

					МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	сопутствующей симптоматики, либо в сочетании с незначительными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) при отсутствии сопутствующей симптоматики; умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) в сочетании с умеренными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции тазовых органов
5.2.2.2					Нарушения психических,	Умеренная умственная

					<p>языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>отсталость (IQ 35 - 49 баллов) в сочетании с выраженными и значительно выраженными стойкими расстройствами поведения при невозможности их коррекции;</p> <p>психопатологическими нарушениями (затяжными психотическими состояниями, некоррегируемыми аффективными, двигательными нарушениями, расстройствами сферы влечений и иными нарушениями), грубыми соматоневрологическими нарушениями, снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящими к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора</p>
5.2.3			Умственная отсталость тяжелая	F72		
					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной</p>	<p>Тяжелая умственная отсталость (IQ 20 - 34 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах</p>

					функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов
5.2.4			Умственная отсталость глубокая	F73		
5.2.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Глубокая умственная отсталость (IQ < 20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов
5.3		Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства		F20 - F29		

Примечание к подпункту 5.3.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при шизофрении осуществляется преимущественно на анализе клинической формы, типа, темпа течения и стадии развития заболевания, типологии, выраженности и психопатологической симптоматики, этапа, полноты и стойкости ремиссии, характера и выраженности эндогенных изменений личности, объективно клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень компенсаторные возможности личности; состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.3.1			Шизофрения, эпизодический ремитирующий	F20		
-------	--	--	--	-----	--	--

			(рекуррентный) тип течения: кататоническая, недифференцированная, постшизофреническая депрессия, другой тип, неуточненная Шизоаффективное расстройство	F20.2 F20.3 F20.4 F20.8 F20.9 F25		
5.3.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью до 4 месяцев в год; устойчивая ремиссия с незначительной стойкой резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно не влияющей на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 10 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии, существенно затрудняющей

						адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.1.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Затяжные или частые приступы общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии и приводящей к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2			Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом:	F20		
			параноидная	F20.0		
			гебефреническая	F20.1		
			кататоническая	F20.2		
			недифференцированная	F20.3		
			постшизофреническая депрессия	F20.4		
			остаточная (резидуальная)	F20.5		
			другой тип	F20.8		

			неуточненная	F20.9		
5.3.2.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Не более одного приступа в год продолжительностью до 4 месяцев; стойкая ремиссия с незначительными стойкими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренными стабильными или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженными стабильными

						или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Приступ (приступы) общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.3.3			Шизофрения, непрерывный течения: параноидная гебефреническая	тип	F20 F20.0 F20.1	

			кататоническая, недифференцированная, остаточная простая другой тип неуточненная	F20.2 F20.3 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9		
5.3.3.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Незначительные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Умеренные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Выраженные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства,

						эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Значительно выраженные стойкие дефицитные расстройства (шизофреническое слабоумие), эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.3.4			Шизотипическое расстройство	F21		
5.3.4.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Незначительные стойкие дефицитные расстройства, эндогенные изменения личности,

						психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Умеренные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Выраженные стойкие дефицитарные расстройства; эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, резистентные к терапии с отсутствием критики к состоянию, возможным

						снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.4		Расстройства настроения (аффективные расстройства)		F30 - F39		

Примечание к подпункту 5.4.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при аффективных расстройствах (маниакальных, депрессивных, смешанных) основывается преимущественно на анализе их структуры, выраженности и стойкости, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, объективизируемых клинически и экспериментально психологически. Учитываются также преморбидные особенности личности и ее реакция на болезнь, эффективность компенсаторных механизмов критики и адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.4.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Незначительные аффективные расстройства, общей продолжительностью не более 6 месяцев в год, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.4.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Умеренные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год,

						существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.4.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.4.4					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Значительно выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.5		Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства		F40 - F48		

Примечание к подпункту 5.5.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций граждан в возрасте 18 лет и старше при невротических расстройствах преимущественно на анализе их длительности и динамики (реакции, состояние, патологическое развитие личности), типологии, выраженности психопатологической симптоматики, эффективности терапии, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.5.1			<p>Фобические тревожные расстройства F40</p> <p>Другие тревожные расстройства F41</p> <p>Обсессивно-компульсивное расстройство F42</p> <p>Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации F43</p> <p>Диссоциативные (конверсионные) расстройства F44</p> <p>Соматоформные расстройства F45</p> <p>Другие невротические расстройства F48</p>			
5.5.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Невротические реакции или состояния с незначительной симптоматикой невротического круга (неврастенической, фобической, тревожно-депрессивной, обсессивно-компульсивной, истероконверсионной и прочими), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности

5.5.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Невротические состояния с умеренными стойкими расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и прочими), с тенденцией к ипохондризаци, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.5.1.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Невротические состояния с выраженными стойкими и резистентными к терапии расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и прочими), с возможным переходом в патологическое развитие личности, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.5.1.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной	Патологическое развитие личности со значительно выраженной, стойкой и резистентной к терапии

					функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	истероконверсионной симптоматикой (амавроз, псевдопаралич по типу геми- или параплегии, астазия-абазия, псевдодеменция, нарушение функции тазовых органов), с отсутствием критики к состоянию, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.6		Органические, включая симптоматические, психические расстройства		F00 - F09		

Примечание к [подпункту 5.6.](#)

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при церебрально-органической основывается преимущественно на анализе нозологической принадлежности, стадии и типа течения заболевания; структуры, выраженности и психопатологической симптоматики: нарушений со стороны психических процессов (когнитивных и эмоционально-волевых), органических личности, психотических, аффективных, неврозоподобных, пароксизмальных и иных расстройств, объективизируемых клинически и экспериментально психологически. Учитываются также эффективность терапии, клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень компенсаторные возможности личности, состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.6.1			Деменция при болезни Альцгеймера	F00		
			Сосудистая деменция	F01		
			Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках	F02		

			<p>Деменция неуточненная F03</p> <p>Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F04</p> <p>Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью. F06</p> <p>Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга F07</p> <p>Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное F09</p>		
5.6.1.1					<p>Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199</p> <p>Стойкие незначительные и умеренные астенические, незначительные когнитивные, аффективные, неврозоподобные расстройства, органические изменения личности, редкие</p>

						пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня незначительной интеллектуальной недостаточности (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.6.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Стойкие выраженные астенические, умеренные когнитивные, аффективные, невротоподобные, галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, средней частоты пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня умеренной интеллектуальной недостаточности (IQ = 50 - 64 баллов), существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.6.1.3					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 -	Стойкие значительно выраженные астенические, выраженные когнитивные, аффективные, невротоподобные, галлюцинаторные, бредовые

					539, В 610 - 639	расстройства, органические изменения личности, частые пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня выраженной интеллектуальной недостаточности (IQ = 35 - 49 баллов), снижение контроля функции тазовых органов, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.6.1.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Стойкое значительно выраженное снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34) в сочетании с другой психопатологической симптоматикой или без нее, отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.7		Эпизодические и пароксизмальные расстройства		G40 - G47		

Примечание к [подпункту 5.7.](#)

Количественная оценка выраженности нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при эпилепсии и эпи

синдромах основывается на оценке возраста начала заболевания, генеза, локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических приступов; типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремиттирующий и прочее), объема и эффективности противосудорожной терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов должна быть верифицирована в медицинской организации, оценка производится на протяжении календарного года, обязательным условием является проведение противосудорожной терапии.

Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности личностных изменений, обусловленных болезнью, степень психопатологического и патопсихологического уровня реагирования (аффективной (дисфории), психоорганической, психотической, невропатической, психопатоподобной и другой), а также уровень социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, социально-средовой).

5.7.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в 2 месяца и реже; незначительная психопатологическая симптоматика без заметных изменений личности; отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не сказывающиеся на адаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.7.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Легкие приступы (3 - 4 в день) в сочетании с умеренными изменениями личности, умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые приступы - 1 - 2 в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые

						состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; эпилептический статус, серийные приступы - 1 раз в 3 месяца и/или умеренные изменения личности, умеренная патопсихологическая симптоматика; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50 - 64 балла), затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.7.3					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Легкие приступы 5 и более в день при наличии выраженной патопсихологической симптоматики и изменений личности, приводящие к дезадаптации; тяжелые приступы - 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные приступы - 1 раз в 2 месяца и/или выраженная патопсихологическая симптоматика, выраженные изменения личности, симптоматика

						психотического регистра, выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов), нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности (IQ = 35 - 49)
5.7.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Тяжелые припадки - 4 и более в месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или особых состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпистатус в месяц в сочетании со значительно выраженной патопсихологической, психопатологической симптоматикой (в том числе психотического регистра), значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34); отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
6	Болезни нервной				G00 - G99	

	системы (класс VI) и поражения нервной системы, представленные в других классах					
--	---	--	--	--	--	--

Примечание к пункту 6.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гипокинезия, затрудняющих опору и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курбельность пароксизмальных приступов, распространенность патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.

6.1		Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин		T90 - T98		
6.1.1			Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы Последствия цереброваскулярных болезней	T90 G09 I69		
6.1.1.1					Нарушения психических,	Незначительные нарушения

					языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789	статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез; легкий атактический синдром и другие легкие очаговые нарушения; незначительные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций
6.1.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789	Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и другие умеренные очаговые нарушения; умеренные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций
6.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, нарушения	Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез, выраженный парапарез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие выраженные

					мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	очаговые нарушения; выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций; нарушение контроля функции тазовых органов
6.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевого выделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Значительно выраженные нарушения статодинамической функции: значительно выраженный парализ (либо параплегия), значительно выраженный гемипарез (либо плегия); выраженный/значительно выраженный тетрапарез (тетраплегия); значительно выраженная статическая и динамическая атаксия (самостоятельное передвижение невозможно); значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; отсутствие контроля функции тазовых органов. Вегетативное состояние
6.2		Наследственная атаксия		G11		
6.2.1			Врожденная	G11.0		

			<p>непрогрессирующая атаксия</p> <p>Атаксия Фридрейха (ранняя мозжечковая атаксия) G11.01</p> <p>Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК G11.3</p> <p>Другая наследственная атаксия G11.8</p>		
6.2.2				<p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429</p>	<p>Незначительные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; незначительные легкие сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование человека.</p> <p>Незначительные нарушения функций организма</p>
6.2.3				<p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 -</p>	<p>Умеренные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение.</p>

					189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429	Умеренные нарушения функций организма
6.2.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429	Выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных движений). Выраженные нарушения функций организма
6.2.5					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429	Значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организма
6.3			Болезнь Штрюмпелля (наследственная спастическая параплегия) - изолированная и осложненная формы	G11.4		
6.3.1					Нарушения психических,	Легкий парез нижних

					сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799	конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов) без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма
6.3.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799	Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным нарушением способности к передвижению, формирование деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма
6.3.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799	Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма
6.4			Спинальные амиотрофии	G12		
6.4.1					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных,	Периферический легкий тетрапарез, умеренный

					<p>скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций дыхательной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 310 - 340, В 398; В 710 - 789, В 798, В 799, В 440 - 450, В 510 - 539</p>	<p>парапарез и/или умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями функций дыхательной системы</p>
6.4.2					<p>Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398; В 710 - 789, В 798, В 799; В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение функции тазовых органов</p>
6.4.3					<p>Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p>	<p>Генерализация атрофического процесса: значительно выраженный периферический тетрапарез. Тяжелые деформации</p>

					<p>функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 310 - 340, В 398; В 710 - 789, В 798, В 799; В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих значительно выраженной степени. Значительно выраженные бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов</p>
6.5		Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения		G20 - G26		
6.5.1			<p>Болезнь Паркинсона</p> <p>Вторичный паркинсонизм</p> <p>Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках.</p>	<p>G20</p> <p>G21</p> <p>G22</p>		
6.5.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;</p> <p>МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Незначительные, легкие моторные и немоторные симптомы паркинсонизма. 1 и 2 стадии болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 90 - 100%</p>
6.5.3					Нарушения	Умеренные моторные и/или

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	немоторные симптомы паркинсонизма. 3 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 70 - 80%
6.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. Умеренные продолжительные флуктуации и болезненные дискинезии, частично или не контролируемые оптимальной консервативной терапией. 4 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 50 - 60%. На период подбора режима программирования при глубокой стимуляции глубоких структур головного мозга; наличие осложнений после оперативного вмешательства, приводящих к выраженным нарушениям
6.5.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Значительно выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. 5 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 0 - 40%

6.6			<p>Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев</p> <p>Дистония</p> <p>Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения.</p> <p>Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>G23</p> <p>G24</p> <p>G25</p> <p>G26</p>		
6.6.1					<p>Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Легкие фокальные и генерализованные гиперкинезы не изменяющие физиологическое положение тела, общая целенаправленность движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций</p>
6.6.2					<p>Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Умеренные фокальные и генерализованные гиперкинезы, изменяющие физиологическое положение тела и нарушающие последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие</p>

						незначительных/умеренных нарушений психических функций
6.6.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789	Выраженные фокальные и генерализованные гиперкинезы, с нарушением равновесия, последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие умеренных/выраженных нарушений психических функций
6.6.4					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799	Значительно выраженные генерализованные гиперкинезы не контролируемые медикаментозным лечением, с фиксированным патологическим положением тела. Наличие выраженных/значительно выраженных нарушений психических функций
6.7		Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		G35 - G37		
6.7.1			Рассеянный склероз Другая форма острой	G35 G36		

			диссеминированной демиелинизации. Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G37		
6.7.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398 - 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе - по данным МРТ. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма (включая легкие атактические нарушения) в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.7.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398 - 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 -	Умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения; умеренные атактические нарушения, частичная атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями сенсорных функций; умеренные нарушения функций тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС

					539, В 610 - 639	
6.7.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398 - 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения; выраженные атактические нарушения, нарушение контроля функции тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.7.1.4					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей; значительно выраженные бульбарные нарушения, атактические нарушения, отсутствие контроля функции тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.8			Наследственная идиопатическая невропатия	и	G60	

6.8.1				<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789</p>	<p>Легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до 4 баллов)</p>
6.8.2				<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789</p>	<p>Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов); изменение походки ("степаж"); незначительная деформация стоп</p>
6.8.3				<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности);</p>	<p>Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов), деформация стоп, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений</p>

					МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789	
6.9		Болезни нервно-мышечного синапса и мышц		G70 - G73		
6.9.1			Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70		
6.9.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450	Локальные формы заболевания (глазная), генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениями функций организма: полная компенсация при лечении АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных и кранио-бульбарных мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий

						контролировать заболевание, симптомов	регресс
6.9.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450	Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма	
6.9.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450	Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на фоне недостаточно эффективной базисной терапии, тимомтимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным	

						нарушениям функций организма
6.9.1.4					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450	Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей, дыхательных и (или) кранио-бульбарных мышц (генерализованная форма), быстро прогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительно выраженному нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использование зондового питания и необходимость в постоянной посторонней помощи и уходе
6.10			Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии)	G71		
6.10.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы;	Снижение мышечной силы до 4 баллов, активные движения в суставах верхних и/или нижних конечностей сохранены в полном объеме. Незначительные нарушения

					МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429	функций организма
6.10.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429	Снижение мышечной силы до 3 баллов, умеренное ограничение амплитуды активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностей, гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Умеренные нарушения функций организма
6.10.3					Нарушения психических, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 410 - 429	Снижение мышечной силы до 2 баллов, выраженное ограничение амплитуды активных движений верхних и (или) нижних конечностей; выраженная гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Выраженные нарушения функций организма
6.10.4					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 310 - 340, В 710 - 789, В 410 - 429	Снижение мышечной силы до 1 балла с невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженные нарушения функций организма

6.11		Церебральный паралич и другие паралитические синдромы		G80 - G83		
6.11.1			Детский церебральный паралич	G80		
6.11.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340; В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799	Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий спастический парализ, легкий гемипарез (мышечная сила 4 балла) с сохранением активных движений в суставах верхних и нижних конечностей в полном объеме, либо имеет место тугоподвижность или легкая контрактура суставов, легкая деформация стоп(ы) и/или кистей(ти) вследствие повышенного тонуса; незначительная гипотрофия мышц и укорочение конечности(ей). Незначительная туловищная (статическая) атаксия, легкая мышечная гипотония с незначительным переразгибанием в суставах, некоординированной походкой; незначительные нарушения мелкой и целевой моторики.

						Незначительный псевдобульбарный синдром, не затрудняющий фонацию и глотание; отсутствие нарушений, либо незначительные нарушения языковых и речевых функций (дизартрия). Незначительные нарушения психических функций (незначительное когнитивное снижение, IQ = 65 - 69 баллов)
6.11.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799	Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный спастический парапарез, умеренный гемипарез (мышечная сила 3 балла) с умеренными контрактурами суставов, умеренной деформацией стоп(ы) и/или кистей(и); умеренной гипотрофией мышц и укорочением конечности. Умеренный спастико-гиперкинетический синдром: умеренные ассиметричные спастико-гиперкинетические парезы, активные движения в суставах умеренно ограничены (в большей степени вследствие

						<p>гиперкинезов); Умеренная туловищная (статическая) атаксия, умеренная мышечная гипотония с переразгибанием в суставах, некоординированной походкой: в медленном темпе, затруднены сложные виды движений; умеренные нарушения мелкой и целевой моторики. Умеренный псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисграфия, дислексия, дисфония, дисфагия) с нарушением фонации и глотания, с умеренными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с умеренным когнитивным снижением и/или умеренным снижением интеллекта (IQ = 50 - 64 баллов)</p>
6.11.1.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной</p>	<p>Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный спастический парапарез, выраженный гемипарез (мышечная сила 2 балла) с выраженными</p>

					<p>системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>контрактурами суставов, с выраженной деформацией стоп(ы) и/или кистей(ти); с фиксированным порочным положением стоп и/или кистей, затрудняющим опору и передвижение, хват и удержание предметов. Выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженные ассиметричные спастико-гиперкинетические парезы, значительно ограничивающие активные движения в суставах. Выраженная мышечная гипотония, туловищная (статическая) атаксия, препятствующая вертикализации, и самостоятельному передвижению. Выраженный псевдобульбарный синдром с нарушение фонации и глотания, выраженными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с выраженным когнитивным снижением и/или снижением интеллекта до уровня умеренной умственной отсталости (IQ = 35 - 49 баллов).</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Нарушение контроля функции тазовых органов
6.11.1.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Значительно выраженные нарушения статодинамических функций: выраженный или значительно выраженный тетрапарез, нижний спастический парапарез, значительно выраженный гемипарез или гемиплегия (мышечная сила 1 балл), нижняя параплегия (мышечная сила 0 баллов) с множественными комбинированными контрактурами суставов конечностей; фиксированным порочным положением стоп и/или кистей; нарушение координации движений и равновесия, значительно затрудняющих вертикализацию, опору и передвижение. Либо - отсутствие произвольных движений в конечностях, туловище, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), с незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок с помощью).</p>

						<p>Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез, значительно выраженные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы, значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей; движения в суставах практически отсутствуют (в большей степени вследствие гиперкинезов), значительно выраженный атетоз и/или двойной атетоз и/или баллизм, торсионная дистония с невозможностью отсутствием вертикализации, опоры и передвижения.</p> <p>Значительно выраженная туловищная (статическая) атаксия, значительно выраженная динамическая атаксия, значительно выраженная мышечная гипотония, препятствующая точным движениям, схвату и удержанию предметов, формированию вертикальной позы и произвольных движений. Значительно выраженный</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>псевдобульбарный синдром (отсутствие функций жевания, глотания, анартрия), отсутствие устной речи. Значительно выраженное когнитивное снижение и/или снижение интеллекта до уровня тяжелой или глубокой умственной отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функции тазовых органов</p>
6.12			<p>Гемиплегия</p> <p>Параплегия и тетраплегия</p> <p>Другие паралегические синдромы</p>	<p>G80</p> <p>G81</p> <p>G82</p>		
6.12.1					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789</p>	<p>Верхние конечности: легкий (4 балла) парапарез, легкий дистальный или умеренный (3 балла) проксимальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез в том числе дистального или проксимального отдела верхней конечности; Нижние конечности: легкий парапарез, легкий проксимальный или умеренный дистальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез, в том числе дистального или</p>

						проксимального отдела нижней конечности, приводящие к незначительному нарушению статодинамической функции
6.12.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	Верхние конечности: умеренный парапарез, умеренный дистальный, выраженный (2 балла) проксимальный парапарез, значительно выраженный (1 балл) монопарез, дистальная моноплегия; Нижние конечности: умеренный парапарез, выраженный дистальный, умеренный проксимальный парапарез, значительно выраженный монопарез, моноплегия, незначительный тетрапарез; умеренный гемипарез (снижение мышечной силы до 3 баллов); легкий тетрапарез, приводящие к умеренному нарушению статодинамической функции
6.12.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Верхние конечности: выраженный парапарез, выраженный дистальный, значительно выраженный проксимальный парапарез;

					МКФ: В 710 - 789	нижние конечности: выраженный парапарез, значительно выраженный дистальный, выраженный проксимальный парапарез; выраженный гемипарез (снижение мышечной силы до 2 баллов); умеренный тетрапарез, приводящие к выраженному нарушению статодинамической функции
6.12.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	Значительно выраженный гемипарез, значительно выраженный трипарез, выраженный тетрапарез, значительно выраженный парапарез рук, значительно выраженный проксимальный парапарез ног, параплегия рук, ног, гемиплегия, триплегия, тетраплегия (снижение мышечной силы до 1 балла) со значительно выраженными нарушениями статодинамической функции
7	Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII)				Н00 - Н59	

Примечание к [пункту 7](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, по

травм или дефектами, основывается на характере и степени выраженности нарушения зрительных функций, основные из которых: острота зрения в единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°).

Состояние зрительных функций определяется с учетом ранжирования их показателей, содержащихся в МКБ-10. Степень нарушения органа зрения по состоянию функции лучше видящего (или единственного) глаза с максимально переносимой коррекцией и с применением контрольных исследований. При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других специальных морфофункциональных методов исследования (оптическая когерентная томография сетчатки, определение остроты зрения - вызванные зрительные потенциалы).

Учитываются также другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения, активность процесса, время наступления зрительного дефекта, адаптации к нему, вид и особенности коррекции (очковая, контактная, интраокулярная).

7.1			Острота зрения			
7.1.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим или единственного глаза в условиях максимальной переносимой коррекции) > 0,3
7.1.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим или единственного глаза в условиях максимальной переносимой коррекцией) более 0,1 до 0,3 (включительно)
7.1.3					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим глазом видящим глазом с коррекцией) 0,1 - 0,05
7.1.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим глазом с коррекцией) 0,04 - 0 Острота зрения (лучше видящего или единственного глаза с оптимальной коррекцией) 0 - 0,04

7.2			Концентрическое сужение полей зрения (по 8 основным меридианам от точки фиксации); контрольно со смещенным центром фиксации в темпоральную сторону на 15 градусов, кампиметрия			
7.2.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза от 60° до 40° (включительно) без абсолютных скотом в остаточных полях зрения.
7.2.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 40° до 20° (включительно)
7.2.3					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 20° до 10° (включительно)
7.2.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 10°
7.3			Скотомы в центральном поле зрения (град.)			

7.3.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Относительные парацентральные несливные скотомы
7.3.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Единичные, сливные абсолютные центральные скотомы до 5 градусов и сливные абсолютные парацентральные скотомы или кольцевидные скотомы при концентрическом сужении полей зрения лучше видящего или единственного глаза от 55 до 40 градусов (включительно)
7.3.3					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Центральные абсолютные скотомы более 5 до 10 лучше видящего или единственного глаза
7.3.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Центральные абсолютные скотомы более 10 лучше видящего или единственного глаза
8	Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII)			H60 - H95		

Примечание к пункту 8.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости или глухоты) слышащего (единственного) уха (по международной классификации тугоухости). Учитываются также и другие факторы патологического процесса: стадия течения заболевания, время наступления слухового дефекта, степени адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушениями психических функций и другие. При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других исследований.

морфофункциональных методов исследования (аудиоимпедансометрия, отоакустическая эмиссия, вызванные слуховые потенциалы).

8.1			Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных)	H60 - H95		
8.1.1					Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230 - 349 (слух), В 310 - 340	Врожденная или приобретенная в детстве глухота или тугоухость IV степени с речевыми нарушениями
8.1.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух)	Тугоухость I - IV степени, односторонняя Тугоухость I - II степени, двусторонняя
8.1.3					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух)	Тугоухость III и IV степени, двусторонняя Глухота двусторонняя
8.1.4					Нарушения психических, сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух), В 110 - 139, В 140 - 189	Глухонемота, сопровождающаяся психическими нарушениями (незначительными, умеренными, выраженными)
8.1.5						Глухонемота, сопровождающаяся значительно выраженными нарушениями психических функций

8.2			Профессионально обусловленная потеря слуха (глухота), тугоухость			
8.2.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух)	Тугоухость I - III степени, двусторонняя
8.2.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух)	Тугоухость IV степени, двусторонняя, глухота двусторонняя
8.3		Комбинированное нарушение зрения и слуха				
8.3.1			Слепоглухота			
8.3.1.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Двусторонняя тугоухость III степени в сочетании с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,1 - 0,05)
8.3.1.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1 - 0,05) в сочетании с глухотой
8.3.1.3					Нарушение сенсорных	Полная (тотальная) или

					функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	практическая слепоглухота
8.3.1.4					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени
9	Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах			I00 - I99		

Примечание к [пункту 9](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма граждан в возрасте 18 лет обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывается на степени выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения; гипертонический синдром, легочная патология; степень нарушений сердечного ритма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.

9.1		Хронические ревматические болезни		I05 - I09		
		Другие болезни сердца		I30 - I52		

9.1.1			<p>Ревматические поражения митрального клапана I05</p> <p>Неревматические поражения аортального клапана I06</p> <p>Неревматические поражения трехстворчатого клапана I07</p> <p>Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов I08</p> <p>Другие ревматические болезни сердца I09</p> <p>Неревматические поражения митрального клапана I34</p> <p>Неревматические поражения аортального клапана I35</p> <p>Неревматические поражения трехстворчатого клапана I36</p> <p>Поражение клапана легочной артерии I37</p>			
9.1.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца, клапана легочного ствола;

						ревматический миокардит, эндокардит и перикардит без признаков воспалительного процесса, с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия I, II ФК, легкие нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН 0 или I стадии
9.1.1.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия III ФК, легочная гипертензия 2-й степени, умеренные нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН IIa стадии
9.1.1.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит

						активного течения, с выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й степени, стенокардия III ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН IIБ стадии
9.1.1.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й степени, стенокардия IV ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН III стадии
9.2		Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением		I10 - I15		
9.2.1					Нарушение функций	Артериальная гипертензия 1

					сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	- 3 степени, гипертоническая болезнь II стадии без нарушения функций органов-мишеней.
9.2.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299	Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с умеренными нарушениями функций органов-мишеней
9.2.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299	Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с выраженными нарушениями функций органов-мишеней
9.2.4					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций;	Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии со значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней

					МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299	
9.3		Ишемическая болезнь сердца		I20 - I25		
9.3.1			Стенокардия	I20		
9.3.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда I, II ФК (75 - 100 Вт); ХСН 0 или I стадии
9.3.1.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда, ФК III (50 Вт) при наличии ХСН I, II А стадии
9.3.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639	Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда ФК III (50 Вт) при наличии ХСН IIБ стадии
9.3.1.4					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы,	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой

					мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639	системы: стенокардия и безболевая ишемия ФК IV (25 Вт) при наличии ХСН IIБ или III стадии
9.4			Хроническая ишемическая болезнь сердца	I25		
			Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка (Гиса)	I44		
			Сердечная недостаточность	I50		
			Кардиомиопатия	I42		
			Пароксизмальная тахикардия	I47		
			Фибрилляция и трепетание предсердий	I48		
			Другие нарушения сердечного ритма	I49		
			Нарушения системы кровообращения после процедур, не классифицированные в других рубриках	I97		
			Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов	Z95		

			Последствия травмы внутригрудных органов	T91.4		
			Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	Q20 - Q28		
9.4.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Незначительные нарушения функции сердечно- сосудистой системы: ХСН I стадии.
9.4.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Умеренные нарушения функции сердечно- сосудистой системы: ХСН IIA стадии
9.4.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Выраженные нарушения функции сердечно- сосудистой системы: ХСН IIB стадии
9.4.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии
9.5			Наличие трансплантированного сердца	Z94.1		
			Наличие трансплантированных сердца и легкого	Z94.3		
Первичное освидетельствование						
9.5.1					Нарушения психических	Состояние после

					<p>функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439</p>	<p>трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых 2 лет</p>
9.5.2 Повторное освидетельствование (после 2-х летнего наблюдения)						
9.5.2.1					<p>Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439</p>	<p>По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма</p>
9.5.2.2					<p>Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439</p>	<p>По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма</p>
9.5.2.3					<p>Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы;</p>	<p>По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма</p>

					МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	
9.6			Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности	I27.0 I27.8 I27.9		
9.6.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной специфической терапии: легочная гипертензия ФК I
9.6.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК II
9.6.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК III
9.6.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК IV
9.7		Болезни артерий,		I70 - I79		

		артериол и капилляров				
9.7.1			Атеросклероз Другие болезни периферических сосудов (хроническая артериальная недостаточность, облитерирующий артериит конечностей, а также состояния после реваскуляризации)	I70 I73		
9.7.1.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	I, II А степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов (более 65%) артерий конечностей, без клинических проявлений. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) - 0,75 и более. После хирургической реваскуляризации при полном восстановлении кровообращения (компенсации кровообращения)
9.7.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	IIБ степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов артерий (свыше 65%), ЛПИ менее 0,75 - 0,25 После хирургической

					функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	реваскуляризации с сохраняющимся дистальным блоком, с субкомпенсацией кровообращения
9.7.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 710 - 789	III или IV степень ишемии, ЛПИ менее 0,25. После хирургической реваскуляризации с сохраняющимся дистальным блоком, с ограниченными трофическими нарушениями (язва, некроз), декомпенсацией кровообращения; Ампутационные культы бедра/голеней одной конечности и II, III степенью ишемии другой конечности; при наличии медицинских противопоказаний для протезирования; ишемия культы бедра; при сопутствующих заболеваниях с выраженными нарушениями функций организма (ХСН II, III стадии, ДН III стадии)
9.7.1.4					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	III или IV степень ишемии, включая двусторонние трофические нарушения, ЛПИ менее 0,25 при наличии противопоказаний

					(статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	для оперативных вмешательств. Ампутированные культы обеих бедер; пороки или болезни культей; при невозможности пользования протезами из-за сопутствующих заболеваний; ишемии культей
9.8			Аневризма и расслоение аорты I71 Другие формы аневризмы I72			
9.8.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Незначительное локальное расширение сосуда ("малые аневризмы"); после имплантации стент-графтов с полной компенсацией кровообращения. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
9.8.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	Наличие "большой" (более 5 см) аневризмы аорты и/или крупных артерий таза с клиническими проявлениями при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению. После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий

						таза или имплантации стент-графтов с субкомпенсацией кровообращения
9.8.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	Крупные аневризмы брюшной аорты и/или крупных артерий таза при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению; После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с послеоперационными осложнениями и декомпенсацией кровообращения
9.9		Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках, проявляющиеся хронической венозной недостаточностью		180 - 188		
9.9.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы;	Хронические заболевания вен, соответствующие 2 - 3 классу клинических

					МКФ: В 410 - 429	проявлений международной классификации хронических болезней вен
9.9.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	Хронические заболевания вен с язвенным дефектом со значительными трофическими нарушениями на одной конечности или язвенный дефект без значительной продукции отделяемого секрета на обеих конечностях, соответствующих 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен Двустороннее поражение со значительными трофическими нарушениями, без язвенных дефектов, соответствующих 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с умеренными нарушениями статодинамических функций
9.9.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Хронические заболевания вен с язвенными дефектами со значительной продукцией отделяемого секрета и трофическими нарушениями на обеих нижних

					функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789	конечностях, соответствующих 4 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с выраженными нарушениями статодинамических функций
9.10			Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках (лимфедема)	189.0		
9.10.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789, В 798, В 799	Лимфедема ХЛН I степени с увеличением объема конечности (больше чем на 3 см) с незначительными нарушениями функций организма
9.10.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789, В 798, В 799	Лимфедема с ХЛН II степени (увеличением объема на 4 - 6 см) обеих нижних конечностей или III степени (увеличение объема на 6 - 10 см) одной конечности со значительными трофическими нарушениями, с умеренными нарушениями функций организма

9.10.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789, В 798, В 799	Лимфедема с ХЛВН III, IV степени обеих нижних конечностей со значительными трофическими нарушениями, значительной продукцией отделяемого секрета, с выраженными осложнениями и нарушениями функций организма
10	Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других классах болезней			J00 - J99		
10.1			Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму) Болезни легкого, вызванные внешними агентами Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань	J40 - J47 J60 - J70 J80 - J84		

			Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей	J85 - J86		
			Другие болезни органов дыхания	J95 - J99		
			Единственное легкое (врожденное, после пульмонэктомии)	Z92.4		
			Саркоидоз	D86		
			Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	Q 30 - Q 34		

Примечание к подпункту 10.1.

Степень тяжести дыхательной недостаточности оценивается исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови сатурации крови кислородом (SaO₂): ДН I степени - PaO₂ 79 - 60 мм.рт.ст., SaO₂ - 90 - 94%; ДН II степени - PaO₂ 59 - 55 мм.рт.ст., SaO₂ - 89 - 85%; ДН III степени - PaO₂ < 55 мм.рт.ст., SaO₂ < 85%.

Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, эффективность базовой терапии, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, осложнения.

10.1.1					Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: В 440 - 449	Легкая или среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 1: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 >= 80%) без хронической дыхательной недостаточности (ДН 0) либо с признаками ДН I степени
--------	--	--	--	--	--	--

10.1.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 2: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 50% >= ОФВ1 < 80%), ДН II степени; преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии)
10.1.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 3: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 30% >= ОФВ1 < 50%) с ДН II, III степени, ХСН IIА стадии
10.1.4					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449; В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств с бронхиальной обструкцией (GOLD 4: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 < 30%), наличие осложнений, ДН III степени, ХСН IIБ, III стадии
10.2			Астма	J45		
10.2.1					Нарушение функции дыхательной системы;	Незначительные нарушения функции дыхательной

					МКФ: В 410 - 429	системы: легкое или среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии низкими или средними дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН 0 или ДН I стадии
10.2.2					Нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449	Среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН II степени с преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии)
10.2.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Тяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостероидов) с ДН II, III степени, ХСН II А стадии
10.2.4					Нарушение функции дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Тяжелое течение заболевания на фоне базисной терапии с ДН III степени, ХСН IIБ и III стадии

10.3			Наличие трансплантированного легкого	Z94.2		
10.3.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429, В 430 - 439	При первичном освидетельствовании после трансплантации легкого в течение первых 2 лет
10.3.2						При повторном освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма.
10.3.3						По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
10.3.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма

10.4			Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	J95		
10.4.1					Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 340, В 398, В 399	Наличие функционирующей постоянной трахеостомы, сохранный либо малоразборчивая речь. ДН 0 или ДН I степени
10.4.2					Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 340, В 398, В 399	Наличие функционирующей постоянной трахеостомы с выраженными нарушениями языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивной речи, наличием ДН II или ДН III степени и других осложнений
11	Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней			K00 - K93		

Примечание к [пункту 11](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, наличия и частоты распространения патологического процесса, включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.

11.1		Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		K00 - K14 Q38 - 45		
11.1.1			Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса) Расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть)	K07 Q35 - Q37		
11.1.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 340, В 398, В 399	Последствия комплексного лечения челюстно-лицевых аномалий, врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба в виде незначительных нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной системы
11.1.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых	Утрата части нижней или верхней челюсти, контрактура челюсти, с

					функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 340, В 398, В 399	нарушением структуры носа, придаточной пазухи (пазух); последствия перенесенных оперативных вмешательств по поводу врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба с умеренными нарушениями нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной системы
11.2		Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки Другие болезни органов пищеварения Другие врожденные аномалии органов пищеварения		K20 - K31 K90 - 93 Q38 - 45		
11.2.1			Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта (пищевода или его части)	Q39 Z90.4		

			Наличие другого уточненного функционального имплантата (пищевода, замена пищевода)	Z96.8		
			Непроходимость пищевода	K22		
11.2.1.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Незначительное нарушение функций пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе
11.2.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Умеренное нарушение функций организма после реконструктивных операций на пищеводе
11.2.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Выраженное нарушение функции пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе
11.2.2			Другие врожденные аномалии (пороки развития) верхней части пищеварительного тракта	Q40		
			Врожденные отсутствие,	Q41 - Q42		

			<p>атрезия и стеноз тонкого и толстого кишечника</p> <p>Приобретенное отсутствие части желудка Z90.3</p> <p>Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта Z90.4</p> <p>Синдромы оперированного желудка K91.1</p> <p>Состояние, связанное с наложением кишечного анастомоза Z98.0</p>			
11.2.2.1					<p>Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539</p>	<p>Наличие легкого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) без потери массы тела, незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 - 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л)</p>
11.2.2.2					<p>Нарушения функций пищеварительной,</p>	<p>Наличие средней тяжести синдрома оперированного</p>

					эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) с мальдигестией и мальабсорбцией, умеренными нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1c < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса.
11.2.2.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Наличие тяжелого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) с выраженной мальдигестией, мальабсорбцией и нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее

						100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения HbA1c более 9%; гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса
11.3		Неинфекционный энтерит и колит		K50 - K52		
11.3.1			Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K50 K51 K52		
11.3.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Хроническое течение заболевания (рецидив воспалительного процесса до 2 раз в год), клиниколабораторная и/или эндоскопическая ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболевания, лабораторных и эндоскопических признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса, в том числе на фоне постоянного приема

						противовоспалительной терапии, отсутствие или незначительно выраженные внекишечные проявления
11.3.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439	Рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раза в год); хроническое непрерывное течение заболевания (левосторонний колит, терминальный илеит, в том числе в сочетании с поражением толстой кишки) клиниколабораторная и/или эндоскопическая умеренная активность заболевания на фоне проведения базисной терапии, с умеренными нарушениями функций пищеварительной системы; наличием кишечных осложнений (стриктуры, межкишечные и прямокишечные свищи, ректовагинальные свищи), внекишечных проявлений умеренной тяжести, состояние после хирургического лечения с формированием стомы или тонкокишечного резервуара
11.3.1.3					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы; системы крови и	Рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз год); хроническое непрерывное течение заболевания с

					<p>иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 540 - 559</p>	<p>поражением всего кишечника (панколит, распространенный илеит) клиничко-лабораторная и/или эндоскопическая выраженная активность процесса на фоне проведения базисной терапии; свищевая, стенозирующая формы заболевания, а также наличие инфильтрата, ведущие к выраженным нарушениям функций пищеварительной системы; наличием стойких локальных и внекишечных проявлений средней тяжести, необходимость проведения постоянной цитостатической и/или биологической терапии, терапии селективными иммунодепрессантами</p>
11.3.1.4					<p>Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; эндокринной системы и</p>	<p>Терминальная стадия заболевания с тотальным поражением кишечника, значительно выраженными нарушениями пищеварения (мальабсорбция и малдигестия тяжелой степени, кахексия), других органов и систем организма при неэффективности базисной терапии,</p>

					метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 540 - 559	малигнизации, последствиях массивной резекции кишечника
11.4		Другие болезни кишечника		K55 - K63		
11.4.1			Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью Брюшинные спайки	K56.5 K66.0		
11.4.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Спаечная болезнь с редкими (1 - 4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися консервативно (в амбулаторных условиях)
11.4.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Спаечная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства
11.4.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы;	Непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного

					МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	лечения, не поддающиеся консервативной терапии и требующие оперативного вмешательства
11.5		Болезни печени Другие врожденные аномалии органов пищеварения		K70 - K77 B15 - B19 Q38 - Q45		
11.5.1			Вирусный гепатит	B15 - B19		
11.5.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439	Хронический гепатит с лабораторными цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 1 - 2 степени; с отсутствием или незначительными клиническими проявлениями. Отсутствие фиброза либо незначительные признаки фиброза (F0 или F1 по шкале METAVIR)
11.5.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439	Прогрессирование хронического гепатита с лабораторными цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной

						недостаточности 3 степени; с умеренными клиническими проявлениями на фоне базисной терапии. Умеренные или выраженные признаки фиброза (F2 или F3 по шкале METAVIR)
11.5.2			Алкогольный фиброз и склероз печени. Алкогольный цирроз печени. Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени Фиброз и цирроз печени Врожденный цирроз печени	K70.2 K70.3 K71.1 K74 Q44		
11.5.2.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A0, F4 по шкале METAVIR) компенсированный неактивный (класс А по Чайлд-Пью). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
11.5.2.2					Нарушения функций	Цирроз печени (A1-2, F4 по

					пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189	шкале METAVIR) компенсированный (класс А по Чайлд-Пью) с умеренными нарушениями функций организма
11.5.2.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189	Цирроз печени (А1-3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс В по Чайлд-Пью) с выраженными нарушениями функций организма
11.5.2.4					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189	Цирроз печени (А1-3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс С по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций организма
11.5.3			Наличие			

			трансплантированной печени			
11.5.3.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	При первичном освидетельствовании после трансплантации печени в течение первых 2 лет
11.5.3.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	При повторном освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
11.5.3.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии

					сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	осложнений с выраженными нарушениями функций организма
11.5.3.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
11.6		Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы		K80 - K87		
11.6.1			Хронический панкреатит алкогольной этиологии.	K86.0		

			Другие хронические панкреатиты	K86.1		
11.6.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Отсутствие или незначительные нарушения функции пищеварительной системы
11.6.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Умеренные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы
11.6.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Выраженные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы
12	Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII)			L00 - L99		

Примечание к пункту 12.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи и подкожной клетчатки, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции кожи. Учитываются также и другие патологического процесса: форма и тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма.

12.1		Буллезные нарушения		L10 - L14		
12.1.1			Пузырчатка (пемфигус)	L10		

			Пемфигоид	L12		
12.1.1.1					Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 810 - 849, В 430 - 439	Единичные высыпания на коже и слизистых оболочках с незначительными нарушениями функций организма
12.1.1.2					Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 810 - 849, В 430 - 439	Распространенное поражение кожи (более 2 анатомических областей) и/или слизистых оболочек, в том числе внутренних органов, с умеренными нарушениями функций организма, резистентность к проводимой системной терапии
12.2		Дерматит и экзема		L20 - L30		
12.2.1			Аллергический контактный дерматит	L23		
12.2.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Ограниченный дерматит, обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения
12.2.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Распространенный дерматит, обострения более 2 раз в год
12.2.2			Атопический дерматит	L20		
12.2.2.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем;	Ограниченная или распространенная форма

					МКФ: В 810 - 849	заболевания с площадью поражения кожи до 50%, обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения
12.2.2.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Распространенная форма с площадью поражения кожи 50% и более, обострения 3 и более раза в год, склонность к торпидному течению, резистентность к проводимой терапии
12.3		Папулосквамозные нарушения		L40 - L45		
12.3.1			Псориаз	L40		

Примечание к [подпункту 12.3.1.](#)

Количественная оценка нарушений функций организма при артропатическом псориазе подробно описана в [пункте 13.1](#)

12.3.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Псориаз с площадью поражения до 50% с незначительным нарушением функций организма
12.3.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение заболевания при площади поражения кожи более 50%, резистентность к проводимой терапии. Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение

						ладонно-подошвенного псориаза; резистентность к проводимой терапии
12.4		Болезни придатков кожи		L60 - L75		
12.4.1			Алопеция тотальная	L63.0		
12.4.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Тотальное облысение, с отсутствием бровей и ресниц
12.5		Другие болезни кожи и подкожной клетчатки		L80 - L99		
12.5.1			Локализованная склеродермия (morphea)	L94.0		
			Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей	L94.1		
			Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга - глубокая линейная склеродермия	L94.1		
12.5.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Поверхностные формы склеродермии без нарушений или с незначительными нарушениями кожи и связанных с ней систем
12.5.1.2					Нарушение функции кожи и	Глубокая форма

					связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	склеродермии, при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающиеся умеренными нарушениями функций организма (в зависимости от локализации
12.6		Врожденные аномалии и пороки развития кожи		Q80 - Q89		
12.6.1			Врожденный буллезный эпидермолиз	Q81		
12.6.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849	Ограниченные формы
12.6.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 810 - 849, В 710 - 789, В 210 - 279, В 510 - 539	Поражения кожи (в том числе активных поверхностей - кистей, стоп), слизистых оболочек внутренних органов, приводящие к умеренным нарушениям функций организма

12.6.1.3					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сенсорных функций, нарушение функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 810 - 849, В 710 - 789, В 210 - 279, В 510 - 539; В 410 - 429, В 610 - 639	Поражения кожи, слизистых оболочек внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)			M00 - M99		

Примечание к [пункту 13](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функций органов и систем организма, степени выраженности нарушений функций (наличие и степень контрактуры, деформаций суставов), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника); с учетом рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике, рекомендованных валидированных методов оценки клинико-лабораторных показателей активности заболевания, характеристики течения и степени тяжести заболевания. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) в противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется ремиссия заболевания.

13.1		Воспалительные полиартропатии		M05 - M14		
		Артрозы		M15 - M19		

13.1.1			<p>Серопозитивный ревматоидный артрит M05</p> <p>Синдром Фелти M05.0</p> <p>Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем M05.3</p> <p>Другие серопозитивные ревматоидные артриты M05.8</p> <p>Серопозитивные ревматоидные артриты неуточненные M05.9</p> <p>Другие ревматоидные артриты M06</p> <p>Серонегативный ревматоидный артрит M06.0</p> <p>Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых M06.1</p> <p>Другие уточненные ревматоидные артриты M06.8</p> <p>Юношеский артрит с системным началом M08.2</p>			
13.1.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной,	Отсутствие или незначительное нарушение функции организма: ФК I; рентгенологическая стадия I; отсутствие или I степень активности заболевания; отсутствие системных

					<p>дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>проявлений заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p>
13.1.1.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Умеренное нарушение функции организма: ФК II; рентгенологическая стадия II; II степень активности заболевания; отсутствие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренно выраженным нарушениям функций организма</p>
13.1.1.3					<p>Нарушения</p>	<p>Выраженное нарушение</p>

					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>функции организма: ФК II - III; рентгенологическая стадия II - IV; II - III степень активности заболевания; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма</p>
13.1.1.4					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В</p>	<p>Значительно выраженные нарушения функции организма: ФК IV (обоих тазобедренных, или более двух крупных суставов в функционально невыгодном состоянии); рентгенологическая стадия III - IV; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно</p>

					799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	выраженным нарушениям функций организма
13.1.2			Псориатические и энтеропатические артропатии	M07.0 - M07.3		
13.1.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Отсутствие или незначительное нарушение функции организма, отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; отсутствие или низкая активность заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.1.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций	Умеренное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; Умеренная активность заболевания; наличие осложнений

					пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма
13.1.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Выраженное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; умеренная или высокая активность заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма

13.1.2.4					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Значительно выраженное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; множественные эрозии суставов (более 5) остеонекрозов крупных суставов, при наличии осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма. Отсутствие ответа на терапию</p>
13.1.3			<p>Подагра Болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция дигидрата</p>	<p>M10 M11</p>		
13.1.3.1					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы,</p>	<p>Отсутствие или незначительное нарушение функции суставов; отсутствие тофусов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p>

					<p>системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	
13.1.3.2.					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Умеренное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные тофусы); наличие осложнений заболевания и/или проводимой медикаментозной терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма</p>
13.1.3.3					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p>	<p>Выраженное нарушение функции суставов; хроническое течение</p>

					<p>(статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>артрита; тофусная форма (подкожные и внутрикостные тофусы); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма</p>
13.1.3.4		13.1.3.4			<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 -</p>	<p>Значительно выраженное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (множественные внутрикостные тофусы, с поражением крупных суставов); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма</p>

					429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
13.1.4			Артрозы	M15 - M19		
13.1.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Нарушение функции суставов; НФС I; рентгенологическая стадия I - II; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.1.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной	Умеренное нарушение функции суставов; НФС II; рентгенологическая стадия II - III; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма

					системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639 В 810 - 849	
13.1.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Выраженное нарушение функции суставов; НФС III; Генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III - IV; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма
13.1.4.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Значительно выраженное нарушение функции суставов; НФС - IV; генерализованная форма

					<p>функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>заболевания;</p> <p>рентгенологическая стадия III - IV;</p> <p>наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма</p>
13.2.		Системные поражения соединительной ткани		M30 - M36		
13.2.1			<p>Системная красная волчанка</p> <p>Дерматополимиозит</p> <p>Болезнь Бехчета</p> <p>Системные васкулиты</p> <p>Гранулематоз Вегенера</p> <p>Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией.</p>	<p>M32</p> <p>M33</p> <p>M35.2</p> <p>M30</p> <p>M31.4</p> <p>M31.5</p>		

			<p>Сухой синдром (Шегрена) M35.0</p> <p>Диффузный эозинофильный фасциит M35.4</p> <p>Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена M35.6</p> <p>Другие уточненные системные поражения соединительной ткани M35.8</p>			
13.2.1.1					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Ремиссия или низкая активность заболевания без нарастания активности заболевания; отсутствие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p>
13.2.1.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных</p> <p>Умеренная активность заболевания;</p>	

					и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; с вовлечением в процесс внутренних органов и систем организма, приводящей к умеренным нарушениям функций организма
13.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 -	Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; вовлечение в процесс органов и систем организма; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма

					539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
13.2.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания; наличие жизнеугрожающих осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма
13.2.2			Системная волчанка	красная	M32	
13.2.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-	Низкая активность заболевания; отсутствие признаков повреждения органов и систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или

					<p>сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>проводимой терапии</p>
13.2.2.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Средняя активность заболевания; наличие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма</p>
13.2.2.3					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных</p>	<p>Высокая активность заболевания;</p>

					и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма
13.2.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 -	Прогрессирующее течение заболевания; Высокая активность заболевания, наличие полиорганых нарушений органов и систем организма вследствие заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма

					539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
13.2.3			Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит Другие дерматомиозиты Полимиозит Дерматополимиозит неуточненный	M33 M33.0 M33.1 M33.2 M33.9		
13.2.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Незначительная степень нарушения функции пораженных органов и систем организма, вызванных заболеванием, активность процесса I степени

13.2.3.2				<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p>	<p>Умеренная активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма</p>
13.2.3.3		13.2.3.3		<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;</p>	<p>Высокая активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма</p>

					МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
13.2.3.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Нарушения функции пораженных органов и систем организма, независимо от активности заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма
13.2.4			Системный склероз, склеродермия	M34		
			Прогрессирующий системный склероз	M34.0		
			Синдром CREST	M34.1		
			Системный склероз, вызванный	M34.2		

			<p>лекарственными средствами и химическими соединениями</p> <p>Другие формы системного склероза M34.8</p> <p>Системный склероз неуточненный M34.9</p> <p>Другие системные поражения соединительной ткани M35</p> <p>Другие перекрестные синдромы M35.1</p> <p>Диффузный (эозинофильный) фасциит M35.4</p>		
13.2.4.1					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;</p> <p>Очень ранняя стадия заболевания; Отсутствие активности; незначительное поражение кожи; синдром Рейно без дигитальных трофических нарушений; отсутствие поражения внутренних органов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p>

					МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
13.2.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Начальная стадия заболевания; низкая активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, приводящим к умеренным нарушениям функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.2.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы,	Стадия развернутых клинических проявлений заболевания; умеренная активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии,

					системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	приводящие к выраженным нарушениям функций организма
13.2.4.4						Терминальная стадия вне зависимости от активности заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушениям функций организма
13.2.5			Спондилопатии Анкилозирующий спондилит Другие воспалительные спондилопатии.	M45 - M48 M45 M46		
<p>КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду код МКБ-10 M46.8, а не M48.6.</p>						
			Другие уточненные	M48.6		

			воспалительные спондилопатии			
13.2.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Незначительное нарушение функции организма; незначительное нарушение функции позвоночника и/или суставов; отсутствие или низкая степень активности заболевания; ФК I; отсутствие внескелетных проявлений заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.2.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно- сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 -	Умеренное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой степени активности заболевания; ФК II; наличие внескелетных проявлений заболевания с умеренными нарушениями функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии

					559, В 610 - 639, В 810 - 849	
13.2.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Выраженное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой активности заболевания; ФК III; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии; приводящие к выраженным нарушениям функций организма
13.2.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной	Значительно выраженные нарушения функции организма, значительно выраженные нарушения функции позвоночника/суставов; ФК IV; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительным нарушениям

					функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	функций организма
13.3		Дорсопатии		M40 - M54		

Примечание к подпункту 13.3.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений статодинамической функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных дорсопатиями основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования степени (сколиоз, кифосколиоз), ограничения подвижности позвоночника, нарушения функции других органов и систем организма (костно-мышечной, сосудистой, дыхательной и других систем), выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, наличия неврологической симптоматики. Учитываются также результаты хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, сопутствующие заболевания.

13.3.1			Деформирующие дорсопатии	M40 - M43		
			Сколиоз	M41		
			Остеохондроз позвоночника.	M42		
			Другие деформирующие дорсопатии	M43		
			Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела	M50 - M54		
13.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Сколиоз и кифосколиоз II - III степени с незначительными ограничениями подвижности позвоночника.

					МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789	Отсутствие нарушений функций внутренних органов
13.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639	Сколиоз и кифосколиоз III - IV степени с умеренным ограничением подвижности позвоночника, деформацией грудной клетки, при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма. Состояние после реконструктивных операций с протяженной фиксацией не менее двух отделов позвоночника
13.3.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639	Сколиоз и кифосколиоз IV степени с выраженным ограничением подвижности позвоночника, с грубой деформацией грудной клетки, при наличии выраженных нарушений функций внутренних органов
13.4		Остеопатии и хондропатии		M80 - M94		

		Нарушение плотности кости		M80 - M85		
13.4.1			Остеопороз патологическим переломом	с M80		
			Остеопороз патологического перелома	без M81		
13.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559	Отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или имеют место незначительные (менее 7 - 10°) деформации оси конечности/или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороза отсутствуют
13.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2 - 3 года с длительным сроком консолидации, деформацией оси конечности более 10°, но

					<p>метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559</p>	<p>менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени), Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные изменения. Выявляются начальные Rg-признаки остеопороза</p>
13.4.1.3					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559</p>	<p>Патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения</p>

13.4.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559	Возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела. Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома
13.4.2			Остеомиелит (хронический)	M86		
13.4.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 430 - 439, В 810 - 849	Редкие обострения (1 раз в год и реже), непродолжительные (менее 3 недель)
13.4.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789; В 430 - 439; В 810 - 849	Обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средней продолжительности (не менее 4 недель)
13.4.2.3					Нарушения	Рецидивирующий

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - В 639, В 810 - 849	остеомиелит: обострения частые (3 - 4 раза в год), длительные (более 4 недель). Формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений
13.4.3			Остеонекроз	M87		
13.4.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	Односторонний некроз головки бедра в III - IV, рентгенологической стадии с НФС III степени в пораженном суставе (исход в деформирующий артроз)
13.4.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	Односторонний и двусторонний некроз головки бедра во II рентгенологической стадии (остеонекроза и остеолизиса) на период иммобилизации
13.5			Эндопротезы			
13.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Состояние после одностороннего и двустороннего

					(статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов; без осложнений эндопротезирования
13.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	Осложнения эндопротезирования с умеренными нарушениями функции организма
13.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ - В 710 - 789	Осложнения эндопротезирования с выраженными нарушениями функции организма
14	Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с поражением преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней					

Примечание к [пункту 14](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений мочевыделительной функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции

соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень СКФ. Учитываются другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие).

14.1		Гломерулярные болезни	N00 - N08			
		Тубулоинтерстициальные болезни почек	N10 - N16			
		Почечная недостаточность	N17 - N19			
		Мочекаменная болезнь	N20 - N23			
		Другие болезни почки и мочеточника	N25 - N29			
		Другие болезни мочевой системы	N30 - 39			
		Помощь, включающая гемодиализ	Z49			
		Приобретенное отсутствие почки	Z90.5			
		Агенезия и другие редукционные дефекты почки	Q60 N30.1			

		Интерстициальный цистит (хронический)		N30.2		
14.1.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - В 639	ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73 м ² ; ХБП 2 стадии, СКФ в пределах 89 - 60 мл/мин/1,73 м ХБП 3А стадии, СКФ 59 - 45 мл/мин/1,73 м ²
14.1.2					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439	ХБП 3Б стадии, СКФ 44 - 30 мл/мин/1,73 м ² . Нефротический/нефритический синдромы при неэффективности лечения с умеренно выраженными нарушениями функций организма
14.1.3					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559, В 410 - 429; В 440 - 449	ХБП 4 стадии, СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м ² , подготовка к диализу. ХБП 5 стадии (СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м ²) при отсутствии осложнений диализа
14.1.4					Нарушения мочевыделительной	ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м ² , при наличии

					функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559, В 410 - 429; В 440 - 449	осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
14.2			Наличие трансплантированной почки	Z94.0		
14.2.1					Нарушение мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	При первичном освидетельствовании - состояние после трансплантации почки
14.2.2					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки

					системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	
14.2.3					Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
14.2.4					Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
14.3			Приобретенное отсутствие почки.	Z90.5		

			Агенезия и другие редуцированные дефекты почки	Q60		
14.3.1					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439	Отсутствие нарушений или незначительные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 1, 2 стадии)
14.3.2					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439	Умеренные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 3 стадии)
14.3.3					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439	Выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 4 стадии)
14.3.4					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439	Значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 5 стадии)
14.4			Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов. Агенезия и аплазия	Q50 - Q56 Q51.0		

			матки. Врожденное отсутствие влагалища	Q52.0		
14.4.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639; В 640 - 679	Агенезия и аплазия матки, врожденное отсутствие влагалища, без пластической операции, после достижения 14 - летнего возраста
15	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI)					
15.1		Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов		T26 - T28		
15.1.1			Термический пищевода	ожог T28.1		

			Химический ожог пищевода	T28.6		
15.1.1.1					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тела
15.1.1.2					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования. Наличие искусственного пищевода с умеренным нарушением функций пищеварительной системы
15.1.1.3					Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени и выше (декомпенсация) с нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие осложнений (свищи) с выраженными нарушениями функций организма
15.1.1.4					Нарушения функции пищеварительной,	Декомпенсация пищеварения (кахексия);

					дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449	неустранимые последствия неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств	тяжелые болезни;
15.1.2		Последствия термических и химических ожогов и отморожений		T95			
15.1.2.1			Последствия термических и химических ожогов и отморожений	T95			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи	T95.0			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища	T95.1			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности	T95.2			
			Последствия	T95.3			

			термического и химического ожога и отморожения нижней конечности			
15.1.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849	Последствия термических поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении
15.1.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно- сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849	Последствия термических поражений III степени с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма
15.1.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных	Последствия термических поражений III степени с

					и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849	вовлечением 2 и более суставов ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраженных контрактур и/или анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма
15.1.2.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849	Последствия распространенных термических поражений III степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета. Наличие осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
15.1.3		Последствия травм головы		T90		
15.1.3.1			Последствия открытого	T90.1		

			ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.2		
15.1.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Дефект костей черепа размером 3 x 3 см и менее с пластикой и без нее
15.1.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Дефект костей черепа размером более 3 x 3 см при наличии пульсации ТМО в области дефекта
15.1.3.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Значительный дефект костей черепа размером 10 x 10 см и более
15.1.4		Последствия травм шеи и туловища		T91		
15.1.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или

					функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника)
15.1.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 610 - 639, В 510 - 539	Последствия осложненных переломов позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени, нестабильность металлоконструкции любой протяженности после проведенного оперативного лечения
15.1.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой
15.1.4.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Последствия осложненных переломов позвоночника с полным анатомическим

					(статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	прерыванием спинного мозга, со значительно выраженной неврологической симптоматикой, нарушением функции тазовых органов
15.1.5			Последствия травм верхней конечности Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность	T92 Q71		
Последствия травм плечевого сустава						
15.1.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение движения плечевого сустава, включая плечевой пояс (отведение и/или сгибание плеча от 90° до 120° с соответствующим ограничением отведения и ротационных движений). Нестабильность одного плечевого сустава, включая редкие вывихи плеча. Псевдоартроз плечевой кости стабильный. Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении (угол отведения 45°, при сгибании руки до 30 - 45°) при хорошо подвижном плечевом поясе
15.1.5.2					Нарушения	Нестабильность плечевого

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	сустава тяжелой степени, включая "болтающийся" сустав (тяжелый дефект проксимального отдела плеча). Псевдоартроз нестабильный плечевой кости. Культя верхней конечности на уровне плеча или в локтевом суставе
15.1.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Культя плеча после вычленения с частью плечевого пояса
15.1.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Двусторонние культы верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
Последствия травм локтевого сустава						
15.1.5.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение движения в локтевом суставе незначительная степень (разгибание/сгибание до 0 - 30 - 120° при неограниченной ротации предплечья). Анкилоз локтевого сустава в

						<p>функционально выгодном положении (сгибание 70° - 110°, пронация 0 - 10°).</p> <p>Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально выгодном или невыгодном положении.</p> <p>Псевдоартроз костей предплечья стабильный (локтевой или лучевой кости, или обеих костей с тугоподвижностью)</p>
15.1.5.6					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Анкилоз обоих локтевых суставов в функционально невыгодном положении.</p> <p>Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально невыгодном положении</p> <p>"Болтающийся" локтевой сустав.</p> <p>Культя верхней конечности на уровне предплечья или кисти</p>
15.1.5.7					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Анкилоз обоих локтевых суставов в функционально невыгодном положении</p>

15.1.5.8					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Двусторонние культы верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
Последствия травм лучезапястного сустава						
15.1.5.9					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение подвижности кистевых суставов, незначительная/умеренная степень (разгибание/сгибание до 30 - 40°) одностороннее/двустороннее . Анкилоз одного кистевого сустава в функционально выгодном (разгибание 15°) или невыгодном положении
15.1.5.10					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение подвижности в обоих кистевых суставах выраженной степени. Анкилоз обоих кистевых суставов в функционально невыгодном положении
Последствия травм пальцев кистей рук						
15.1.5.11					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Отсутствие дистальной фаланги и части основной первого пальца кисти. Отсутствие первого пальца

					<p>функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>кисти, в том числе с первым лучом кисти. Отсутствие одного трехфалангового пальца кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. Отсутствие двух или трех (исключая первый) трехфаланговых пальцев кисти. Отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти</p>
15.1.5.12					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Отсутствие двух трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. Отсутствие трех трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. Отсутствие первых пальцев обеих кистей. Отсутствие всех пальцев одной кисти. Полное отсутствие всех трехфаланговых пальцев одной кисти</p>
15.1.5.13					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;</p>	<p>Отсутствие всех трехфаланговых пальцев с сохраненными II - V пястными костями на обеих кистях</p>

					МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	
15.1.5.14					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Отсутствие всех пальцев обеих кистей
15.1.6			Последствия травм нижней конечности	T93		
			Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность	Q72		
Последствия травм тазобедренного сустава, культя на уровне бедра						
15.1.6.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение движения в тазобедренных суставах: одностороннее незначительной/умеренной степени или двустороннее незначительной степени
15.1.6.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение движения в тазобедренных суставах: выраженной степени одного или умеренной степени в обоих, Культи одной нижней конечности, пригодная для типичного протезирования

15.1.6.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Ограничение движения выраженной степени обоих тазобедренных суставов. Культи одной нижней конечности на любом уровне бедра при ампутационной культе другой нижней конечности на уровне голени. Двусторонние ампутационные культи на уровне нижней и средней трети бедер. Двусторонние ампутационные культи на уровне голени и стоп
15.1.6.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Анкилоз обоих тазобедренных суставов в функционально невыгодном положении со значительно выраженным нарушением статодинамической функции. Культи обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедер
Последствия травм коленного сустава						
15.1.6.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В	Ограничение движения в одном или обоих коленных суставах незначительной/умеренной степени. Анкилоз коленного сустава в

					799	функционально выгодном положении (положение сгибания от 10 - 15°)
15.1.6.6					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с умеренными нарушениями статодинамических функций. Культи одной нижней конечности на любом уровне голени при опороспособности и подвижности другой нижней конечности
15.1.6.7					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с выраженными нарушениями статодинамических функций. Культи одной нижней конечности на любом уровне голени при частичной потере опороспособности и подвижности другой нижней конечности. Культи обеих нижних конечностей на любом уровне голени
Последствия травм голеностопного сустава, пальцев ног, стоп, культи стоп						
15.1.6.8					Нарушения нейромышечных, скелетных	Анкилоз голеностопного сустава в функционально

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, 799	выгодном/невыгодном положении (сгибание/разгибание 0° - 5°) одно- или двустороннее. Анкилоз пальцев одной или обеих стоп в функционально выгодном положении или деформация пальцев одной или обеих стоп. Культи стопы односторонняя: по Лисфранку; в области плюсневых костей по Шарпу. Отсутствие всех пальцев обеих стоп
15.1.6.9					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Культи стопы односторонняя: по Пирогову; по Шопару. Культи обеих стоп: по Лисфранку, Шарпу II - III
15.1.6.10					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Культи обеих стоп: по Пирогову
15.1.7			Последствия травм, захватывающих несколько областей тела	T94		

15.1.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч). Отсутствие одной верхней конечности и отсутствие одной нижней конечности вне зависимости от стороны поражения. Культи одной верхней конечности на любом уровне плеча и культи одной нижней конечности на любом уровне бедра вне зависимости от стороны поражения. Культи обеих верхних и обеих нижних конечностей
15.1.8		Перелом пояснично- крестцового отдела позвоночника и костей таза (отдаленные последствия)		T94		
15.1.8.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Стабильное тазовое кольцо, дегенеративные изменения крестцово-подвздошных суставов с незначительными нарушениями функций организма

					МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	
15.1.8.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539; В 610 - 639	Деформации тазового кольца, осложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с умеренными нарушениями функций организма
15.1.8.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Деформации тазового кольца, осложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с выраженными нарушениями функций организма

Приложение N 2
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АХЭП - антихолинэстеразные препараты;

БЦЖ - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки;

БЭН - белково-энергетическая недостаточность;

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

ВК - врачебная комиссия;

ВРВ - варикозно расширенные вены;

ВРВП - варикозно расширенные вены пищевода;

ДН - дыхательная недостаточность;

ИФР - инсулиноподобный фактор роста;

ИМТ - индекс массы тела;

МБТ - микобактерии туберкулеза;

МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МПКТ - минеральная плотность костной ткани;

МРТ - магнитно-резонансная томография;

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты;

НЯК - неспецифический язвенный колит;

ОНР - общее недоразвитие речи;

ПГ - портальная гипертензия;

ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;

ПНД - психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;

СНР - системное недоразвитие речи;

СТГ - соматотропный гормон;

ТМО - твердая мозговая оболочка;

ФА - фенилаланин;

ФК - функциональный класс;

ФКУ - фенилкетонурия;

ХАН - хроническая артериальная недостаточность;

ХБП - хроническая болезнь почек;

ХВН - хроническая венозная недостаточность;

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;

ХЕ - хлебная единица;

ХСН - хроническая сердечная недостаточность;

ЦНС - центральная нервная система.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами
1	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I)			A00 - B99		

Примечание к пункту 1.

Количественная оценка степени нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечно-сосудистой, других систем) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличия выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида лечения (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к нему.

1.1			Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A15 A16		
1.1.1					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функции дыхательной системы;

					МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных изменений и осложнений. Отсутствие дыхательной недостаточности или ДН степени
1.1.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) периоде потери активности и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзные очаговые изменения). С ДН I степени, переходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии). Наличие МБТ+ 6 и более месяцев

1.1.3					<p>Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) периоде потери активности и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы) и осложнений. Наличие ДН II, III степени ХСН IIa стадии</p>
1.1.4					<p>Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функции организма вследствие наличия полиорганного осложнения (амилоидоз, полисерозит, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени ХСН IIb или III стадии</p>
1.2			<p>Туберкулез нервной системы</p> <p>Туберкулез других органов</p> <p>Милиарный (диссеминированный,</p>	<p>A17</p> <p>A18</p> <p>A19</p>		

			генерализованный) туберкулез легких			
1.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функций организма вследствие проявления туберкулеза различной локализации в периоде потер активности (рубцевание обызвествление; МБТ-); пр эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие дыхательной недостаточности или наличия ДН I степени
1.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма вследствие проявления туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ) и /или осложнений. Наличие ДН II степени преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН

					<p>метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	или ХСН I стадии)
1.2.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие проявления туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественно или широкой лекарственно устойчивости микобактериям туберкулеза. Наличие ДН II, III степени ХСН IIA стадии</p>
1.2.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных,</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные</p>

					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, кахексия и прочее); Неэффективность или резистентность к терапии</p> <p>Наличие ДН III степени ХСН IБ или III стадии</p>
1.3			Последствия туберкулеза	B90		
1.3.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезные дистрофические изменения плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств</p>

					связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	и прочее, МБТ-) пр отсутствии дыхательно недостаточности либ наличии ДН I стадии
1.3.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБТ-). Наличие ДН II степени преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН или ХСН I стадии)
1.3.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных

					<p>(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, распространенные буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБТ-). Наличие ДН II III степени ХСН IIА стадии</p>
1.3.4				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 -</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (распространенные фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения значительной протяженности плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств</p>	

					799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	и прочее, МБТ-). Наличие ДН III степени, ХС IIБ или III стадии
1.4		Осложнения после введения вакцины БЦЖ		Y58		
1.4.1			Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит)	Y58.0		
1.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения при наличии незначительных нарушений функций организма
1.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения при наличии умеренных нарушений функций организма; 0 - 7 лет: на период длительного (более 6 месяцев) лечения, включающего специфическую противотуберкулезную терапию двумя и более препаратами
1.4.1.3					Нарушения	Для детей в возрасте 0 - 1

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 430 - 439	лет: после завершения лечения при наличии выраженных нарушений функций организма
1.5			Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Бессимптомный инфекционный статус	B20 - B24 Z21		
1.5.1					Нарушения функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: бессимптомный инфекционный статус вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая); стадия 4А (вторичные заболевания), фаза ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
1.5.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4 (вторичных заболеваний) фаза прогрессирования.

					(статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Умеренные нарушения функций организма
1.5.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичные заболеваний) независимо от фазы заболевания. Выраженные нарушения функций организма
1.5.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ВИЧ-инфекция:

					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	стадия 4В (вторичные заболевания) независимо от фазы заболевания; терминальная стадия. Значительно выраженные нарушения функции организма
2	Новообразования (класс II)			C00 - D48		

Примечание к пункту 2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при злокачественных новообразованиях зависит от клинико-морфологических факторов прогноза; локализации и размера опухоли (до 2 см, от 2 до 5 см, 5 см и более); анатомической локализации (эндофитная, экзофитная, смешанная); темпа роста опухоли, степени прорастания стенки органа (степень инвазии); гистологического варианта дифференцировки опухоли (высокодифференцированная, средней степени дифференцировки, низкодифференцированная, недифференцированная); распространенности поражения лимфатических узлов; наличия или отсутствия отдаленных метастазов (в лимфатические узлы или другие органы); активности опухолевого процесса (клиническая классификация по системе TNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вмешательства и гистологического исследования). Количественная оценка нарушенных функций организма при опухолях эмбриональной и герминогенной природы, лимфогрануломатозе и других основывается как на классификации TNMG, так и на Международной системе стадирования, одобренной Международным обществом детских онкологов (SIOP - International Society of Pediatric Oncology): INSS (1993) при нейробластоме; PRETEXT и POSTTEXT при гепатобластоме; ABC (2001) при ретинобластоме; SIOP (1992) при нефробластоме; FIGO (1988) при герминогенной опухоли яичников; герминогенных опухолей яичек; Ann-Arbor (1971) при лимфогрануломатозе; PNHLS (2015) - для неходжкинских лимфом. Также необходимо учитывать стадию заболевания до и после оперативного вмешательства, до и после проведения неoadъювантной химиотерапии; оценку гистологического типа опухоли; при количественной оценке степени выраженности нарушенных функций большое значение имеет наличие генетических маркеров, определяющих неблагоприятный онкопрогноз: амплификация гена N-MYC и делеция короткого плеча первой хромосомы (нейробластома); мутация гена RB1 (ретинобластома); мутация WT1, WT2 и WT3 (нефробластома); наличие изохромосомы i в 12p (герминогенная опухоль) и прочее - по результатам молекулярно-генетического исследования. Учитываются также общепатологические факторы (пол, возраст, соматический фон), вид и объем лечения (химиотерапия, гормонотерапия, хирургическое лечение).

лучевая терапия, перфузия противоопухолевыми препаратами, различные комбинации видов лечения), наличие осложнений как самого заболевания, проводимого лечения.

2.1		Злокачественные новообразования		C00 - C97		
2.1.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMG (и/или по международной системе стадирования) на весь период лечения при отсутствии осложнений и наличии положительного результата освидетельствования проводимого лечения</p>
2.1.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой</p>

				и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMG (и/или по международной системе стадирования) на весь период лечения при наличии осложнений; при резистентности опухоли комбинированному лечению или его неэффективности
2.1.3				Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения достижения стойкой ремиссии (5 лет и более) благоприятным онкопрогнозом

					<p>функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	
2.1.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения при наличии осложнений умеренными нарушениями функций организма</p>
2.1.5					<p>Нарушения психических, языковых и речевых,</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p>

					<p>сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>в период проведения лечения и после завершения его при наличии осложнений выраженными нарушениями функций организма</p>
2.1.6					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии рецидивов метастазов, продолженног роста опухоли посл радикального лечения других осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма</p>

					<p>метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	
2.1.7		Злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата	Ретинобластома	C69, C69.2	<p>Нарушения психических функций, функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 430 - 439, В 210 - 229, В 810 - 849</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведения операции по удалению глазного яблока в зависимости от имеющихся нарушений функций организма. Двухсторонняя ретинобластома после комплексного лечения в зависимости от имеющихся нарушений функций организма.</p>

(пп. 2.1.7 введен [Приказом](#) Минтруда России от 19.01.2021 N 17н)

Примечание к [подпунктам 2.1.3 - 2.1.6.](#)

При повторном освидетельствовании количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет проводится с учетом проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, наличия противопоказаний к оперативному лечению и возможности проведения только паллиативного вмешательства, а также с учетом неэффективности проводимой терапии (химиотерапия, лучевая терапия и их комбинации).

2.2			Доброкачественные новообразования	D00 - D48		
-----	--	--	-----------------------------------	-----------	--	--

Примечание к подпункту 2.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при доброкачественных новообразованиях зависит от размера опухоли, темпа роста опухоли, гормональной активности, наличия рецидива или продолженного роста после удаления, степени влияния на органы (сдавление, смещение); возможности радикального удаления, результатов проведенной операции (осложнение, дефицит структур, нарушение органа), гистологической структуры опухоли. Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза являются опухоли в локализации с быстрым ростом, вызывающие сдавление и дислокацию ствола мозга; неэффективность лечения (продолженный рост опухоли), необходимость хирургического лечения.

2.2.1				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и/или органов; гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли</p>
2.2.2				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при больших размерах опухоли</p>

					<p>(статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>влиянием на положение функцию смежных органов требующих оперативного лечения; при быстром росте опухоли с появлением влияния на положение функцию смежных органов невозможности радикального ее устранения (возможность лишь частичного удаления), гормонально активные опухоли, приводящие умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма</p>
2.2.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при быстром росте опухоли выраженным влиянием на положение и функцию смежных органов невозможности радикального ее удаления; гормонально активные опухоли, приводящие выраженным нарушениям функций организма; после</p>

					МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма
2.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849, В 898 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функций организма, невозможность радикального оперативного лечения или посл проведенного оперативного лечения
3	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные			D50 - D89		

	нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), и патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представленная в других классах болезней					
--	--	--	--	--	--	--

Примечание к [пункту 3](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях крови, кроветворных отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного частоты и тяжести кризов, наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеугрожающие), поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэза, компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии; наличия осложнений (в том числе от проводимого лечения); степени нарушения функции других органов и систем организма, прогноза заболевания.

3.1		Другие болезни крови и кроветворных органов		D70 - D77		
3.1.1			Гипоспленизм (аспления послеоперационная, атрофия селезенки) Врожденные аномалии селезенки (аспления)	D73.0 Q89.0		
3.1.1.1					Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 1

					системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки
3.1.1.2					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие рецидивирующей инфекционной патологии приводящих к осложнениям умеренными нарушениями функций организма
3.1.2			Агранулоцитоз	D70		
3.1.2.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при отсутствии осложнений после проведенного эффективного лечения достижения стойкой длительной ремиссии
3.1.2.2					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии
3.1.2.3					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений

						выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии
3.1.2.4					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии Необходимость трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
3.2		Гемолитические анемии Серповидно-клеточные нарушения Другие апластические анемии Другие анемии		D55 - D59 D57 D61 D64		
3.2.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: нетяжелая степень апластической анемии (отсутствие необходимости регулярных трансфузий

					<p>мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>эритроцитарной массы и/или тромбоконцентрата); легкая форма гемолитической анемии (гемолитическими кризов нет или они редкие, интервалом в несколько лет); длительная ремиссия после спленэктомии по поводу гемолитической анемии; при серповидно-клеточных нарушениях - редкие (не чаще 2 раз в месяц) болевые кризы купируемые НПВП (общий режим)</p>
3.2.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая степень апластической гемолитической анемии средней тяжести (наличие гемолитических кризов средней частоты - 1 - 2 раза в год) на фоне постоянной базисной терапии с развитием анемии, требующей заместительной терапии направленной на стабилизацию гемоглобина; при серповидно-клеточных нарушениях - частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые ненаркотическими анальгетиками, требующие соблюдения домашнего режима</p>

						режима или обращений за неотложной помощью
3.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушение психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сверхтяжелая степень апластической анемии; тяжелая форма гемолитической анемии (частые гемолитические кризы - более 2 раз в год); наличие осложненных заболевания и проводимого постоянного базисного лечения; при серповидно-клеточных нарушениях - частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые анальгетиками (включая наркотические) и/или требующие госпитализации
3.3			Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга)	Z94.8		
Первичное освидетельствование						
3.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после трансплантации костного мозга на срок 5 лет (период лечения)

					мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	
Повторное освидетельствование (через 5 лет после трансплантации костного мозга)						
3.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевого выделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениями функций организма
3.3.3					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевого выделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениями функций организма

					429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	
3.3.4					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженными нарушениями функций организма
3.4		Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		D65 - D69		

Примечание к подпункту 3.4.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных гекоагулопатией, тромбоцитопатией и пурпурой, основывается на оценке тяжести заболевания, которая коррелирует с частотой и объемом заместителей частотой и разновидностью кровотечений, а также с эффективностью проводимой терапии.

3.4.1			Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия А)	D66		
			Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия В)	D67		

		<p>В)</p> <p>Болезнь Виллебранда</p> <p>Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия С)</p> <p>Наследственный дефицит фактора I (фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинемия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII (стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стюарта-Прауэра);</p> <p>наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего); дисфибриногенемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена</p> <p>Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими</p>	<p>D68.0</p> <p>D68.1</p> <p>D68.2</p> <p>D68.3</p> <p>D68.3</p>		
					в

			<p>крови антикоагулянтами</p> <p>Ингибиторы к факторам свертывания крови</p> <p>Приобретенный дефицит фактора свертывания</p> <p>Различные комбинации врожденного дефицита II, VII, IX и X факторов свертывания</p>	D68.4		
3.4.1.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы;</p> <p>МКФ: В 430 - 439</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза год) кровотечениями, требующими обращения медицинскую организацию не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии;</p> <p>отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы;</p> <p>нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах).</p> <p>Для гемофилии А и В минимальная степень</p>

						активности факторо свертывания VIII/IX 5% более
3.4.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующим заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год. Для гемофилии А и В минимальная степень активности факторо свертывания VIII/IX от 2 до 5%
3.4.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с частыми повторными (от 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год. Наличие гемофилическо

					<p>психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p>	<p>артропатии 1 и более крупных суставов; наличие умеренной/выраженной контрактуры одного крупного сустава. Для гемофилии А и В минимальная степень активности фактора свертывания VIII/IX менее 1/2%. Регулярное использование концентратов фактора свертывания крови и/или препаратов крови профилактической целью</p>
3.4.1.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелые формы заболеваний частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным) на фоне постоянной терапии кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния в внутренние органы более 1 раз в год, и/или любой эпизод внутримозгового кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечной</p>

						<p>кровотечений. Для гемофилии А и В минимальная степень активности фактора свертывания VIII/IX мене 1%. Наличие ингибиторно гемофилии с титро ингибитора > 0,6 БЕ</p>
3.4.2			<p>Качественные дефекты тромбоцитов: тромбастения, болезнь Гланцманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пулов хранения тромбоцитов, дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы.</p> <p>Другие первичные тромбоцитопении МУН9- ассоциированная тромбоцитопения, семейная тромбоцитопения с предрасположенностью к миелодисплазии, синдром "серых" тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопения и другие</p>	<p>D69.1</p> <p>D69.4</p>		

3.4.2.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения медицинскую организацию не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы; нерегулярное использование концентратов фактора свертывания крови и/или препаратов крови профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах); для гемофилии А и В активность фактора свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень активности фактора свертывания VIII/IX)</p>
3.4.2.2					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или</p>

					сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год для гемофилии А и В активность фактора свертывания VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности фактора свертывания VIII/IX)
3.4.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний повторными (более 1 до 6 раз в год) кровотечениями требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синовита и/или артропатии одного крупного сустава; для гемофилии А и В активность фактора свертывания VIII/IX 1 - 2% (учитывается минимальная степень активности фактора свертывания VIII/IX); регулярное использование концентратов фактора

						свертывания крови и/или препаратов крови профилактической гемостатической целью
3.4.2.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;</p> <p>МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>тяжелые формы заболеваний частыми повторными (6 более раз в год кровотечениями, с склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния в внутренние органы более раз в год, и/или любой эпизод внутримозгового кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений:</p> <p>признаки хронического синовита и/или артропатии более чем одного крупного сустава;</p> <p>для гемофилии А и В активность фактора свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности фактора свертывания VIII/IX); наличие ингибиторной гемофилии с титром</p>

						ингибитора > 0,6 БЕ
3.4.3			<p>Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V- мутация Лейдена); мутация гена протромбина FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов C и S</p> <p>Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта</p>	D68.5		
				D68.6		
3.4.3.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевания пр отсутствии тромбоза анамнезе, требующа первичной фармакологической антитромботической профилактики только ситуациях присоединившегося высоког тромботического риск (тяжелый инфекционны процесс, крупны</p>

					МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	хирургические вмешательства и прочее)
3.4.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики
3.4.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания повторными спровоцированными тромбозами (не более 2-случаев) или с 1 случаем спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант), требующая курса вторичной профилактики. Дефицит протеина

					функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	С/S/антитромбина от 12 до 50% у детей в возрасте старше 1 года
3.4.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем с 1 случаем идиопатического тромбоза и/или с 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС внутренних органов тромбоемболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза значительно выраженные нарушения функции организма. Дефицит протеина С/антитромбина менее 12% у детей в возрасте старше 1 года
3.4.4			Пурпура и другие геморрагические состояния Идиопатическая тромбоцитопеническая	D69 D69.3		

			пурпура			
3.4.4.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевания (снижение тромбоцитов от 3 000 до 50 000/мкл), лечение преимущественно амбулаторных условиях
3.4.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 2 000 до 30 000/мкл) необходимостью стационарного лечения применения гормональной цитостатической терапии агонистам тромбопоэтиновых рецепторов (далее - ТПС) и/или необходимостью переливания компонентов крови реже 1 раза в месяц
3.4.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 10 000 до 2 000/мкл) с необходимостью стационарного лечения применения гормональной цитостатической терапии

					систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	терапии агонистами ТПО и/или необходимости переливания компоненто крови не реже 1 раза месяц наличие кровоизлияний в внутренние органы
3.4.4.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания стойкое снижение тромбоцитов менее 1000/мкл с необходимостью стационарного лечения применения гормональной цитостатической терапии или терапии агонистами ТПО длительно (до 6 месяцев более) и/или необходимости переливания компоненто крови чаще 1 раза в 1 месяц; кровоизлияния во внутренние органы, спонтанные кровотечения, опасные для жизни
3.5		Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный		D80 - D89		

		механизм				
3.5.1			<p>Иммунодефициты преимущественной недостаточностью антител</p> <p>Комбинированные иммунодефициты</p> <p>Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами</p> <p>Обычный переменный иммунодефицит</p> <p>Другие иммунодефициты</p> <p>Дефект в системе комплемента</p>	<p>с D80</p> <p>D81</p> <p>D82</p> <p>D83</p> <p>D84</p> <p>D84.1</p>		
3.5.1.1					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы;</p> <p>МКФ: В 430 - 439</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>без клинической симптоматики или с редким (до 3 - 4 раз в год) недлительными (10 - 14 дней) инфекционными заболеваниями различной этиологии, поддающимися базисной терапией минимальные изменения данных лабораторно-иммунологического обследования (согласно</p>

						заклучению иммунолога). Отсутствие осложнений ил осложнения незначительными нарушениями функци организма
3.5.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно- сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие инфекционны осложнений с умеренным нарушениями функци организма на фон постоянной базисной терапии
3.5.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно- сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие инфекционны осложнений с выраженным нарушениями функци организма на фон постоянной базисной терапии

4	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, представленная в других классах			E00 - E90		
---	--	--	--	-----------	--	--

Примечание к [пункту 4](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевания, выбора клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов лечения и реабилитации. Особенностью эндокринной патологии детского возраста является компенсация на фоне своевременно начатой заместительной терапии. Вместе с тем, склонность к хроническому прогрессирующему течению эндокринопатий при отсутствии компенсации на фоне заместительной терапии. Стойкое нарушение функций организма, нарушение физического, полового и психомоторного развития ребенка уже на ранних сроках развития (до 3 лет).

4.1		Болезни щитовидной железы		E00 - E07		
4.1.1			Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом	E03.0		
			Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.1		
4.1.1.1					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения

					и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429	психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: незначительное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS)
4.1.1.2					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: умеренное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 55 - 69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 55 - 64 баллов (взрослый WAIS)
4.1.1.3					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии:

					<p>метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429</p>	<p>0 - 3 года: выраженное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития</p> <p>4 - 17 лет: IQ = 35 - 55 баллов</p>
4.1.1.4					<p>Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии:</p> <p>0 - 3 года: значительное выражение отставания физического, психомоторного и раннего речевого развития,</p> <p>4 - 17 лет: IQ < 35 баллов</p>
4.2		Сахарный диабет		E10 - E14		

Примечание к подпункту 4.2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных сахарным диабетом (далее - СД) в детском возрасте, учитывает длительность и характер течения заболевания в различные возрастные периоды, лабильность течения, наличие осложнений, а также способность самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания, то есть подсчет хлебных единиц, адекватности количества вводимого инсулина, технику введения инсулина, оценку потребности в инсулине короткого действия на 1 ХЕ в различных ситуациях, возможность коррекции его дозы в зависимости от исходного уровня гликемии; обученность ребенка производить измерения уровня глюкозы в крови глюкометром с последующим анализом зарегистрированных показателей (ведение дневника самоконтроля).

Данные навыки оцениваются, исходя из уровня эмоционально-волевой зрелости, состояния когнитивных процессов и уровня интеллектуального развития (на основании заключения ВК медицинской организации с привлечением психолога, по показаниям - психиатра) и в среднем формируются при

заболевания не менее 3 лет.						
4.2.1			Инсулинзависимый сахарный диабет	E10		
4.2.1.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии сформированного устойчивого самоконтроля в течение заболевания осуществлением терапии при компенсации сахарного диабета и/или при незначительном нарушении функции со стороны органов-мишеней и отсутствии осложнений
4.2.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при повторном освидетельствовании: достижение полной или частичной эффективности проводимой терапии (адекватность инсулинотерапии, в том числе помповой), в возрастной группе, в которой заболевание невозможно самостоятельным контролем за течением заболевания

						осуществлением инсулинотерапии
4.2.1.3					<p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 15 - 18 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при повторном освидетельствовании при наличии одного или нескольких показателей: - лабильного течения диабета (колебания гликемии в пределах 10 ммоль/л и более в течение 10 дней по данным глюкометра), в том числе на фоне помповой инсулинотерапии; наличие 1 и более верифицированных осложнений при длительности заболевания 3 и более лет незначительными нарушениями функций организма; верифицированного осложнения (осложнений) умеренными нарушениями функций организма: при отсутствии сформированного устойчивого самоконтроля в течение заболевания осуществлением терапии при длительности заболевания не</p>

						менее 3 лет (по заключении ВК медицинско организации)
4.2.1.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при повторном освидетельствовании при наличии верифицированного осложнения (осложнений) выраженными нарушениями функций организма
4.3		Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы		E16		
4.3.1			Другие формы гипогликемии (гиперинсулинизм)	E16.1		
4.3.1.1					Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: редкие (2 - 3 раза в год) легкие гипогликемии при отсутствии или наличии незначительных нарушений функций

					<p>функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559</p>	<p>организма; 0 - 3 года: незначительные нарушения физического психомоторного, раннее речевого развития; 4 - 17 лет: незначительные когнитивные нарушения</p>
4.3.1.2					<p>Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гипогликемии средне частоты (1 - 2 раза в месяц) развитием умеренны нарушений функци организма; 0 - 3 года: умеренно нарушение физического психомоторного, раннее речевого развития; 4 - 17 лет: умеренны когнитивные нарушения</p>
4.3.1.3					<p>Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: частые тяжелые гипогликемии (более 2 раз в месяц) требующие помощи други лиц, с развитием выраженны нарушений функци организма. 0 - 3 года: выраженно нарушения физического психомоторного, раннее речевого развития; 4 - 17 лет: выраженны когнитивные нарушения</p>

4.4		Нарушения других эндокринных желез		E20 - E35		
4.4.1			Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур	E20 E89.2		

Примечание к подпункту 4.4.1.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гипопаратиреозе зависит от частоты и вида тетаний (сокращений скелетных мышц; дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в сыворотке кальция и фосфора в моче).

4.4.1.1					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких тетаний преимущественно скелетных мышц, отсутствия или наличие незначительных изменений показателя фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0 - 3 года: незначительное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития.
4.4.1.2					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения

					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	<p>функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных дыхательных, мышц ЖКТ и/или наличия умеренных изменений показателя фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0 - 3 года: умеренное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития</p>
4.4.1.3					<p>Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных дыхательных, мышц ЖКТ и/или наличия выраженных значительно выраженных изменений показателя фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара) наличие резистентности проводимой терапии активными метаболитами витамина D и их аналогами. 0 - 3 года: выраженно</p>

						отставание физического психомоторного, раннее речевого развития
4.4.2			Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидных желез	E21		

Примечание к подпункту 4.4.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гиперпаратиреозе зависит от нарушений функций двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформация костей, патологические переломы), и висцеральных нарушений.

4.4.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 529, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии (или начальных проявлениях) клинико-лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствующего остеопения или остеопороз (от -1,0 до -2,0) и/или незначительные изменения показателей фосфорно-кальциевого обмена при отсутствии Rg-признаков гиперпаратиреоза; отсутствие переломов длинных трубчатых костей; отсутствие костных деформаций или незначительные (в пределах 10°) деформации конечности или позвоночника
---------	--	--	--	--	---	--

						<p>без нарушения или незначительным нарушением их функций;</p> <p>отсутствие или незначительные нарушения мочевыделительной системы и/или функций пищеварительной системы</p>
4.4.2.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 529, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>умеренные нарушения функций организма при наличии клинических лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза</p> <p>Z-критерий соответствующего тяжелому остеопорозу - (от 2,0 и менее с переломами и/или наличие начальных Rg признаков (кисты в трубчатых костях, субпериостальная резорбция концевых фаланг, снижение высоты тел позвонков) и/или наличие умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена;</p> <p>патологические переломы до 1 раза в год, требующие лечения (в том числе оперативного);</p> <p>деформация оси конечности более 10°, но менее 20°</p> <p>вторичная деформация ос</p>

						позвоночника (сколиоз 2 и степень) с умеренным нарушением их функций; умеренные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП до 3 стадии); эпизодические язвенных поражений верхних отделов ЖКТ
4.4.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 529, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма при наличии клинических лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза Z-критерий соответствующего тяжелому остеопорозу - (от 2,0 и менее множественными переломами) и/или наличие отчетливых Rg-признаков (кисты трубчатых костей, переломы костей таза, компрессионные переломы тел позвонков и/или наличие выраженных (или значительных) изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена; частые спонтанные патологические переломы (более 1 раз в год), требующие лечения (в том числе

						<p>оперативного); выраженная (20° и более деформация оси конечности возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с выраженным нарушением и функций; выраженные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП 4 стадии); многократные эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ</p>
4.5			<p>Гипопитуитаризм</p> <p>Преждевременное половое развитие</p> <p>Низкорослость, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Низкорослость ахондропластическая, гипохондропластическая</p> <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p> <p>Болезнь Олье</p> <p>Синдром Нунан</p> <p>Синдром Рассела-</p>	<p>E23.0</p> <p>E22.8 E30.1</p> <p>E34.3</p> <p>Q77.4</p> <p>Q77.7</p> <p>Q78.4</p> <p>Q86.1</p> <p>Q87.1</p>		

			Сильвера			
			Синдром Шерешевского-Тернера	Q96		

Примечание к подпункту 4.5.

Оценка физического развития и степень его задержки у детей проводится в соответствии с количеством стандартных отклонений (SD) соответствующего возраста и пола или по эпикризным срокам. Эпикризным сроком для возраста от 0 до 12 месяцев является 1 месяц, от 1 года до 2 лет - 2 месяца, от 2 до 3 лет - 6 месяцев, старше 3 лет - 1 год. После закрытия ростовых зон критерием установления категории "ребенок-инвалид" является оценка отклонений (SDS роста) для соответствующего возраста. При оценке низкорослости учитывается ее выраженность, а также нарушения функций организма в случае наследственных синдромов с низкорослостью.

4.5.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функций организма: задержка роста от 2 до 3 SDS или 1 - 2 эпикризных срока до закрытия зон роста. После закрытия зон роста при достижении социального значимого роста
4.5.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма: задержка роста от 4 до 5 SD или на 3 - 4 эпикризных срока при неэффективности

					пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639	заместительной терапии д закрытия зон роста. 14 - 17 лет: после закрытия зон роста социальн значимый рост не достигнут
4.5.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма: задержка роста более 5 SD или 5 и более эпикризны сроков при неэффективност заместительной терапии д закрытия зон роста. 14 - 17 лет: после закрытия зон роста социальн значимый рост не достигнут
4.6		Гиперфункция гипофиза		E22		
4.6.1			Акромегалия и гипофизарный гигантизм	E22.0		
4.6.1.1					Нарушения психических, сенсорных,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429	акромегалия (гипофизарный гигантизм) легкого течения незначительными нарушениями функций организма
4.6.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) с умеренными нарушениями функций организма; пр неэффективности оперативного лечения (невозможность радикального устранения) и сохранения после оперативного лечения повышенного уровня инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР); отсутствие снижения СТГ в ходе диагностического теста
4.7			Центральный несахарный диабет Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N25.1		
4.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899	несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фоне проводимой терапии; тубулопатии с костными деформациями: варусная деформация нижних конечностей незначительной степени (до 10°). 0 - 3 года: незначительная задержка физического, психомоторного, раннего речевого развития
4.7.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; тубулопатии с костными деформациями: деформация (варусная, вальгусная) нижних конечностей умеренной степени (более 10° но менее 20°)
4.7.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма пр

					<p>функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; наличие осложнений тубулопатии с костными деформациями, требующим оперативного лечения (в период его проведения)</p>
4.8			<p>Синдром и болезнь Иценко-Кушинга вследствие аденомы гипофиза, надпочечников, при злокачественных опухолях различных органов, функциональный гиперкортицизм при различной эндокринной патологии, при приеме высоких доз глюкокортикоидов</p>	E24		
<p>Примечание к подпункту 4.8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных синдромом Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные периферические нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС и др.), а также от наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.</p>						
4.8.1					<p>Нарушения функций эндокринной системы и</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p>

					метаболизма; МКФ: В 540 - 559	легкая форма синдрома отсутствием ил незначительными нарушениями функци организма на фон проводимой терапии.
4.8.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно- сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гиперкортицизм средне тяжести синдрома бе осложнений, с умеренным нарушениями функци организма на фон проводимой терапии
4.8.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно- сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма синдрома прогрессирующим течением на фоне проводимой терап с осложнениями, в том числ от оперативного и/ил лучевого лечения опухоле надпочечников или гипофиза наличие рецидив заболевания, приводящего выраженным нарушения функций организма
4.9			Врожденные	E25.0		

			адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов			
--	--	--	--	--	--	--

Примечание к подпункту 4.9.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденном адреногенитальном заболевании зависит от формы заболевания (вирильная, сольтерьяющая, гипертензивная форма), а также характера течения заболевания (риск развития жизненно опасных состояний).

4.9.1					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: вирильная форма
4.9.2					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сольтерьяющая форма: при отсутствии кризового течения (жизнеугрожающих состояний) на фоне постоянной заместительной терапии
4.9.3					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сольтерьяющая форма: при наличии жизнеугрожающих состояний (кризовых, верифицированных) в условиях медицинской организации на фоне постоянной заместительной терапии
4.9.4					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; сердечно-	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гипертоническая форма

					сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429	
4.10			Гиперальдостеронизм-первичный	E26.0		
4.10.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического вмешательства)
4.10.2					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность медикаментозной терапии)
4.10.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, повторно оперативное лечение, продолженный рост опухоли, резистентность медикаментозной терапии)

4.11			Первичная надпочечниковая недостаточность	E27.1		
4.11.1					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110 - 199, В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стабильное течение заболевания на фоне заместительной глюкокортикоидной минералокортикоидной терапии, отсутствия аддисонических кризов.
4.11.2					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110 - 199, В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие аддисонических кризов средней частоты (3 - раз в год), верифицированных в условиях стационара
4.11.3					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110 - 199, В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие частых аддисонических кризов (более 5 раз в год) верифицированных в условиях стационара
4.12			Полигландулярная дисфункция Аутоимунная полигландулярная	E31 E31.0		

			недостаточность Полигландулярная гиперфункция	E31.1		
<p>Примечание к подпункту 4.12. Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при полигландулярной дисфункции зависит от характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологический процесс), вида и степени нарушенных функций организма, сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем; а также от наличия осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания и эффективности проводимой терапии.</p>						
4.12.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199; В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма
4.12.2					Нарушения психических,	Для детей в возрасте 0 - 1

					<p>языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199; В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического)</p>
4.12.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или наличие осложнений с стороны органа и/или системы, вовлеченной синдром</p>

					связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199; В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899	
4.13			Морбидное ожирение	E66.0 E67.8		
4.13.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ожирение без осложнений либо в сочетании незначительными нарушениями функций организма
4.13.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ожирение с ИМТ более 40, (или SDS ИМТ $\geq 4,0$) в сочетании с умеренными нарушениями функций организма
4.14		Нарушения обмена		E70 - E90		

		веществ				
4.14.1			Классическая фенилкетонурия	E70.0		
			Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.1		

Примечание к подпункту 4.14.1

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных фенилкетонурией (далее - ФКУ), осуществляется в первую очередь, на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму, течение заболевания, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина (далее - ФА) для каждого возрастного периода, учитывает формирование самостоятельности осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, самостоятельный контроль уровня фенилаланина в сыворотке крови на допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии). Данные нарушения формируются у ребенка к 14 годам.

4.14.1.1			Легкая гиперфенилаланинемия (не ФКУ)	E70.1	Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до начала соблюдения диеты или после верификации диагноза при уровне ФА от 2 до 6 мг/дл без соблюдения диеты последующем при соответствующем возрастном физическом, психомоторном и речевом развитии
4.14.1.2			Фенилкетонурия легкая форма (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл)	E70.0	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА от 6 до 20 мг/дл (легкая среднетяжелая форма ФКУ) при соблюдении диеты

					эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539	
4.14.1.3			Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА более 20 мг/дл классическая (тяжелая) форма ФКУ, птерин-зависимая форма ФКУ
4.14.1.4			Фенилкетонурия среднетяжелая (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539	Для детей в возрасте 15 - 17 лет: сохранение уровня ФА от 10 до 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии умеренных нарушений функций организма, умеренное когнитивное снижение, умеренные речевые нарушения, умеренное снижение интеллекта (15 лет IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет IQ = 50 - 64 баллов (взрослый WAIS)); умеренная неврологическая

						симптоматика (умеренная полинейропатия); наличие БЭН II степени
4.14.1.5			<p>Фенилкетонурия Среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл)</p> <p>Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа</p>	<p>E70.0</p> <p>E70.1</p>	<p>Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 15 - 18 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49); выраженные речевые нарушения и/или выраженная неврологическая симптоматика (выраженная полинейропатия, мышечная дистония, парезы и прочее); наличие БЭН III степени</p>
4.14.1.6			<p>Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл)</p> <p>Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) ФКУ II и III типа</p>	<p>E70.0</p> <p>E70.1</p>	<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 18 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительное снижение интеллекта (IQ < 35); значительно выраженная неврологическая симптоматика (гиперкинезы, пароксизмальные расстройства, мышечная</p>

						дистония, парезы и прочее)
4.14.2		<p>Нарушение обмена ароматических аминокислот</p> <p>Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот: болезнь "кленового сиропа" (лейциноз), изовалериановая, метилмалоновая пропионовая ацидемия и другие нарушения</p> <p>Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Тони) (-Дебре), болезнь Хартнупа, синдром Лоу, глутарикацидурия,</p> <p>гомоцистинурия и другие нарушения</p> <p>Другие нарушения обмена углеводов:</p>		<p>E70</p> <p>E71</p> <p>E72</p> <p>E74</p> <p>E75</p>		

		<p>галактоземия, фруктоземия и другие нарушения</p> <p>Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов: болезнь Фабри, Тея-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая лейкодистрофия;</p> <p>недостаточность сульфатазы</p> <p>Нарушения обмена глюкозамино- гликанов мукополисахаридо- зы I, II, III, IV, VI, VII типов)</p> <p>Нарушение обмена гликопротеинов</p> <p>Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии</p> <p>Нарушения обмена пуринов и пиримидинов:</p>		<p>E76</p> <p>E77</p> <p>E78</p> <p>E79</p> <p>E80</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>синдром Леша-Нихена, ксантинурия</p> <p>Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглера-Найяра, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла)</p> <p>Нарушение минерального обмена (болезнь Вильсона-Коновалова, гепатолентикулярная дегенерация)</p>		E83		
--	--	---	--	-----	--	--

Примечание к [подпункту 4.14.2](#)

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при редких орфанных обусловленных нарушении обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов, глюкозаминогликанов, оценка показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогрессивное, кризовое), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, прогноз заболевания.

Для заболеваний, при которых показана диетотерапия, учитывается формирование способности самостоятельно осуществлять контроль за течением заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня аминокислот или других метаболитов на допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии).

4.14.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: кризовое или прогрессирующее течение заболевания, не компенсируемое
----------	--	--	--	--	--	---

					<p>(статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - В 559, В 610 - 639</p>	<p>патогенетической терапией при наличии умеренных нарушений функций организма. 0 - 3 года: умеренная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития</p>
4.14.2.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - В 559, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: кризовое или прогрессивное течение заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапией при наличии выраженных нарушений функций организма; 0 - 3 года: выраженная задержка физического психомоторного и раннего речевого развития</p>
4.14.2.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных,</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: кризовое или прогрессивное</p>

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - В 559, В 610 - 639	течение заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемой патогенетической терапией при наличии значительных выраженных нарушений функций организма; 0 - 3 года: значительная выраженная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития
4.14.3			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с легочными проявлениями	E84.0		
			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с комбинированными проявлениями)	E84.8		
			Кистозный Фиброз неуточненный	E84.9		

Примечание к подпункту 4.14.3

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных муковисцидозом, основывается на активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также на наличии осложнений.

4.14.3.1					Нарушения функций дыхательной, пищеварительной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: формы заболевания без
----------	--	--	--	--	---	---

					эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559	клинической симптоматики или легкое течение заболевания незначительными нарушениями функций дыхательной и пищеварительной систем
4.14.3.2					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форма заболевания с умеренными нарушениями функций организма, первичный или интермиттирующий высев: <i>K. aeruginosa</i> , <i>V. septicus</i> complex, <i>MRSA</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Achromobacter</i> spp., нетуберкулезным микобактериями, грибам рода <i>Aspergillus</i> и другим микробных патогенов синдром потери соли хроническая панкреатическая недостаточность, острый рецидивирующий панкреатит, мекониевый илеус или синдром дистальной кишечной обструкции, кровохарканье, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая

						недостаточность 1 - 2 степени
4.14.3.3					<p>Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 199</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронически инфекционных осложнений вызванных: <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. ceracia complex</i>, <i>MRSA</i>, <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>, <i>Achromobacter spp</i> нетуберкулезными микобактерии, грибами род <i>Aspergillus</i> и другим микробными патогенами повторный синдром потер соли, мекониевый илеус или синдром дистальной интестинальной обструкции легочное кровотечение цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз ассоциированный диабет потребностью в инсулине остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители гастростомы панкреатическая недостаточность с высокой потребностью панкреатических ферментов (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира), частые</p>

						обострения хронического панкреатита, пневмоторакс
4.14.3.4					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 199	Хроническая дыхательная недостаточность кислородозависимостью, ОФВ ₁ < 30% от должного; пациенты находящиеся на листе ожидания на трансплантацию легких и печени
5	Психические расстройства и расстройства поведения (класс V)			F00 - F99		

Примечание к пункту 5.

Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных психическими расстройствами поведения, основывается на типологии, степени выраженности, прогрессивности патопсихологической, психопатологической симптоматики в различные возрастные периоды с учетом возрастной динамики данных расстройств. Независимо от нозологической формы расстройства при оценке степени выраженности психических функций учитывается уровень реабилитационного потенциала организма ребенка (наследственности, половозрастные особенности, состояние иных органов и систем организма), реабилитационного потенциала личности (интеллектуальный, мотивационный и эмоционально-волевой компонент в зависимости от возраста), а также состояние его ближайшей социальной среды (семьи), характер получения образования (обучение по основным общеобразовательным стандартам или по адаптированной программе), маршрут (в возрасте старше 14 лет). Необходимой составляющей является уровень адаптации в основных сферах жизнедеятельности ребенка (семейно-социально-средовой, в ситуации обучения, профессиональной сфере и прочих).

5.1		Нарушения психологического развития		F80 - F89		
5.1.1			Специфические	F80		

			расстройства речи и языка			
			Специфические расстройства развития учебных навыков	F81		
			Смешанные специфические расстройства психологического развития (стойкая задержка развития)	F83		
			Заикание	F98.5		
			Симптомы, признаки, относящиеся к речи и голосу	R47 - R49		

Примечание к подпункту 5.1.1.

Количественная оценка степени выраженности нарушений языковых и речевых функций у детей в возрасте 3 года и старше зависит от уровня (стадии) или системного недоразвития речи (ОНР и СНР соответственно), от вида речевого синдрома и степени выраженности нарушений устной речи (дисартрия, дислалия, заикание, алалия, афазия) и/или письменной речи (дисграфия, дислексия, дискалькулия); нарушений голосообразования (дисфония); значения возраст начала проведения мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации (хирургическая коррекция, медикаментозная, логопедическая, дефектологическая и психологическая коррекция) и их эффективность. Заключение с указанием степени (уровня) общего и специфического недоразвития речи, конкретного вида речевого синдрома и степени его выраженности предоставляет специалист-логопед медицинской организации. При определении количественной оценки степени выраженности языковых и речевых нарушений в возрасте до 3 лет необходимо учитывать темпы формирования речевых навыков, которая рассматривается как нестойкое нарушение языковых и речевых функций. Нарушения языковых и речевых функций в этом возрастном периоде не бывают изолированными, как правило, входят в структуру различных клинических синдромов, обусловленных патологией психической и/или соматической сферы. На формирование речевых функций в данный возрастной период оказывают влияние объем и качество восстановительного лечения, в том числе педагогической и психологической коррекции.

5.1.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций;	Для детей в возрасте 3 - 10 лет: ОНР 3 и 4 уровня речевого развития, СНР легкой степени
---------	--	--	--	--	---	--

					МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299	степени, незначительные проявления речевых синдромов устной письменной речи; незначительные нарушения психических и/или сенсорных функций
5.1.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 10 лет: ОНР 2 уровня речевого развития, СНР средне-умеренной степени, проявления речевых синдромов устной письменной речи; нарушения психических и/или сенсорных функций (незначительные/умеренные)
5.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 10 лет: ОНР 1 уровня речевого развития, СНР выраженной степени, выраженные проявления речевых синдромов устной письменной речи; нарушения психических и/или сенсорных функций (незначительные/умеренные/выраженные)
5.1.2			Общие расстройства психологического развития	F84		

						<p>минимальны, нося адекватный, компенсаторный характер и появляются ситуации тревоги.</p> <p>0 - 3 года: навыки формируются соответственно возрасту либо имеется незначительная задержка (регресс) психомоторного речевого развития социальных навыков.</p> <p>4 - 17 лет: функции речи не нарушены либо имеются незначительные специфические нарушения речи (ОНР 3 или 4 уровня речевого развития/СНР легкой степени).</p> <p>Интеллект не снижен либо снижен незначительно:</p> <p>4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов</p> <p>16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов</p>
5.1.2.1.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>ребенок самостоятельно устанавливает минимальный контакт с окружающими требуется постоянно побуждение. Во время контакта - повышенный уровень нервнойности и боязливости. Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта.</p> <p>"Поведенческий сценарий"</p>

						<p>допускаются минимальные нарушения стереотипов общения, формируя сложные виды аффективной защиты (патологические увлечения, компенсаторные фантазии, лишенные социальной направленности).</p> <p>0 - 3 года: не сформирована познавательная коммуникативная функция речи, имеет место нарушение (регресс) психического речевого развития и задержка формирования поведенческих и социальных навыков;</p> <p>4 - 17 лет: нарушение коммуникативная функция речи, имеются умеренные специфические нарушения речи (ОНР 2/СНР легкой или средней степени). Интеллект не снижен либо снижен от незначительной до умеренной степени (4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов)</p>
5.1.2.1.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ребенок самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможен лишь кратковременный привлечение внимания после побуждения. Избегание</p>

						<p>визуального контакта "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипические поведенческие ритуальны характерны выраженные фобии, обсессивно-компульсивные нарушения регресс ранне сформированных социальных учебных и речевых навыков. Возможно сочетание различными вариантам кататонического синдрома. 0 - 3 года: стойкая выраженная задержка (регресс) психического речевого развития социальных навыков. 4 - 17 лет: выраженные специфические нарушения речи (ОНР 1 уровня/СН тяжелой степени). Интеллект - выраженное снижение: IQ = 35 - 49 баллов</p>
5.1.2.1.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: контакт с ребенком невозможен, привлечение внимания не удается. Отсутствие визуального контакта. Полное отсутствие</p>

						<p>вербального контакта "Поведенческий сценарий" при малейшем изменении постоянства окружающе среды - неуправляемо хаотичное двигательное возбуждение либо полно отрешение от окружающего многочисленные страхи стереотипии, проявления кататонического синдрома. Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты Возможно наличие эпилептических припадков. 0 - 3 года: значительн выраженное нарушени психического, речевог развития и отсутстви элементарных социальных поведенческих навыков. Интеллект: значительн выраженное снижение (IQ 34 баллов)</p>
5.2		Умственная отсталость (интеллектуальная недостаточность)		F70 - F79		

Примечание к подпункту 5.2.

Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при умственной отсталости у ребенка основывается на степени выраженности синдрома интеллектуальной недостаточности, наличии, клиническом варианте и степени выраженности нарушений, соматоневрологической патологии (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие нарушения) и социальном прогнозе на уровне адаптации ребенка в основных сферах жизнедеятельности.

В случае отсутствия в структуре умственной отсталости клинически значимых поведенческих нарушений, соматоневрологической патологии и

оценка степени нарушенных психических функций производится по степени интеллектуальной недостаточности.

У детей в возрасте 3 года и старше степень интеллектуальной недостаточности оценивается по клиническим проявлениям и данным адаптированных теста Векслера: дети от 4 до 7 лет - тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence); тест WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) с нарушениями речи или слуха, с выраженной социально-педагогической запущенностью, с задержками навыков чтения и письма для тестирования детей предпочтительнее использовать детский вариант теста Равена, для тестирования детей и подростков (от 7 до 15 лет 11 месяцев) и тест WAIS (Wechsler Intelligence Scale), предназначенный для тестирования взрослых (от 16 лет и старше). При невозможности оценки степени интеллектуального дефекта теста Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики и возраста ребенка оценка производится только клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).

При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения языковых функций.

5.2.1			Легкая умственная отсталость	F70		
5.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399.	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость при отсутствии сопутствующей симптоматики, либо в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающим незначительной степени, что не приводит к существенным нарушениям адаптации 3 - 7: IQ = 70 - 79 баллов (детский WPPSI или WISC) 8 - 15: IQ = 70 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS)
5.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций	Для детей в возрасте 3 - 17 лет:

					<p>функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399</p>	<p>легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающим умеренной степени существенно затрудняющим адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 баллов (взрослый WAIS)</p>
5.2.1.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающим выраженной степени, что приводит к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC). 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 баллов (взрослый WAIS). Нарушение контроля функций тазовых органов</p>

5.2.2			Умеренная умственная отсталость	F71		
5.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 14 лет: умеренная умственная отсталость (IQ = 35 - 49 баллов) при отсутствии или сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающим выраженной степени, что приводит к выраженной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности, требующей частичного ухода и надзора. Нарушение контроля функций тазовых органов
5.2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 14 лет: умеренная умственная отсталость (IQ = 35 - 49 баллов) в сочетании с значительно выраженными психопатологическими состояниями в структуре дефекта (некорректируемые нарушения аффективно-сферной, поведения, влечений грубая соматоневрологическая симптоматика, значительные выраженные пароксизмальные

						расстройства и прочие расстройства), приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности, требующей в силу необходимости постоянного ухода и надзора. Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов
5.2.3			Тяжелая умственная отсталость	F72		
5.2.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 10 лет: тяжелая умственная отсталость (IQ = 20 - 35 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности, требующей в силу необходимости постоянного ухода и надзора. Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов
5.2.4			Глубокая умственная отсталость	F73		
5.2.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 3 - 10 лет: глубокая умственная отсталость (IQ < 20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности

					МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	необходимостью постоянно ухода и надзора. Отсутствие контроля функций тазовых органов
5.3		Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства		F20 - F29		

Примечание к подпункту 5.3.

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при периодическом (рекуррентном) типе шизофрении зависит от начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) в приступе, длительности и частоты приступов, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной симптоматики; выраженности аффективных нарушений, выраженности регресса, а также скорости формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта), наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, прогноза, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).

5.3.1			Шизофрения, эпизодический ремиттирующий течения тип	F20		
			параноидная	F20.0		
			гебефреническая	F20.1		
			кататоническая	F20.2		
			недифференцированная	F20.3		
			постшизофреническая депрессия	F20.4		
			простой тип	F20.6		
			другой тип	F20.8		

			неуточненная шизоаффективное расстройство	F20.9 F25		
5.3.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: обострения общей продолжительностью до месяцев в год; стойкая ремиссия, наличие незначительной дефицитарной симптоматики без существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка
5.3.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: обострения общей продолжительностью от 2 до месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой; наличие умеренной дефицитарной симптоматики, существенно затрудняющие адаптацию основных сфер жизнедеятельности
5.3.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: затяжные или частые обострения общей продолжительностью от 4 более месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной

						симптоматикой, резистентно к терапии; наличие выраженной дефицитарно-симптоматики, приводящие дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2			Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: параноидная гебефреническая кататоническая недифференцированная постшизофреническая депрессия, остаточная (резидуальная) простой тип другой тип неуточненная	F20.1 F20.2 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9		

Примечание к [подпункту 5.3.2](#).

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при приступообразно-прогредиентной шизофрении зависит от начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов), длительности и частоты приступов.

динамики и степени выраженности дефицитарной (негативной) симптоматики, от выраженности регрессивных расстройств, этапа формирования выраженности и качества ремиссии (дефекта), от наличия интеллектуального снижения, степени выраженности процессуальных изменений личности, синдромов, от наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности; клинического прогноза; уровня социальной адаптации в общественной жизнедеятельности (семейной, бытовой социально-средовой в ситуации обучения).

5.3.2.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399</p>	<p>Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная ремиссия с умеренно дефицитарной симптоматикой; умеренным эндогенными изменениями личности; незначительное/умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов - детский WISC; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 (взрослый WAIS)</p>
5.3.2.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения продолжительностью от 6 до 12 месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, резистентность к терапии, выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности умеренное или выраженное (IQ 35 - 49 баллов) снижение интеллекта; нарушения</p>

						контроля функции тазовых органов
5.3.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 11 лет: обострения продолжительностью более 1 месяца в год, частые обострения с продуктивной симптоматикой (аффективной, кататонической, гебефренической, гебоидной, галлюцинаторно-бредовой, с помрачением сознания); значительная выраженная дефицитарная симптоматика; эндогенные изменения личности; значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 3 баллов); отсутствие контроля функции тазовых органов
5.3.3			Шизофрения, непрерывный течения: тип	F20		
			параноидная	F20.0		
			гебефреническая	F20.1		
			кататоническая	F20.2		
			недифференцированная	F20.3		
			остаточная	F20.5		
			простая	F20.6		

			другой тип	F20.8		
			неуточненная	F20.9		

Примечание к подпункту 5.3.3.

Количественная оценка нарушений психических функций граждан в возрасте до 18 лет при непрерывно-прогредиентном типе течения зависит от вида процесса, темпа течения шизофрении (медленно-, средне-, быстро-прогредиентного), ее формы, стадии процесса, выраженности и стойкости основных синдромов ("позитивного" спектра, синдромов непсихотического регистра, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной выраженности регрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта) при шизофрении, наличия интеллектуального снижения, степени выраженности эндогенных изменений личности (синдрома аутизма), наличия критики к своему состоянию и действительности; прогноза заболевания, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социальной ситуации обучения).

5.3.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: незначительная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, незначительные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы), отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC-III); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) с сохранением критики ситуации в целом, не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение
5.3.3.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: умеренная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, умеренные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы), отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC-III); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) с сохранением критики ситуации в целом, не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение

					399	симптоматика, умеренные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS) существенно затрудняющая адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); умеренно или выраженное (IQ = 35 - 49 баллов) снижение интеллекта нарушение контроля функций тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 -	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: значительно выраженная продуктивная симптоматика и/или дефицитарная симптоматика; значительные выраженные эндогенные

					399, В 510 - 539, В 610 - 639	изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); значительно выраженное снижение интеллекта: IQ < 30 баллов; нарушение или отсутствие контроля функций тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности; необходимостью постоянного ухода и надзора
--	--	--	--	--	-------------------------------	---

Примечание к подпунктам 5.3.3.1 - 5.3.3.4.

Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, средне-прогредиентного

5.3.3.5					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: выраженная продуктивная симптоматика (кататоническая, кататоническая, гебефренная, галлюцинаторная, бредовая и прочие виды симптоматики); плохо поддающаяся терапии выраженная симптоматика не психотического регистра (неврозоподобные, психопатоподобные, аффективные расстройства); выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные проявления синдрома аутизма; выраженное снижение интеллекта (IQ = 30 - 49 баллов); нарушения
---------	--	--	--	--	---	---

						контроля функции тазовых органов с быстрым формированием стойкого выраженного исходного состояния (дефекта) социальной дезадаптации
5.3.3.6					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: выраженная продуктивная симптоматика (гебоидная кататоническая, кататоническая, кататоническая, гебефреническая, кататоническая, галлюцинаторная, бредовая и т.д.), резистентная к терапии, значительная выраженная дефицитарная симптоматика; значительные выраженные проявления синдрома аутизма; значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 30 баллов); нарушение или отсутствие контроля функций тазовых органов с быстрым формированием стойкого значительного выраженного исходного состояния (шизофренического слабоумия)
<p>Примечание к подпунктам 5.3.3.5 - 5.3.3.6. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, быстро прогредиентного (злокачественного).</p>						
5.3.4			Шизофрения,	F21		

			шизотипические состояния и бредовые расстройства			
5.3.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогрессирующее течение со стойкой незначительной симптоматикой непсихотического регистра, незначительной дефицитарной симптоматикой, незначительными эндогенными изменениями личности, отсутствии снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 17 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC), 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS), не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка
5.3.4.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогрессирующее течение со стойкой умеренной симптоматикой непсихотического регистра умеренной дефицитарной симптоматикой, умеренным

						эндогенными изменениями личности; незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS); существенно затрудняющим адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогрессирующее течение со стойко выраженной симптоматикой не психотического регистра; выраженной дефицитарной симптоматикой, выраженными эндогенными изменениями личности умеренное или выраженное (IQ = 35 - 49 баллов) снижение интеллекта; нарушения контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 -	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: значительно выраженные психопатоподобные расстройства, сочетания психопатоподобных расстройств с гебоидными

					399, В 510 - 539, В 610 - 639	синдромом, значительная выраженная истеро-конверсионная симптоматика (истерический амавроз, истерический псевдопаралич нижних конечностей и прочие) с ситуативно неадекватным поведением, отсутствием критики, некорректируемыми нарушениями патологическими влечениями; нарушение или отсутствие контроля функций тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации основных сфер жизнедеятельности, необходимостью постоянного ухода и надзора
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

Примечание к подпунктам 5.3.4.1 - 5.3.4.4.

Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, медленно прогредиентного (вялотекущая шизофрения).

5.4			Расстройства настроения (аффективные расстройства)	F30 - F39		
-----	--	--	--	-----------	--	--

Примечание к подпункту 5.4.

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при аффективных расстройствах (маниакальных, смешанных) зависит от вида симптоматики и интенсивности ее проявлений, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, стойкости и длительности ремиссий, наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинической и социальной болезненности состояния, уровня социальной адаптации в основных сферах жизни ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).

5.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: аффективные расстройства
-------	--	--	--	--	--	--

					МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399	незначительные, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не сказывающиеся на адаптации основных сфер жизнедеятельности
5.4.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкие затяжные или частые аффективные расстройства умеренные, общей продолжительностью более месяцев в год, затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.4.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные аффективные расстройства, затяжные или частые, общей продолжительностью более 1 месяцев в год, приводящие дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.4.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкие затяжные или частые значительно выраженные аффективные расстройства общей продолжительностью более 10 месяцев в год, нуждаемость в постоянном

						уходе и надзоре
5.5.			Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40 - F48		

Примечание к подпункту 5.5.

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при различных формах неврозов детского и подросткового возраста от вида, длительности и динамики невротических расстройств (реакция, состояние, затяжное состояние, невротическое или патохарактерологическое состояние личности), вида и выраженности невротического синдрома (в том числе синдромов регресса - мутизм, регресс навыков опрятности, моторная задержка, неэффективности проводимой терапии, наличия критики к своему состоянию и ситуации; клинической и социальной компенсации болезненного состояния, защитных ритуалов, других методов аффективной защиты), а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейно-социально-средовой, в ситуации обучения).

К незначительным нарушениям психических функций относятся кратковременные невротические состояния (длительность до 1 года) либо стойкий синдром длительностью свыше 1 года с незначительной клинической симптоматикой; к умеренным нарушениям - затяжное невротическое состояние (длительность 5 - 6 лет) при наличии стойких умеренных клинических проявлений (неврастенической, фобической, тревожной, обсессивно-компульсивной, ипохондрической, регрессивной (задержка формирования экспрессивной речи, социальных навыков, навыков опрятности) симптоматики).

5.5.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 7 лет незначительные соматовегетативные расстройства, обсессии (фобии, идеаторные, моторные обсессии) элементами чуждости, формированием простых компенсаторных ритуалов, аффективные нарушения (адинамическая, тревожная депрессия и прочие синдромы дереализации, деперсонализации, симптомов регресса
5.5.2					Нарушения психических, языковых и речевых	Для детей в возрасте 8 - 1 лет:

					функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	незначительные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобические, навязчивые, обсессивные и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома без склонности к затяжному течению
5.5.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 7 лет: сложные обсессии, навязчивости, элементы чуждости, с формированием защитных механизмов (ритуалов), аффективные нарушения (депрессия), синдромы дереализации, деперсонализации, синдром регресса
5.5.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 10 лет: стойкие умеренные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобические, навязчивые, обсессивные, и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома со склонностью к затяжному течению.
5.5.5					Нарушения психических, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: затяжное течение стойки

					МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	выраженных невротических состояний (истерических, неврастенические, фобические, навязчивые, сенестопатические, ипохондрические и прочие состояния) с возможным переходом в патологическое развитие личности
5.5.6					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 14 лет: стойкое невротическое или патохарактерологическое развитие личности с формированием сверхценных идей со значительной выраженной истероконверсионной симптоматикой (истерический амавроз, истерический псевдопаралич нижних конечностей и прочие виды симптоматики)
5.6			Органические, включая симптоматические, психические расстройства Эмоциональные расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте	F04 - F09 F90 - F98		

Примечание к [подпункту 5.6](#)

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при церебрально-органической патологии зависит от н

принадлежности, стадии заболевания; вида и степени выраженности нарушений психических процессов (по органическому или астеническому психоорганическому и астеническому синдромам соответственно), наличия и степени выраженности синдромов личностного регистра (неврозоподобных расстройств) и сопутствующей симптоматики (психотической, аффективной, пароксизмальной и иных видов симптоматики); степени снижения интеллекта, нарушений языковых и речевых функций, а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).

5.6.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные когнитивные нарушения, незначительная или умеренная астеническая симптоматика, незначительный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, незначительный психоорганический синдром, незначительные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные прочие), незначительные аффективные и другие стойкие незначительные расстройства непсихотического регистра не затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. Отсутствие нарушения или незначительное нарушение языковых и речевых функций Отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 3 - 15 лет: IQ = 7</p>
-------	--	--	--	--	---	---

						- 79 баллов (детский WISC WPPSI); 16 - 17 лет: IQ = 65 69 баллов (взрослый WAIS)
5.6.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренное снижение когнитивных процессов, выраженная астеническая симптоматика, умеренный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания, гиперактивностью, умеренный психоорганический синдром, умеренные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные прочие), умеренные аффективные и другие стойкие умеренные расстройства непсихотического регистра, стойкие умеренные синдромы психотического регистра (синдром галлюцинозоподобные, бредовые расстройства), затрудняющие адаптацию основных сфер жизнедеятельности. Возможно сочетание незначительными/умеренными и нарушениями языковых речевых функций и/или незначительным/умеренным

						снижением интеллекта: 3 - 1 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 (взрослый WAIS)
5.6.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженное снижение когнитивных процессов, выраженный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания, гиперактивностью, выраженный психоорганический синдром, выраженные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные), стойкие выраженные аффективные расстройства, другие выраженные расстройства непсихотического регистра, стойкие выраженные синдромы психотического регистра (синдром галлюциноза, бредовые расстройства), приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание умеренными/выраженными нарушениями языковых и речевых функций и/или умеренным/выраженным (IQ

						= 35 - 49 баллов) снижение интеллекта. Нарушение контроля функций тазовых органов
5.6.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выражено снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34); отсутствие контроля функций тазовых органов необходимость в постоянном уходе и надзоре.
5.7			Эпизодические пароксизмальные расстройства	и G40 - G47		
			Другие генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов	виды G40.4		
			Синдром Ландау-Клеффнера	F80.3		

Примечание к подпункту 5.7.

Количественная оценка выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при эпилепсии и эпилептических синдромах зависит от возраста, в котором началось заболевание, причины возникновения патологии (идиопатический или симптоматический генез приступов), локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических припадков; типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремиссионный и прочие), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Выраженность эпилептических приступов оценивается на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии. Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности симптоматики патопсихологического уровня реагирования, интеллектуального и когнитивного снижения, расстройств устной и письменной речи; наличие и степень выраженности нарушений развития психомоторных, речевых функций.

навыков.

Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза при эпилепсии и эпилептических синдромах детского возраста являются злокачественные формы группы так называемых "эпилептических энцефалопатий" с ранним дебютом (на первом году жизни), включающих синдром Отахара, Драве, Айкарди, раннюю миоклоническую энцефалопатию, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическую энцефалопатию с продолженной суккулентной активностью во сне. Для данной группы энцефалопатий характерно злокачественное прогрессирующее течение, резистентность к противосудорожной терапии, отсутствие прогресса психического, речевого и моторного развития ребенка на первом году жизни, формирование тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточности

5.7.1.					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 3 года: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в месяц; и/или незначительная стойкая задержка психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания
5.7.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в месяц; и/или незначительная стойкая задержка психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания

						<p>автоматизм - 1 раз и реже в месяца; и/или наличие незначительной патопсихологической симптоматики, незначительного нарушения устной и/или письменной речи; отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 17 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS)</p>
5.7.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 4 года: легкие припадки (3 - 4 в день) в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальными навыками; тяжелые припадки - 2 раза в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2 - 3 раза в месяц, дисфории 1 раз и реже в месяц; эпилептический статус; серийные припадки - 1 раз в месяц и/или проявления</p>

						стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальными навыками в структуре основного заболевания
5.7.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Дня детей в возрасте 4 - 10 лет: легкие припадки (3 - 4 в день) в сочетании с умеренными изменениями личности умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые припадки - 2 раза в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания и особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2 - 3 раза в месяц; эпилептический статус; серийные припадки - 1 раз в месяц; и/или умеренная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром и прочие); умеренные нарушения устной письменной речи; умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов

						(детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 балла (взрослый WAIS)
5.7.5					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539; В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 года: легкие припадки 5 и более раз в день в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальными навыками; тяжелые припадки с частотой 3 и более раз в месяц, сумеречные расстройства сознания и особые состояния сознания - 3 и более раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 3 и более раз в месяц и более, эпилептический статус, серийные припадки любой частоты (не контролируемые течением, резистентность к терапии) и/или проявления стойкой выраженной задержки (регресса) психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания
5.7.6					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: легкие припадки 5 и более раз в день в сочетании

					и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539; В 610 - 639	выраженной патопсихологической симптоматикой, выраженными изменениями личности; выраженным снижением интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц эпилептический статус серийные припадки любой частоты, сумеречные расстройства сознания и особые состояния сознания - раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц амбулаторные автоматизмы раз в месяц и более и/или стойкая выраженная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром прочие), выраженная симптоматика психотического регистра; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); нарушение контроля функций тазовых органов
5.7.7					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 6 лет: синдромы групп "эпилептических"

				и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	энцефалопатий" (синдром Веста, Айкарди, Отахар Драве, ранний миоклоническая энцефалопатия, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическая энцефалопатия продолженной спайк-волновой активностью во сне и прочие синдромы) с ранним дебютом (на первом году жизни), прогрессирующим течением, резистентностью противозэпилептической терапии, значительной выраженной задержкой развития психомоторных речевых и социальных навыков в структуре основного заболевания
5.7.8				Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: тяжелые припадки - 4 и более раз в месяц, 2 и более сумеречных расстройств сознания или особые состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпистату в месяц; и/или значительная выраженная патопсихологическая симптоматика, симптоматик

						психотического регистра отсутствие речи, значительн выраженное снижени интеллекта (IQ < 34 баллов отсутствие контроля функци тазовых органов
6	Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представленные в других классах			G00 - G99		

Примечание к [пункту 6](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленная заболеванием нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), опоры и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психических и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: клиническая форма, течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизмальных состояний; распространение патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.

6.1		Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин		T90 - T98		
6.1.1			Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия	T90 G09		

			воспалительных заболеваний центральной нервной системы			
6.1.1.1					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез; легкий атактический синдром другие легкие очаговые нарушения. Незначительные нарушения психических, языковых, речевых, сенсорных функций 0 - 3 года: незначительная задержка психомоторного речевого развития в структуре основного заболевания
6.1.1.2					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром другие умеренные очаговые нарушения. Умеренные нарушения психических, языковых, речевых, сенсорных функций 0 - 3 года: умеренная задержка психомоторного и речевого

						развития в структур основного заболевания
6.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения статодинамических функций умеренный тетрапарез выраженный гемипарез выраженный парапарез выраженный парез выраженный атактически синдром и други выраженные очаговы нарушения. Выраженные нарушения психических, языковых речевых, сенсорных функций Нарушение контроля функции тазовых органов. 0 - 3 года: выраженна задержка психомоторного речевого развития в структур основного заболевания
6.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выражены нарушения статодинамической функции значительно выражены парапарез (либо параплегия) значительно выражены гемипарез (либо плегия) выраженный/значительно выраженный тетрапарез

					399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	(тетраплегия); значительная выраженная статическая динамическая атаксия (самостоятельное передвижение невозможно). Значительно выраженные нарушения психических языковых и речевых сенсорных функций. Отсутствие контроля функций тазовых органов. Вегетативное состояние
6.2		Наследственная атаксия		G11		
6.2.1			Врожденная непрогрессирующая атаксия Атаксия Фридрейха (ранняя мозжечковая атаксия) Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК Другая наследственная атаксия	G11.0 G11.01 G11.3 G11.8		
6.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения координации и равновесия, целевой моторики, незначительные легки

					<p>функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429</p>	<p>сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, нарушающие адаптацию функционирование ребенка. Незначительные нарушения функций организма</p>
6.2.1.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения координации и равновесия целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение, препятствующие формированию возрастных навыков. Умеренные нарушения функций организма</p>
6.2.1.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 -</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения координации и равновесия целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые нарушения (значительно затрудняет передвижение, выполнении обычных движений). Выраженные нарушения</p>

					799, В 410 - 429	функций организма
6.2.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения координации равновесия, целевой моторики; значительные выраженные сенситивные атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций
6.2.2			Болезнь Штрюмпелля (наследственная спастическая параплегия) - изолированная и осложненная формы	G11.4		
6.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкий парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов без ограничения объема активных движений); нарушения опоры передвигания, без деформаций стоп формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма
6.2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799	умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов с умеренным нарушением способности к передвижению); формирование деформаций стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма
6.2.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов с выраженным нарушением способности к передвижению с формированием деформаций стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма
6.3			Спинальные амиотрофии	G12		
6.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 года: периферический легкий тетрапарез, умеренный парапарез и/или умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз)

						кифосколиоз) с умеренными нарушениями функциями дыхательной системы. Нарушение формирования двигательных возрастных навыков
6.3.2					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевого выделительной функции; МКФ: В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функциями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение контроля функций тазовых органов
6.3.3					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевого выделительной функции; МКФ: В 310 - 399, В 710 -	Для детей в возрасте 0 - 10 лет: генерализация атрофического процесса: значительный выраженный периферический тетрапарез. Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем достигающих значительной выраженной степени. Значительно выраженные

					799, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639	бульбарные псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов
6.4		Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения		G20 - G26		
6.4.1			Дистония Идиопатическая семейная дистония Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения. Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	G24 G24.1 G25 G26		
6.4.1.1					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкие фокальные генерализованные гиперкинезы не изменяющие физиологическое положение тела, обща целенаправленность движений и действи сохранена. Наличие незначительны

						нарушений психических функций
6.4.1.2					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные фокальные генерализованные гиперкинезы, изменяющие физиологическое положение тела и нарушающие последовательность целенаправленность движений и действий. Наличие умеренных нарушений психических функций
6.4.1.3					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные фокальные генерализованные гиперкинезы (торсионная дистония), сопровождающиеся стойким болевым синдромом, не контролируемые медикаментозным лечением, фиксированным патологическим положением тела, нарушением равновесия последовательности целенаправленности движений и действий. Наличие выраженных нарушений психических функций

6.5		Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		G35 - G37		
6.5.1			<p>Рассеянный склероз</p> <p>Другая форма острой диссеминированной демиелинизации</p> <p>Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы</p>	<p>G35</p> <p>G36</p> <p>G37</p>		
6.5.1.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>отсутствие признаков активности заболевания соответствии с критериями, том числе - по данным МРТ.</p> <p>Отсутствие или незначительные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС.</p> <p>Незначительные нарушения психических функций</p>
6.5.1.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей</p> <p>умеренные бульбарные нарушения; частична</p>

					<p>функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>атрофия зрительных нервов умеренными нарушениями сенсорных функций; другие умеренные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС. Умеренные нарушения психических функций</p>
6.5.1.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей выраженные бульбарные нарушения; нарушения контроля функции тазовых органов, другие выраженные нарушения функции организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС</p>
6.5.1.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей значительно выраженные бульбарные нарушения отсутствие контроля функции тазовых органов, другие значительно выраженные нарушения функций</p>

					МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.6			Наследственная и идиопатическая невропатия	G60		
			Наследственная моторная и сенсорная невропатия	G60.0		
6.6.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осозания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до 4 баллов)
6.6.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осозания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов), изменение походки ("степаж"); незначительная деформация стоп

6.6.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов деформация стоп нарушающая опору передвижение, нарушения координации движений
6.7		Болезни нервно-мышечного синапса и мышц		G70 - G73		
6.7.1			Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70		
6.7.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные формы заболевания (глазная) медленно текущие, незначительными нарушениями функций организма. Генерализованная бульбарная формы незначительными нарушениями функций организма: полная компенсация при лечении

						<p>АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных, краниобульбарных мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать заболевание, регресс симптомов</p>
6.7.1.2					<p>Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные формы заболевания (глотоочная лицевая) с умеренными бульбарными нарушениями, приводящими к умеренным нарушениям функций организма. Медленно текущая генерализованная форма без нарушения дыхания и сердечной деятельности при наличии умеренных статодинамических нарушений (относительная компенсация АХЭП). Умеренно выраженная мышечная слабость</p>

						патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, краниобульбарных мышц на фоне базисной терапии колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток усиливающаяся при физической нагрузке, учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии приводящие к умеренным нарушениям функций организма
6.7.1.3					Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глоточно-лицевая локальная форма с выраженными бульбарными нарушениями приводящими к выраженным нарушениям функций организма. Генерализованная форма миастении с выраженными бульбарными расстройствами и миастеническими кризами малоэффективная тимэктомия; относительная компенсация на фоне приема АХЭП Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или)

						<p>проксимальных сегментов конечностей, краниобульбарных мышц на фоне недостаточной эффективной базисной терапии, тимоэктомии лучевой терапии (при злокачественной тимоме) приводящие к выраженным нарушениям функций организма</p>
6.7.1.4					<p>Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: генерализованная миастения со злокачественным или быстро прогрессирующим течением при неэффективности терапии, с значительно выраженными бульбарными нарушениями приводящими к значительным нарушениям функций органов и систем организма. Значительно выраженная мышечная слабость патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей дыхательных и (или) краниобульбарных мышц (генерализованная форма) быстро прогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительным нарушениям функций организма</p>

						нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использования зондового питания необходимость в постоянно посторонней помощи и уходе
6.7.2			Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии)	G71		
6.7.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 4 баллов сохранением активных движений в суставах в полном объеме. Незначительные нарушения функций организма
6.7.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 3 баллов умеренным ограничением амплитуды активных движений в суставах гипотрофией мышц плечевого и тазового пояса. Умеренные нарушения функций организма

6.7.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 2 баллов выраженным ограничением амплитуды активных движений в суставах выраженная гипотрофия мышц плечевого и тазового пояса. Выраженные нарушения функций организма
6.7.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной силы до 1 балла в верхних и/или нижних конечностях, невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженные нарушения функций организма
6.8			Детский церебральный паралич	G80		

Примечание к подпункту 6.8.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при детском церебральном параличе зависит от клинической формы заболевания, характера и степени выраженности двигательных нарушений (с использованием классификации больших мышц (GMFCS) в возрасте 0 - 17 лет и классификации мануальных способностей (MACS) в возрасте 4 - 17 лет), наличия, сочетания и степени нарушений психических функций (когнитивное снижение, умственная отсталость различных степеней), псевдобульбарного синдрома и связанных с ним нарушений языковых и речевых функций (дизартрия, дисграфия, дислексия и прочие), нарушений сенсорных функций, функций мочевыделительной системы (нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов).

6.8.1			<p>Спастический церебральный паралич (двойная гемиплегия, спастический тетрапарез)</p> <p>Спастическая диплегия</p> <p>Детская гемиплегия</p> <p>Дискинетический церебральный паралич</p> <p>Атаксический церебральный паралич (атонически-астатическая форма)</p>	<p>G80.0</p> <p>G80.1</p> <p>G80.2</p> <p>G80.3</p> <p>G80.4</p>		
6.8.1.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 1-й или 2-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS</p>
6.8.1.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 3-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS. Умеренные нарушения психических, языковых речевых функций</p>

6.8.1.3				<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 4-й уровень функциональной активности по шкале GMFCS и/или MACS. Выраженные нарушения психических языковых и речевых функций Нарушение контроля функций тазовых органов</p>
6.8.1.4		6.8.1.4		<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 5-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS. Значительно выраженные нарушения психических языковых и речевых функций Значительно выраженные двигательные нарушения выраженный или значительный выраженный тетрапарез нижний спастический парализованный, значительный выраженный гемипарез или гемиплегия (мышечная сила балл), нижняя параплеги (мышечная сила 0 баллов) множественными комбинированными контрактурами суставов</p>

						<p>конечностей; фиксированным порочным положением стоп и/или кистей; нарушении координации движений равновесия, значительных затрудняющих вертикализацию, опору, передвижение, либо отсутствие произвольных движений в конечностях туловище, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок помощью).</p> <p>Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез; значительно выраженные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы; значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей; движения в суставах практически отсутствуют (в большей степени вследствие гиперкинезов), значительный выраженный атетоз и/или двойной атетоз и/или торсионная дистония</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>невозможностью вертикализации, опоры передвижения.</p> <p>Значительно выраженная туловищная (статическая) атаксия, значительная выраженная динамическая атаксия, значительная выраженная мышечная гипотония, препятствующая точным движениям, схвату и удержанию предметов, формированию вертикальной позы и произвольных движений.</p> <p>Значительно выраженный псевдобульбарный синдром.</p> <p>Отсутствие устной письменной речи.</p> <p>Значительно выраженные нарушения психических функций:</p> <p>0 - 3 года: значительное выраженное нарушение психомоторного, речевого развития. Отсутствие возрастных и социальных навыков.</p> <p>4 - 17 лет: значительное выраженное когнитивное снижение и/или снижение интеллекта до уровня тяжелой или глубокой умственной отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функций</p>
--	--	--	--	--	--	---

						тазовых органов
7	Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII) Последствия травм с необратимыми изменениями и очевидным нарушением зрения Врожденные аномалии (пороки развития) глаза и уха			H00 - H59 T90.4 Q10 - Q17		

Примечание к [пункту 7](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, травм или дефектами, определяется с учетом возрастной оценки состояния основных зрительных функций (острота зрения в условных единицах зрения в градусах (°)). Степень нарушения функций структур органа зрения, ответственных за зрительное восприятие, оценивается по состоянию функций лучше видящего (или единственного) глаза в условиях оптимальной (максимально переносимой) коррекции. При поражении обоих глаз учитывать остроту и поле зрения каждого глаза отдельно.

Кроме того, учитываются основные факторы патологического процесса и прогноза, влияющие на степень нарушения зрительных функций: форма и течение заболевания, возрастной период, в который наступил зрительный дефект и степень адаптированности ребенка к нему, активность и системность патологического процесса, результаты электрофизиологических и инструментальных методов обследования, оптимальная (максимально переносимая) коррекция зрения или лучше видящего глаза.

В возрасте от 0 до 3 лет (3 г. 11 мес. включительно), а у неконтактных детей до 5 - 7 лет определение основных зрительных функций (количественная оценка остроты зрения; поле зрения) представляет значительные трудности, связанные с особенностями зрительного анализатора, а также возможностью наличия психических функций у ребенка. Достоверные результаты у таких детей можно получить не ранее 10 - 12 лет, в связи с чем следует проводить оценку состояния зрительных функций, основанную на следующих показателях: отсутствие прямой и содружественной реакции зрачка на свет, отсутствие условного рефлекса смыкания век на приближение к глазу яркого предмета, наличие (отсутствие) кратковременного поворота глаз к свету, отсутс

взора, слежения за движением ярких предметов, а также визуально определяемые нарушения структуры тканей глазного яблока, нарушение преломляющих сред глаза, грубые пролиферативные изменения в стекловидном теле и сетчатке, очаговые изменения в центральных зонах сетчатки, частичной или полной отслойки сетчатки, а также изменение формы, размера и цвета диска зрительного нерва. Количественная оценка нарушений функций у детей до 3 лет проводится по факту наличия или отсутствия предметного зрения.

В возрасте 4 лет и старше количественное определение основных зрительных функций (острота, поле зрения, зрительная работоспособность) осуществляется методами, принятыми в детской экспертной офтальмологической практике. При необходимости углубленного обследования используются нистагмометрических, электрофизиологических и офтальмоэргонических, ультразвуковых методов исследований, а также оптической когерентной Гейдельбергской томографии.

7.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 0 - 3 года: наличие предметного зрения
7.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,3. Любая степень концентрического сужения полей зрения лучше видящего (единственного) глаза до 40° при отсутствии скотом
7.3					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 0 - 3 года: отсутствие предметного зрения
7.4					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 10 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,1 до 0,3 включительно.

						<p>Концентрическое сужение поля зрения лучше видящего (единственного) глаза от 39 до 20° включительно.</p> <p>Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза, 5° и менее</p>
7.5					<p>Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)</p>	<p>Для детей в возрасте 4 - 10 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией 0,1 - 0,05 включительно.</p> <p>Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного глаза) от 19 до 10° включительно.</p> <p>Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза менее 10 градусов, но более 5°</p>
7.6					<p>Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)</p>	<p>Для детей в возрасте 4 - 10 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией от 0,04 до 0,02 включительно.</p> <p>Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного) глаза от 9 до 0° включительно.</p>

						Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза 10° более
8	Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII)			H60 - H95		

Примечание к [пункту 8](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости), лучшая (единственного) уха по международной классификации тугоухости. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и место заболевания, возрастной период в котором наступил слуховой дефект, степень адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речевых функций, с нарушением психических функций, факторы прогноза и прочее. При объективизации степени нарушенных функций используются электрофизиологические и другие специальные методы исследования (акустическая импедансометрия, тональная подпороговая аудиометрия, отоакустическая эмиссия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). У детей до 3-х летнего возраста оценка нарушений сенсорных функций производится по результатам объективных методов аудиологического исследования: акустическая импедансометрия, отоакустическая эмиссия, коротколатентные вызванные потенциалы (КСВП), регистрация стационарных слуховых потенциалов (ASSR-тест).

При наличии в структуре тугоухости нарушений языковых и речевых функций, количественная оценка которых превышает количественную оценку тугоухости, экспертная оценка проводится по ведущему речевому дефекту (см. [подпункт 5.1.1](#)).

8.1			Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных)	H60 - H95		
8.1.1					Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: односторонняя тугоухость I - IV степени без речевых нарушений либо незначительными

						нарушениями языковых речевых функций
8.1.2					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость I (20 - 40 дБ) и II степени (41 - 55 дБ) без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых речевых функций. Двусторонняя тугоухость I степени (41 - 55 дБ) при наличии стойких незначительных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций
8.1.3					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость I степени (41 - 55 дБ) при наличии стойких умеренных нарушений языковых речевых функций. Двусторонняя тугоухость II степени (56 - 70 дБ) при отсутствии или наличии стойких нарушений языковых и речевых и/или психических функций (незначительных умеренных)
8.1.4					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость I

					МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199	степени (71 - 90 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохlearной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций
8.1.5					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя глухота (более 91 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохlearной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций
8.1.6					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха); В 310 - 399, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сочетание тугоухости III - IV степени (на одно ухо) и глухоты (на другое). Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций
8.2		Комбинированное нарушение зрения и слуха, а также				

		нарушения артикуляции (речи) и голосообразования				
8.2.1			Слепоглухота			
8.2.1.1					Нарушение сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 210 - 249 (слуха и зрения), В 310 - 399, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость II степени с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом максимально переносима коррекцией 0,1 - 0,05); наличие незначительных умеренных или выраженных нарушений языковых речевых и/или психических функций
8.2.1.2					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха); В 310 - 399, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III или IV степени односторонней или двусторонней; наличие нарушений языковых речевых и/или психических функций различной степени выраженности
8.2.1.3					Нарушения сенсорных, языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199	высокая степень слабовидения (острота зрения (лучшим видящим глазом максимально переносимо коррекцией в пределах 0,1 0,05) в сочетании односторонней или двусторонней тугоухостью II - IV степени; наличие нарушений языковых речевых и/или психических функций различной степени выраженности
8.2.2			Глухонемота			
8.2.2.1					Нарушение сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глухонемота при отсутствии или незначительными нарушениями психических функций
8.2.2.2					Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глухонемота с умеренными или выраженными нарушениями психических функций
8.2.2.3					Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глухонемота со значительными выраженными нарушениями психических функций
8.2.3			Слепоглухонемота			

8.2.3.1					Нарушения психических, сенсорных функций, нарушение языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 249 (слуха и зрения), В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: врожденная или приобретенная полная утрата зрения и слуха, немотивированное наличие нарушений психических функций различной степени выраженности
9	Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах			I00 - I99		

Примечание к [пункту 9](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывается на оценке выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения, гипертонический синдром; легочная гипертензия; нарушения сердечного ритма, кардиогенные синкопальные состояния. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть патологического процесса, степень активности, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.

9.1			Эссенциальная (первичная) гипертензия	I10		
			Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая)	I11		

			<p>болезнь преимущественным поражением сердца). с</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь преимущественным поражением почек с I12</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь преимущественным поражением сердца и почек. с I13</p> <p>Вторичная гипертензия. I15</p> <p>Реноваскулярная гипертензия I15.0</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек I15.1</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям I15.2</p> <p>Другая вторичная гипертензия I15.8</p>		
9.1.1					<p>Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной</p> <p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД н</p>

					системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299	менее 6 месяцев, резистентно к гипотензивной терапии Индекс времени гипертензии по данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) 25 - 50%. Поражения органов-мишеней незначительным нарушением их функции. Артериальная гипертензия I степени высокого риска (наличие 3 или более дополнительных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и/или поражения органов-мишеней и/или наличие сопутствующих состояний)
9.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентно к комбинированной гипотензивной терапии Индекс времени гипертензии по данным СМАД > 50% Артериальная гипертензия I степени. Поражение органов-мишеней с умеренными нарушениями функций организма
9.1.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД не

					<p>мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799</p>	<p>менее 6 месяцев резистентно к комбинированной гипотензивной терапии Индекс времени гипертензии по данным СМАД > 60% Артериальная гипертензия I степени. Поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций организма</p>
9.1.4					<p>Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентно к комбинированной гипотензивной терапии Индекс времени гипертензии по данным СМАД 95 - 100% среднее АД систолическое 150 - 160 мм рт.ст., АД диастолическое 90 мм рт.ст. Поражение органов-мишеней со значительно выраженными нарушениями функций организма</p>
9.2			Сердечная недостаточность Дилатационная кардиомиопатия	I50 I42.0		

			Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия	I42.1		
			Другая гипертрофическая кардиомиопатия	I42.2		
			Эндокардиальный фиброэластоз	I42.4		
			Другая рестриктивная кардиомиопатия	I42.5		
			Последствия травмы внутригрудных органов (сердца)	T91.4		
9.2.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадии, ФК II
9.2.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIa стадии, ФК II, III
9.2.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIb стадии, ФК III, IV

9.2.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, Ф IV
9.3			Хронические ревматические болезни сердца Неревматические поражения митрального клапана Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана	I05 - I09 I34 I35 I36		
9.3.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезни митрального, аортального трикуспидального клапанов незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или I стадии
9.3.2					Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	лет: ревматические неревматические болезни митрального, аортального трикуспидального клапанов умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН II стадии.
9.3.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезни митрального, аортального трикуспидального клапанов выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН II стадии
9.3.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезни митрального, аортального трикуспидального клапано со значительно выраженным нарушениями функци сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии
9.4			Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов	Z95		
9.4.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения

					МКФ: В 410 - 429	функции сердечно-сосудистой системы: ХСН 0 или I стадии
9.4.2					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IА. Наличие имплантированного ЭКС; наличие сосудистого импланта, периодическ требующего замены в связи ростом ребенка
9.4.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IБ стадии. Наличие ЭКС-зависимост при имплантированном ЭКС. Наличие имплантированно кардиовертера-дефибриллятора
9.4.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии
9.5			Наличие трансплантированного сердца	Z94.1		
			Наличие	Z94.3		

			трансплантированных сердца и легкого			
Первичное освидетельствование						
9.5.1					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после трансплантации сердца или одновременно сердца легкого в течение первых лет
Повторное освидетельствование (после 2х летнего наблюдения)						
9.5.2					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
9.5.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениями функций организма
9.5.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений со значительно выраженным

					дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	нарушениями функций организма
9.6			Синдром удлинённого интервала QT Пароксизмальная тахикардия	I45.8 I47		
9.6.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные пароксизмальные нарушения сердечного ритма пароксизмы тахикардии (аритмии) редкие (до 3 - 4 раз в год), кратковременные (минуты, менее часа), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма менее 35% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторинга). Ритм восстанавливается без лечебных мероприятий, при использовании немедикаментозных приемов или после однократного или двукратного приема антиаритмических препаратов. ХСН О или наличие ХСН

						стадии
9.6.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные пароксизмальные нарушения сердечного ритма пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма 35 - 70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторинга); показатель скорректированного интервала QT более 470 мс (по данным ЭКГ); кардиогенные синкопальные состояния (частотные сердцебиения и длительность пароксизма значения не имеют). Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме) использовании антиаритмических препаратов. Наличие ХСН IIА стадии
9.6.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма частые (более 1 раза в месяц) пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные

						<p>тахикардии (представленность эктопического ритма более 70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторинга);</p> <p>стабильное увеличение среднего скорректированного интервала QT более 490 мс (по данным суточного ЭКГ мониторинга);</p> <p>кардиогенные синкопальные состояния при неэффективности терапии на фоне наличия кардиовертера-дефибриллятора (частота сердцебиений и длительность пароксизма значения не имеют).</p> <p>Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме) использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, применении дополнительной симптоматической терапии.</p> <p>Наличие ХСН IIБ стадии, аритмогенная дисфункция миокарда</p>
9.6.4					<p>Нарушение функций сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>значительно выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма</p>

						<p>непрерывно рецидивирующие пароксизмы тахикардии (аритмии), длящиеся от нескольких часов до суток и более; могут возникать без каких-либо провоцирующих факторов; непароксизмальная тахикардии (представленность эктопического ритма за сутки более 80%); рецидивирующие кардиогенные синкопальные состояния.</p> <p>Ритм восстанавливается при систематическом использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, электроимпульсной терапии при применении дополнительно симптоматической терапии.</p> <p>Наличие ХСН III стадии, аритмогенная дисфункция миокарда</p>
9.7			<p>Предсердно-желудочковая атриовентрикулярная блокада полная</p> <p>Фибрилляция и трепетание предсердий</p> <p>Другие нарушения сердечного ритма</p>	<p>I44.2</p> <p>I48</p> <p>I49</p>		
9.7.1					Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 1

					сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	лет: Стойкие незначительные нарушения сердечного ритма, плотность экстрасистолий менее 20% за сутки по данным суточного ЭКГ-мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 15 - 19% от возрастной нормы; превышение длительности пауз ритма по возрасту без нарушения глобальной функции сердца; центральная периферическая гемодинамика не нарушена или нарушены незначительно (ХСН 0 или I стадии)
9.7.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкие умеренные нарушения сердечного ритма, плотность экстрасистолий более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ-мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений ниже 20% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (

						<p>минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд умеренные нарушения глобальной функции сердца (аритмогенная дисфункция миокарда), коронарное кровообращения, церебральной гемодинамики наличие ХСН IIА стадии</p>
9.7.3					<p>Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: постоянные выраженные нарушения сердечного ритма плотность экстрасистол более 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторингирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений пределах ниже 25% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада</p>

						с частотой сокращения желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца; коронарного кровообращения; церебральной гемодинамики; в том числе синкопальные (обморочные) состояния; наличие ХСН IIБ стадии
9.7.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: постоянные значительные выраженные нарушения сердечного ритма с наличием двух и более форм нарушений, относящихся к категории выраженной степени; фибрилляция предсердий; трепетание предсердий; фибрилляция желудочков; полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от нормы; паузы ритма более 3,5 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца; коронарного кровообращения; церебральной гемодинамики; в том числе синкопальные (обморочные) состояния; наличие ХСН III стадии

9.8			Первичная легочная гипертензия	I27.0		
			Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности	I27.8		
9.8.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне неэффективной специфической терапии: ФК ЛГ I
9.8.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ II
9.8.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ III
9.8.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ IV

10	Болезни органов дыхания (класс Х) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других классах болезней			J00 - J99		
----	--	--	--	-----------	--	--

Примечание к [пункту 10](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями органов дыхания, основывается на оценке степени выраженности хронической дыхательной недостаточности. Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, наличие подавления иммунитета, наличие осложнений.

Степень тяжести ДН оценивается, исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови (PaO₂) и сатурации крови кислородом (SaO₂): ДН I степени - PaO₂ 79 - 60 мм.рт.ст., SaO₂ - 90 - 94%; ДН II степени - PaO₂ 59 - 55 мм.рт.ст., SaO₂ - 89 - 85%; ДН III степени - PaO₂ < 55 мм.рт.ст., SaO₂ < 85%.

10.1			Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму)	J40 - J47		
			Болезни легкого, вызванные внешними агентами	J60 - J70		
			Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань	J80 - J84		
			Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей	J85 - J86		

			<p>Другие болезни органов дыхания</p> <p>Синдром Вильсона-Микити</p> <p>Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде</p>	<p>J95 - J99</p> <p>P27.0</p> <p>P27.1</p>		
10.1.1					<p>Нарушение функций дыхательной системы;</p> <p>МКФ: В 440 - 449</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>легкая или среднетяжелая форма течения заболевания; последствия оперативных вмешательств, с редкими обострениями (2 - 3 раза в год), с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии без дыхательной недостаточности (ДН 0) либо с ДН I степени</p>
10.1.2					<p>Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем;</p> <p>МКФ: В 440 - 449; В 410 - 429</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, обострениями 4 - 6 раз в год, бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II степени преходящей или постоянно легочной гипертензии (ХСН или ХСН I стадии)</p>
10.1.3					<p>Нарушения функций</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1</p>

					дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	лет: среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания; последствия оперативных вмешательств, с частыми обострениями (более обострений в год) бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II, III степени ХСН IА стадии
10.1.4					Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств частыми обострениями (обострения более 6 раз в год либо непрерывно рецидивирующее течение заболевания с бронхиальной обструкцией; наличие осложнений, в том числе от оперативных вмешательств; ДН III степени ХСН IIБ, III стадии
10.2			Астма	J45		
10.2.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкое течение заболевания на фоне базисной терапии низкими дозами ингаляционных

					эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 199, В 430 - 439, В 540 - 559	кортикостероидов; контролируемое или частично контролируемое, с редкими (и менее раз в год) сезонными обострениями и/или легкими приступами; ДН 0 или ДН I степени в межприступном периоде
10.2.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 199, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелое и тяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостероидов), частично контролируемое течение более частыми (4 - 6 раз в год) обострениями средней или тяжелой степени тяжести; ДН II степени в межприступном периоде
10.2.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 199, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелое, неконтролируемое течение на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостероидов; с частыми (4 - 6 раз в год) тяжелыми приступами, требующими стационарного лечения, ДН I или ДН II степени в межприступном периоде

10.3			Единственное легкое	Z92.4		
10.3.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие единственного легкого (врожденное, послепульмонэктомии)
10.3.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие единственного легкого (врожденное, послепульмонэктомии) признаками ДН
10.4			Наличие трансплантированного легкого	Z94.2		
Первичное освидетельствование						
10.4.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 44 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после трансплантации легкого в течение первых 2 лет
Повторное освидетельствование (по истечении срока 2х летнего наблюдения)						
10.4.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений

					системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439	умеренными нарушениям функций организма
10.4.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма
10.4.4					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженным нарушениями функций организма
10.5			Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках (трахеостома)	J95		
10.5.1					Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие функционирующей постоянной трахеостомы либ сохранная либ малоразборчивая речь; ДН или ДН I степени
10.5.2					Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 1

					дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 399	лет: наличие функционирующей постоянной трахеостомы выраженными нарушениями языковых и речевых функций вплоть до потер экспрессивной речи, наличии ДН II или ДН III степени других осложнений
11	Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней.			K00 - K93		

Примечание к [пункту 11](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, активности процесса, наличия и частоты распространенности патологического процесса, наличия недостаточности питания (белково-энергетической недостаточности, далее - БЭН), включенности в процесс органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.

11.1		Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки		K20 - K31		
11.1.1			Приобретенное отсутствие части желудка	Z90.3		

			Синдромы оперированного желудка	K91.1		
11.1.1.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие незначительного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после резекции желудка различных модификациях; отсутствие недостаточности питания либо наличие БЭН I степени
11.1.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие умеренного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после резекции желудка в различных модификациях; наличие БЭН II степени
11.1.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие выраженного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после субтотальной или тотальной резекции желудка; наличие

						БЭН III степени
11.1.2		Неинфекционный энтерит и колит		K50 - 52		
11.1.2.1			Болезнь Крона (регионарный энтерит)	K50		
			Язвенный колит	K51		
			Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K52		

Примечание к подпункту 11.1.2.1.

Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при НЯК и болезни Крона зависит от степени процесса, типа течения и тяжести заболевания, наличия осложнений (внекишечных, кишечных и перианальных); а также от эффективности терапии, наличия резистентности к ней.

11.1.2.1.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: длительная клинико-лабораторная ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболевания и лабораторных признаков воспалительной активности, либо минимальной активности процесса; хроническое течение заболевания (обострения 1 раз в год и реже) с минимальной активностью процесса (0 - степени) при отсутствии терапии или на фоне проводимой терапии. Отсутствие осложнений
------------	--	--	--	--	--	---

						заболевания и осложнений от проводимой медикаментозной терапии
11.1.2.1.2					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 799, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хроническое рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раз в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с умеренной активностью процесса ведущие к умеренным нарушениям функций организма. Наличие кишечных осложнений, внекишечных проявлений заболевания на фоне проводимой базисной терапии
11.1.2.1.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 799, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хроническое рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с высокой активностью процесса свищевая, стенозирующая формы заболевания, ведущие к выраженным нарушениям функций организма. Наличие осложнений заболевания (любых) осложнений от проводимой

						медикаментозной терапии
11.1.2.1.4					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 799, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующее течение заболевания с тотальным поражением кишечника значительно выраженными нарушениями функций организма (мальабсорбция, мальдигестия тяжелой степени, кахексия) последствия массивной резекции кишечника)
11.2		Другие болезни кишечника Болезни брюшины		K55 - K64 K65 - K67		
11.2.1			Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью	K56.5		
11.2.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спаечная болезнь с редкими (1 - 4 раза в год) приступами кишечной непроходимости купирующимися консервативными методами терапии (в амбулаторных условиях)

11.2.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спаечная болезнь приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующими оперативного вмешательства (разделение спаек) не более раза в год)
11.2.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного лечения, неподдающееся консервативной терапии и требующее оперативного вмешательства (разделение спаек, резекции кишки, наложение стомы)
11.3		Болезни печени Вирусный гепатит		K70 - K77 B15 - B19		

Примечание к подпункту 11.3.

Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях печени зависит от стадии фиброза (шкале METAVIR, шкале FibroTest), стадии цирроза печени (класс по Чайлд-Пью), фазы патологического процесса (индекс гистологической активности, цитолиза, холестаза), степени портальной гипертензии, наличия осложнений (отечно-асцитический, геморрагический синдром - кровотечения из расширенных вен пищевода, желудка, геморроидальных вен и других, печеночная энцефалопатия, формирование цирроза-рака и прочие), а также сочетанных клинических синдромов (гепато-пульмонального, гепато-панкреатического, гепато-рениального и других).

11.3.1			Хронический вирусный	B18		
--------	--	--	----------------------	-----	--	--

			<p>гепатит</p> <p>Токсическое поражение печени K71</p> <p>Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках K73</p> <p>Фиброз печени K74.0</p>		
11.3.1.1					<p>Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539</p> <p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический гепатит незначительными признаками активности прогрессирования. Отсутствия признаков фиброза либо незначительные признаки фиброза (A1F0 или A1F1 по шкале METAVIR)</p>
11.3.1.2					<p>Нарушения функций пищеварительной, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539; В 430 - 439</p> <p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический гепатит умеренными признаками активности прогрессирования. Умеренные признаки фиброза (A2F2 по шкале METAVIR)</p>
11.3.1.3					<p>Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p> <p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический гепатит выраженными признаками активности прогрессирования. Исход в цирроз, выраженный</p>

					(статодинамических) функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 710 - 799	признаки фиброза (A3F4 - по шкале METAVIR)
11.3.2			Токсическое поражение печени с циррозом печени Цирроз печени Врожденный цирроз печени	K71.7 K74.1 Q44		
11.3.2.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: цирроз печени (A0 - 1, F4 по шкале METAVIR) компенсированный (класс I по Чайлд-Пью). Умеренные нарушения функций организма
11.3.2.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: цирроз печени (A1 - 3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс II по Чайлд-Пью) выраженными нарушениями функций организма

11.3.2.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Цирроз печени (A1 - 3, F4 по шкале METAVIR декомпенсированный (класс C по Чайлд-Пью) с значительно выраженными нарушениями функций организма
11.3.3			Портальная гипертензия Синдром Бадда-Киари	K76.6 I82.0		

Примечание к подпункту 11.3.3.

Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при различных видах ПГ основывается на стадии ПГ, степени ВРВП, наличия и частоты кровотечений из варикозно расширенных вен различной локализации, на нарушении функции печени, а также на наличии (гепатолиенальный синдром, асцит, гидроперикард, гидроторакс, фиброз печени, печеночная энцефалопатия и прочие).

11.3.3.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительное нарушение функций организма при ПГ степени после оперативного лечения и на фоне стойкой длительной ремиссии (2 - года). Наличие ВРВП 0 - степени, без кровотечений анамнезе
11.3.3.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренное нарушение функций организма при ПГ степени после оперативного

					системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439	лечения и на фоне стойко длительной ремиссии (2 - года). Наличие ВРВП II степени
11.3.3.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженное нарушение функций организма при ПГ II степени с выраженными проявлениями гиперспленизма; пр однократном кровотечении и ВРВ различной локализации. Период послеоперационно компенсации и адаптации после портальной декомпрессии и сочетанны операций
11.3.3.4					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженно нарушение функции организма при ПГ IV стадии со значительно выраженными проявлениями гиперспленизма; пр повторяющихся кровотечениях из ВРВ различной локализации; пр наличии осложнений Паллиативное лечение (спленэктомия, гастротомия перевязкой вен пищевода, желудочного перехода

						оментогепатопексия); неэффективность хирургического лечения
11.3.4			Наличие трансплантированной печени	Z94.4		
Первичное освидетельствование						
11.3.4.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: состояние после трансплантации печени течение первых 2 лет
Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)						
11.3.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениям функций организма

					МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	
11.3.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениями функций организма
11.3.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженными нарушениями функций организма
11.4		Болезни желчного		К80 - 87		

		пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы				
			Другие хронические панкреатиты	K86.1		

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

11.4.1.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкое течение заболевания, показатель фекальной эластазы > 200 мкг/г; отсутствие признаков недостаточности питания на фоне заместительной терапии/ незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса/ Незначительные нарушения SDS от -2,0 до -3,0
11.4.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелое течение

					<p>метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559</p>	<p>заболевания, наличие обострений со стационарным лечением (до 3 раз в год включительно); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1c < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. Умеренные нарушения SDS от -3,1 до -3,9</p>
11.4.1.3					<p>Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелое течение заболевания; наличие частых обострений (более 4 раз в год); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения HbA1c более 9 %; гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса</p>

						Выраженные нарушения SDS отклонение более чем на - 4 отклонения
11.5		Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия		Z93		
11.5.1			Наличие гастростомы Наличие илеостомы Наличие колостомы Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечного тракта	Z93.1 Z93.2 Z93.3 Z93.4		
11.5.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие неустранимого аномального отверстия (стомы) желудочно- кишечного тракта в рамках паллиативной терапии
12	Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII)			L00 - L99		

Примечание к [пункту 12](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи ребенка в возрасте до 18 лет и связанных с ней систем преимущественно на оценке распространенности, локализации кожного процесса, формы и тяжести течения заболевания, активности процесса, нал

обострений. Учитывается также необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем органическими рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет.

12.1			<p>Буллезные дерматозы</p> <p>Линейный IgA зависимый дерматоз</p> <p>Дерматит герпетический</p> <p>Субкорнеальный пустулезный дерматит</p>	<p>L10 - L15</p> <p>L12.2</p> <p>L13.0</p> <p>L13.1</p>		
12.1.1					<p>Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ограниченные проявления кожного процесса, наличие единичных пузырей на коже и/или слизистых оболочках, требующие лечения и ухода</p>
12.1.2					<p>Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: распространенные высыпания на коже и/или слизистых оболочках (в том числе внутренних органов), локализованные высыпания на коже активных поверхностей тела (кожи кистей и стоп); требующие лечения и ухода</p>
12.2			Атопический дерматит	L20		
12.2.1					Нарушение функции кожи и	Для детей в возрасте 0 - 1

					связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	лет: ограниченный дерматит площадью поражения до 10% поверхности тела, или распространенный дерматит площадью поражения от 10 до 30%; обострения до 3 раз в год на фоне проводимого лечения
12.2.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: распространенный или диффузный дерматит площадью поражения более 30% поверхности тела, обострения более 3 раз в год, склонность к торпидному, непрерывно рецидивирующему течению, резистентность к системному лечению
12.3		Папулосквамозные нарушения		L40 - L45		
12.3.1			Псориаз	L40		
12.3.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: псориаз с площадью поражения до 10% поверхности тела, редкие рецидивы (до 2 раз в год) формы заболевания
12.3.1.2					Нарушения функций кожи и	Для детей в возрасте 0 - 1

					связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799	лет: распространенные формы площадью поражения поверхности кожи более 10% частые обострения (более раз в год); или непрерывно рецидивирующее течение при неэффективности проводимого системного лечения; ладонно-подошвенный псориаз при неэффективности проводимого системного лечения
12.4		Другие болезни кожи и подкожной клетчатки		L80 - L99		
12.4.1			Локализованная склеродермия (morphea) Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга - глубокая линейная склеродермия	L94.0 L94.1 L94.1		
12.4.1.1					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: поверхностные формы склеродерм без нарушения или с незначительными нарушениями функции кожи

						связанных с ней систем
12.4.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глубокие формы склеродермии при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающиеся умеренными нарушениями функций организма (зависимости от локализации)
12.5		Врожденные аномалии и пороки развития кожи		Q80 - Q89		
12.5.1			Врожденный ихтиоз Вульгарный ихтиоз X-сцепленный ихтиоз Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия	Q80 Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3		
12.5.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушения

					899	функции кожи и связанных с ней систем, хорошо компенсирующиеся на фоне терапии
12.5.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: генерализованные формы кератодермии, включающие ладонно-подошвенную локализацию, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов, резистентные к терапии
12.5.2			Врожденный буллезный эпидермолиз	Q81		
12.5.2.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ограниченные формы
12.5.2.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299, 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: поражения кожи (в том числе активных поверхностей кистей, стоп), слизистых оболочек, приводящие умеренным нарушениям функций организма
12.5.2.3					Нарушения функций кожи и	Для детей в возрасте 0 - 1

					связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, нарушение функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539; В 410 - 429, В 610 - 639	лет: поражения кожи, слизистых оболочек, в том числе внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма
12.6		Болезни придатков кожи		L60 - L75		
12.6.1			Алопеция тотальная	L63.0		
12.6.1.1					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тотальное облысение отсутствием бровей и ресниц
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)			M00 - M99		

Примечание к пункту 13.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенка 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке нарушений функций всех сегментов опорно-двигательного аппарата. При этом учитывается: нарушение функций суставов и всей конечности в целом, позвоночника (каждого отдела и в целом), направление с

(правильное, неправильное), наличие патологических (порочных) установок, оценка состояния мышц конечностей, тазового и плечевого поясов. И также и другие факторы: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность и активность патологичес наличие осложнений

13.1		Артропатии Системные поражения соединительной ткани Спондилопатии		M00 - M25 M30 - 36 M45 - 49		
13.1.1			Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский (ювенильный) артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках Узелковый полиартериит и родственные состояния Другие некротизирующие васкулопатии Системная красная волчанка Дерматополимиозит Системный склероз Другие системные поражения	M08 M09 M30 M31 M32 M33 M34 M35		

			соединительной ткани		
			Анкилозирующий спондилит	M45	

Примечание к подпункту 13.1.1.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенка 18 лет обусловленных воспалительными артропатиями (юношеский артрит), системными поражениями соединительной ткани (узелковый периартериит), родственными состояниями, другими некротизирующими васкулопатиями, системной красной волчанкой, дерматополимиозитом, системным склерозом (системными поражениями соединительной ткани), а также анкилозирующим спондилитом, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функций органов и систем организма, степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры сустава), (степень ограничения подвижности позвоночника), на оценке рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике, клинико-лабораторных данных активности воспалительного процесса, характеристике течения заболевания; оценке степени тяжести заболевания, частоты, длительности и тяжести обострений объективизированных в условиях стационара, а также на оценке функциональной способности ребенка, наличия осложнений заболевания и эффективности проводимой медикаментозной терапии. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) иммуносупрессивной терапии (препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.

13.1.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия I; отсутствие прогрессирования заболевания; отсутствие или наличие обострений (не более 1 раза в год), отсутствие или I степени активности воспалительного процесса на фоне терапии; ФК I; отсутствие осложнений заболевания от проводимой медикаментозной терапии (НПВП)
----------	--	--	--	--	--	--

13.1.1.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренное нарушение функции суставов и/или позвоночника (ФК II степени), рентгенологическая стадия II, вариант заболевания поражением или без поражения глаз (увеит); прогрессирующее течение заболевания: обострения 2 - 4 раза в год сохраняющаяся активность воспалительного процесса или II степени на фоне иммуносупрессивной терапии; необходимость коррекции терапии, возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП), в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимости медикаментозной терапии</p>
13.1.1.3					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических),</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженное нарушение статодинамической функции</p>

					<p>сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>вследствие поражения суставов и/или позвоночника, рентгенологическая стадия I или III, вариант заболевания поражением или без поражения глаз (увеит); прогрессирующее течение заболевания; частые длительные обострения (более 4 раз в год); ФК II или III; сохраняющаяся активность воспалительного процесса или 3 степени на фоне иммуносупрессивной терапии; возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП); в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проведение медикаментозной терапии</p>
13.1.1.4					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций,</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения статодинамических функций</p>

					<p>функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>обусловленные поражения суставов и/или позвоночника, рентгенологическая стадия II или IV;</p> <p>вариант заболевания поражением или без поражения глаз (увеит);</p> <p>быстро прогрессирующее течение заболевания;</p> <p>активность воспалительного процесса 3 степени;</p> <p>ФК III или IV;</p> <p>низкая эффективность или резистентность к проводимой иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких фармакотерапевтических групп (2 и более, включая генно-инженерные биологические препараты);</p> <p>наличие необратимых осложнений заболевания проводимой медикаментозной терапии</p>
13.2		<p>Деформирующие дорсопатии</p> <p>Врожденные аномалии (пороки развития позвоночника и костей грудной клетки)</p>		<p>M40 - M43</p> <p>Q76</p>		

Примечание к подпункту 13.2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных деформацией основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования: вид деформации, выраженности, локализация и протяженность основной дуги деформации и степень ее мобильности, темп прогрессирования деформации за определенный период, степень ограничения подвижности позвоночника, наличие неврологической симптоматики, степень нарушения функций других органов и систем, наличие и степень выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. Учитываются также результаты консервативного лечения, наличие показаний и противопоказаний для реконструктивной хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, протяженность операции, конструкция, завершенность периода активного роста ребенка, сопутствующие заболевания и сочетание сколиоза с другими пороками развития других систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем). Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: быстрое прогрессирование, высокая степень выраженности сколиоза; сочетание различных видов деформации дуги позвоночника; неэффективность реконструктивной хирургической коррекции, необходимость металлоконструкции в послеоперационном периоде.

13.2.1			Кифоз Сколиоз	M40 M41		
13.2.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: медленно прогрессирующая или стабильный тип течения; низкая степень мобильности сколиотической дуги; инфантильные сколиозы (0 - 7 лет), ювенильный сколиоз (7 - 12 лет): I или II степень сколиоза без ограничения или незначительным ограничением подвижности позвоночника; юношеские сколиозы (13 - 18 лет): I, II, III степень сколиоза незначительным/умеренным ограничением подвижности позвоночника;

						<p>при III степени сколиоза отсутствие неблагоприятных факторов прогноза.</p> <p>Наличие стабильно металлической конструкции пределах одного отдела позвоночника</p>
13.2.1.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы;</p> <p>МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>быстро прогрессирующий тип течения сколиоза, средняя или высокая степень мобильности сколиотической дуги;</p> <p>III степень сколиоза умеренным ограничением подвижности позвоночника при наличии неблагоприятных факторов прогноза;</p> <p>III степень сколиоза выраженным ограничением подвижности позвоночника.</p> <p>Наличие стабильно металлической протяженной конструкции более 1 отдела выраженным ограничением подвижности позвоночника.</p> <p>Нестабильность металлоконструкции и другие осложнения оперативного лечения.</p> <p>Сочетание сколиотической деформации со стабильно кифотической деформацией III и выше степеней</p>

13.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: IV степень сколиоза декомпенсированный, выраженным нарушением функций организма.
13.2.2			Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости	Q76.3		

Примечание к [пункту 13.2.2](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных врожденными нарушениями (аномалии сегментации, слияния и формирования позвонков), наличие вариантов сочетаний аномалий позвонков и их распространенность, величина кривизны позвоночника и наличие деформации грудной клетки, наличие сочетания аномалии позвонков с различными аномалиями ребер и пороками развития органов и систем, тип течения сколиоза, состояние механизмов компенсации, эффективность хирургической коррекции и протяженность конструкции. Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: нарушение сегментации, "блокирование через сегмент", угол первичной деформации более 30°, груднопоясничная локализация порока, большое количество блокированных позвонков, "кифосколиозогенные" пороки, любой вариант спондилолистеза; наличие кифотического компонента.

13.2.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сколиозы, обусловленные локальным пороком. Угол первичной деформации до 15 - 20°. Отсутствие противопоказаний для оперативного лечения, устранение деформации оперативным путем.
----------	--	--	--	--	--	---

						Отсутствие осложнений правильное стабильное расположение металлической конструкции
13.2.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно- сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сколиозы субкомпенсированные, имеющие прогрессирующее течение. Угол первичной деформации от 21° до 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериев. Недостаточная коррекция деформации после оперативного лечения большая протяженность металлической конструкции дестабилизация металлической конструкции наличие осложнений
13.2.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно- сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сколиозы декомпенсированные, имеющие прогрессирующее быстро прогрессирующее течение. Угол первичной деформации более 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериев; сколиозы, сочетающиеся

					429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639	аномалиями развития позвоночного канала спинного мозга, других органов и систем; неудовлетворительный результат оперативного лечения (рецидив деформации), наличие осложнений с умеренным или выраженным нарушениями функций организма; наличие противопоказаний оперативному вмешательству
13.2.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: неоперабельные деформации с выраженным или значительно выраженным нарушением функций организма
13.3		Нарушения плотности кости		M80 - M85		
13.3.1			Остеопороз с патологическим переломом	M80		

			Остеопороз без патологического перелома	M81		
<p>Примечание к подпункту 13.3.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных проявлениями различного генеза, основывается на частоте возникновения патологических переломов, их множественности, локализации, характера перелома с консолидации, исходов. Необходимо принимать во внимание показатели Z-критерия, по величине которого оценивается МПКТ и соответствие возникновения патологических переломов. Учитываются результаты рентгенологической диагностики, а также результаты лабораторных показателей минерального обмена (содержание ионизированной фракции кальция в крови, содержание фосфора в крови, суточная экскреция фосфора и кальция, экскреция кальция с мочой натошак по отношению к концентрации креатинина в этой же порции мочи).</p>						
13.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствуют переломы длинных трубчатых костей. Отсутствуют деформации или имеют место незначительные (менее 7 - 10°) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций Z-критерий соответствует степени остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороз отсутствуют
13.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей

					<p>функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559</p>	<p>раз в 2 - 3 года с длительными сроком консолидации деформацией оси конечности более 10°, но менее 20° вторичная деформация ос позвоночника (сколиоз II и III степени) Z-критери соответствует тяжелом остеопорозу. Лабораторные показател фосфорно-кальциевого обмена - умеренны изменения. Выявляются начальные Rg признаки остеопороза</p>
13.3.1.3					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20 градусов более) деформация ос конечности, возникновение ложных суставов, вторична деформация оси позвоночник с умеренным нарушением и функций. Z-критерий соответствую тяжелому остеопорозу (очен высокий риск переломов). Лабораторные показател фосфорно-кальциевого обмена - умеренны</p>

						выраженные и значительные выраженные изменения
13.3.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома
13.3.2			Другие нарушения плотности и структуры кости	M85		
			Единичная (солитарная) киста кости	M85.4		
			Аневризмальная киста кости	M85.5		
			Другие кисты костей	M85.6		
Примечание к подпункту 13.3.2. Кисты костей (солитарные кисты длинных трубчатых костей, аневризмальные кисты, кисты в костях таза и телах позвонков) могут быть причиной переломов; нарушения роста кости и развития неврологических осложнений (невропатия, радикулопатия). Количественная оценка степени выраженных нарушений функций организма ребенка зависит от локализации и размеров кисты, характера патологического перелома, наличия и степени неврологических осложнений, эффективности проведенного лечения (наличие укорочения конечности, степень выраженности контрактуры суставов конечности), наличия рецидивов кист						
13.3.2.1					Нарушения	Для детей в возрасте 0 - 1

					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799</p>	<p>лет: весь период лечения при отсутствии осложнений; после завершения лечения - при расположении кисты вне зоны роста, правильном срастании перелома без деформации или с незначительной деформацией оси (плеча, бедра), отсутствии или незначительном ограничении объема движений в смежном суставе, отсутствии рецидива заболевания после реконструктивной хирургической коррекции</p>
13.3.2.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: укорочение конечности (при локализации кисты в зоне роста), требующее повторных оперативных вмешательств целью ее удлинения (по мере роста ребенка). Выраженная деформация оси (плеча, бедра, конечности в целом), требующая оперативной коррекции при наличии неврологически осложнений с умеренным ограничением объема движения в суставах. Рецидив заболевания после проведенного оперативного лечения, требующий</p>

						повторного оперативного вмешательства
13.4		Другие остеопатии		M86 - 90		
13.4.1			Другой хронический остеомиелит	M86.5		
			Другие хронические гематогенные остеомиелиты	M86.6		
			Остеомиелит неуточненный	M86.9		

Примечание к подпункту 13.4.1.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма человека при хроническом остеомиелите зависит от распространенности, протяженности очага, частоты, тяжести и длительности обострений, степени активности процесса, включая клинические, рентгенологические и лабораторные данные, состояния окружающих мягких тканей, наличия осложнений (нарушение роста кости, укорочение конечности, деформация и искривление конечности, контрактуры и анкилозы крупных суставов, патологические вывихи, ложные суставы), необходимости повторного оперативного лечения и его эффективности, а также от поражения других органов и систем вследствие хронической интоксикации.

13.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799; В 430 - 439; В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: редкие (1 раз в год и реже) непродолжительные (менее 1 недели) обострения
13.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обострения свищевой формы остеомиелита среднетяжелые

					функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799; В 430 - 439; В 810 - 899	частоты (до 2 раз в год) средней продолжительности (не менее 4 недель)
13.4.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799; В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639; В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: рецидивирующий остеомиелит: обострения частые (3 - 4 раза в год) длительные (более 4 недель) формирование умеренных или выраженных контрактур смежных суставах. Наличие осложнений (ложные суставы, патологически вывихи)
13.5		Хондропатии		M91 - 94		
13.5.1			Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Болезнь Легга-Кальве-Пертеса	M91.1		
13.5.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: IV или V стадии болезни Пертеса (стадия репарации стадия исхода) с сохранением анатомических соотношений тазобедренном суставе

						восстановлением функции сустава, или с формированием легкой контрактуры в суставе
13.5.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: IV стадия (репарация): при необходимости соблюдения ортопедического режима дозированной нагрузки дополнительной опорой. V стадия (исход) - осложненная формирование выраженной контрактуры тазобедренном суставе (одной стороны), подвывих бедра (с одной стороны) выраженной гипотрофии мышц бедра и ягодичных мышц, с укорочением конечности (более 4 см)
13.5.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: I и II стадия (некроз импрессионный перелом), III стадия (фрагментации) на весь период полной иммобилизации
14	Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с поражением				N00 - N99	

	преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней					
--	---	--	--	--	--	--

примечание к [пункту 14](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка, обусловленных болезнями мочеполовой системы преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (ХБП). Учитываются также и другие факторы патологического процесса, форма и тяжесть течения заболевания, активность процесса, наличие и частота осложнений (например, распространенность патологического процесса, включение органов - мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений: пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие). В большинстве представленных случаев (за исключением болезней, указанных в [подпунктах 14.3](#) и [14.4](#) количественной системы оценки) незначительная степень нарушения мочевыделительной функции организма характеризуется отсутствием хронической болезни почек, либо ее начальными стадиями (ХБП 1 и ХБП 2 стадии); умеренная степень - наличием ХБП 3 стадии (3А и 3Б), выраженная и значительная степень нарушения мочевыделительной функции характеризуется хронической болезнью почек 4 и 5 стадий соответственно. В основе стратификации лежит уровень скорости клубочковой фильтрации (далее - СКФ), который отличается у детей разных возрастов.

14.1			<p>Гломерулярные болезни (хронический нефритический синдром, нефротический синдром)</p> <p>Тубулоинтерстициальные болезни почек: исключая обструктивную уропатию и рефлюкс-уропатию (или гидронефроз - N13) и хронический обструктивный пиелонефрит (N11), предусмотренные подпунктами 14.3 и 14.4 настоящей</p>	<p>N00 - N08</p> <p>N10 - N16</p>		
------	--	--	--	-----------------------------------	--	--

			количественной системы оценки Почечная недостаточность (включая хроническую болезнь почек)	N17 - N19		
14.1.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 10 - 20%; дети старше 1 года: ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73 м ² ; ХБП 2 стадии, СКФ пределах 89 - 60 мл/мин/1,73 м ²
14.1.2					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 30%; дети старше 1 года: ХБП 3А стадии, СКФ 59-44 мл/мин/1,73 м ² ; ХБП 3Б стадии, СКФ 44-30 мл/мин/1,73 м ² . Любая стадия ХБП при заболеваниях с частыми обострениями или при латентном течении заболевания с высокой степенью активности патологического процесса; необходимость в препаратах подавляющих иммунитет; неэффективность лечения

						при наличии осложнений
14.1.3					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 40%; дети старше 1 года: ХБП 4 стадии, СКФ 29-1 мл/мин/1,73 м ²
14.1.4					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 50%; дети старше 1 года: ХБП 5 стадии, СКФ ниже 1 мл/мин/1,73 м ²
14.2			Помощь, включающая гемодиализ	Z49		
			Подготовительные процедуры для проведения диализа	Z49.0		
			Экстракорпоральный диализ	Z49.1		
			Другой вид диализа	Z49.2		
14.2.1					Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций,	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 40%; дети старше 1 года: СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м ²

					<p>функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма;</p> <p>МКФ: В 610 - 639; В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559</p>	
14.2.2					<p>Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма;</p> <p>МКФ: В 610 - 639; В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559</p>	<p>Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы более 50%;</p> <p>дети старше 1 года: СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м²</p>
14.3			<p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидронефроз)</p> <p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (в том числе хронический обструктивный пиелонефрит)</p> <p>Мочекаменная болезнь</p>	<p>N13</p> <p>N11.1 - N11.9</p> <p>N20 - N23</p>		

			Другие болезни почки и мочеточника	N25 - N29		
14.3.1					Нарушения мочевыделительной функции, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обструктивный уретерогидронефроз обострением хронического пиелонефрита до 2 раз в год реже, без нарушения функции почек либо с развитием ХБП или 2 стадии
14.3.2					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обструктивный уретерогидронефроз обострением хронического пиелонефрита от 2 до 4 раз год; развитие ХБП 3 стадии
14.3.3					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 110 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обструктивный уретерогидронефроз обострением хронического пиелонефрита более 4 раз год; развитие ХБП 4 стадии

					199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	
14.4			Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки	Z90.5 Q60		
14.4.1					Нарушения мочевыделительной функции, функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: единственная почка, ХБП или 2 стадии
14.4.2					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: единственная почка, ХБП стадии
14.4.3					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, сердечно-сосудистой системы, системы крови и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: единственная почка; ХБП стадии

					иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	
14.4.4					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический пиелонефрит единственной почки, ХБП стадии
14.5			Наличие трансплантированной почки	Z94.0		
Первичное освидетельствование						
14.5.1					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно- сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: состояние после трансплантации почки течение первых 2 лет

					799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	
Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)						
14.5.2					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениями функций организма
14.5.3					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениями функций организма
14.5.4					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженным

					психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	нарушениями организма	функции
14.6			<p>Обтурация шейки мочевого пузыря различной этиологии</p> <p>Стриктура уретры</p> <p>Уретральный свищ (уретроперинеальный, уретроректальный, мочево́й)</p> <p>Послеоперационная стриктура уретры</p> <p>Поликистоз почки, детский тип</p> <p>Врожденный гидронефроз</p> <p>Атрезия и стеноз мочеточника: стеноз лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), стеноз пузырно-мочеточникового</p>	<p>N32.0</p> <p>N35</p> <p>N36.0</p> <p>N99.1</p> <p>Q61.1</p> <p>Q62.0</p> <p>Q62.1</p>			

			<p>сегмента (ПМС)</p> <p>Врожденный мегауретер</p> <p>Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс</p>	<p>Q62.2</p> <p>Q62.7</p>		
14.6.1					<p>Нарушение мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>после окончания оперативного лечения при наличии незначительного нарушения мочевыделительной функции обострения вторичного пиелонефрита до 2 раз в год; отсутствие нарушения функции почек, ХБП 1 или стадии</p>
14.6.2					<p>Нарушение мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием искусственных отверстий мочевого тракта; после окончания оперативного лечения при наличии умеренного нарушения мочевыделительной функции обострения вторичного пиелонефрита от 2 до 4 раз в год, латентное течение пиелонефрита;</p>

						ХБП 3 стадии
14.6.3					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием мочевых свищей; длительной и/или постоянно катетеризацией мочевого пузыря. После окончания оперативного лечения при наличии выраженного нарушения мочевыделительной функции обострения вторичного пиелонефрита более 4 раз в год; ХБП 4 стадии
14.7			Наличие цистостомы Наличие искусственных отверстий мочевого тракта (нефростомы, уретростомы, уретеростомы)	Z93.5 Z93.6		
14.7.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие неустраняемого аномального отверстия (стомы) мочевого тракта в рамках паллиативной терапии
15	Врожденные аномалии			Q00 - Q99		

	(пороки), деформации и хромосомные болезни (Класс XVII)					
--	---	--	--	--	--	--

Примечание к [пункту 15](#).

Количественная оценка нарушения функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях (пороках), деформациях и хромосомных болезнях зависит от заболевания, характера течения, степени нарушенных функций органов и систем организма, от эффективности проводимой терапии, результатов лечения, а также от прогноза врожденной и наследственной патологии.

15.1		Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы		Q00 - Q07		
------	--	---	--	-----------	--	--

Примечание к [подпункту 15.1](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях не зависит от характера порока, от содержимого и локализации грыжевого мешка, размера структурных нарушений вещества головного или спинного мозга (по результатам КТ, МРТ) клинико-функциональных проявлений порока или аномалии: выраженности двигательных нарушений, степени неврологического дефицита, когнитивного и интеллектуального снижения, наличия судорожных пароксизмов и их вида, частоты, тяжести, резистентности к противосудорожной терапии. Учитывается также клинический прогноз, возможность хирургической коррекции порока, его эффективность, наличие осложнений, сочетание с пороками других органов и систем организма (зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем), степень нарушений психических, сенсорных, статодинамических и других функций организма.

15.1.1			Анэнцефалия и подобные пороки развития (ацефалия, гемицефалия)			
15.1.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, дыхательной, пищеварительной систем,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ацефалия и гемицефалия с снижением интеллекта менее 34 баллов, значительными выраженными статодинамическими нарушениями (тетра-; геми-

					мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639	парапарезы); значительно выраженными резистентными к терапии пароксизмальными расстройствами; значительно выраженным псевдобульбарными бульбарными нарушениями отсутствием контролем функции тазовых органов
15.1.2			Энцефалоцеле	Q01		
15.1.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 310 - 399, 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: менингоцеле небольших размеров (дефект кости черепа не более 2 x 2 см) средних размеров (более 2 x 2, но менее 3 x 3 см) после радикальной оперативной коррекции без осложнений при отсутствии или незначительных нарушениях функций организма: 0 - 3 года - развитие по возрасту или незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - незначительные когнитивные нарушения незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет:

						<p>IQ = 65 - 69 баллов); редкие пароксизмальные расстройства; незначительные нарушения устной и/или письменной речи; незначительные нарушения статодинамических сенсорных функций (зрения и/или слуха)</p>
15.1.2.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 79, В 510 - 539, В 540 - 550, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: менингоцеле больших размеров (дефект костей черепа 3 x 3 см и более) после радикальной оперативной коррекции при наличии умеренных нарушений функций организма: 0 - 3 года - умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет - умеренные когнитивные нарушения умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные пароксизмальные расстройства; умеренный псевдобульбарный синдром умеренные нарушения устной и/или письменной речи</p>

						двигательные нарушения (умеренные тетра, геми парпарезы); нарушения сенсорных функций и иные нарушения
15.1.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 79, В 510 - 539, В 540 - 550, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: энцефаломенингоцеле посл. частичной оперативной коррекции при наличии осложнений, выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года - выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - выраженные когнитивные нарушения, выраженное снижение интеллекта (3 - 17 лет: IQ= 3 - 49 баллов); выраженные пароксизмальные расстройства, резистентные терапии; выраженные псевдобульбарный синдром, выраженные нарушения устной и/или письменной речи; нарушение контроля функции тазовых органов
15.1.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: энцефалоцистоменингоцеле

					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, дыхательной системы, нарушения мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539; В 540 - 550, В 610 - 639</p>	<p>больших размеров, подлежащая радикально оперативной коррекции;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций организма:</p> <p>0 - 3 года - значительное выраженное отставание физическом, психомоторном речевом развитии; отсутствии формирования социальных навыков; дети старше 3 лет значительно выраженное снижение интеллекта (IQ = 3 балла для всех возрастов); значительно выраженные псевдобульбарный синдром; значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков жестов либо устная речь отсутствует), значительные выраженные двигательные нарушения (тетра-, гемипарапарезы или плегии в сочетании с гиперкинезами атаксией), синдромы эпилептических энцефалопатий (синдром Веста, Айкарди, Отахара Леннокса-Гасто и прочие); резистентные противосудорожной терапии; нарушения сенсорных функций и иные нарушения</p>
--	--	--	--	--	---	--

						Отсутствие контроля функций тазовых органов
15.1.3			Микроцефалия Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга	Q02 Q04		
15.1.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Незначительные нарушения функций организма: 0 - 3 года - незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в темпах формирования социальных навыков; дети старше 3 лет - незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); наличие незначительных когнитивных нарушений, нарушения устной и/или письменной речи, редкие пароксизмальных расстройств, незначительные нарушения сенсорных функций (зрения и/или слуха)
15.1.3.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функций организма: 0 - 3 года - умеренно

					<p>(статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в формировании социальных навыков; старше 3 лет - умеренные когнитивные нарушения умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные нарушения устной и/или письменной речи; пароксизмальные расстройства средней частоты; умеренные нарушения сенсорных функций</p>
15.1.3.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>выраженные нарушения функций организма:</p> <p>0 - 3 года - выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков;</p> <p>старше 3 лет - выраженное снижение интеллекта (IQ = 30 - 49 баллов); выраженные когнитивные нарушения; выраженные нарушения устной и/или письменной речи; частые пароксизмальные расстройства; выраженные</p>

						нарушения сенсорных функций; нарушение контроля функций тазовых органов
15.1.3.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года - значительное отставание физического, психомоторного, речевого развития; отсутствие формирования социальных навыков; старше 3 лет - значительное выражено снижение интеллекта (IQ < 3 баллов); значительные выраженные речевые нарушения (возможны примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует); синдромы эпилептического энцефалопатий (синдром Веста, Айкарди, Отахара-Леннокса-Гасто и прочие синдромы); резистентные противосудорожной терапии нарушения сенсорных функций. Отсутствие контроля функции тазовых органов
15.1.4			Врожденная гидроцефалия	Q03		

15.1.4.1					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: удовлетворительные результаты проведения радикальной эндоскопической коррекции гидроцефалии (компенсация или субкомпенсация); компенсированная гидроцефалия в период динамического наблюдения без необходимости оперативного лечения (отсутствие ликвородинамических нарушений). Отсутствие нарушений или незначительные нарушения функций организма: 0 - 3 года - незначительное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; старше 3 лет - незначительное снижение когнитивных процессов, незначительное снижение интеллекта (3 - 17 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); незначительные нарушения устной и/или письменной речи; незначительные нарушения сенсорных статодинамических функций</p>
----------	--	--	--	--	--	--

15.1.4.2					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующий рост окружности головы несмотря на проводимое консервативное лечение неэффективность эндоскопической коррекции гидроцефалии; установка имплантируемой клапанной дренажной системы (шунтозависимая гидроцефалия) с наличием умеренного гипертензионно-гидроцефального синдрома ликвородинамическими кризами средней частоты; умеренными нарушениями функций организма: 0 - 3 года: умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - умеренное снижение когнитивных процессов умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные нарушения устной и/или письменной речи двигательные нарушения (легкий тетрапарез) умеренные геми-, парапарезы умеренная динамическая</p>
----------	--	--	--	--	--	---

						атаксия), нарушении сенсорных функций
15.1.4.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующий рост окружности головы динамики; нарастание неврологической симптоматики (активная гидроцефалия); неэффективность оперативного лечения дисфункция шунта после вентрикулоперитонеального шунтирования (1 раз и более год) с частым ликвородинамическими кризами; повторное шунтирование.</p> <p>Выраженные нарушения функций организма:</p> <p>0 - 3 года - выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - выраженное снижение когнитивных процессов, выраженное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); выраженные нарушения устной и/или письменной речи; двигательные нарушения</p>

						<p>(умеренный тетрапарез); выраженные парапарезы); гемипарезы); пароксизмальные расстройства; сенсорных функций. Нарушение контроля функций тазовых органов</p>
15.1.4.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: высокий темп прогрессирования гидроцефалии несмотря на проводимое лечение с значительно выраженными нарушениями функций организма: 0 - 3 года - значительное отставание физического, психомоторного речевого развития, отсутствие формирования социальных навыков; старше 3 лет значительно выражено снижение интеллекта (IQ < 3 баллов), значительные выраженные речевые нарушения (возможны примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), наличие синдрома эпилептических энцефалопатий (синдром Веста, Айкарди, Отахара</p>

					<p>(статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>- 3 позвонков) формированием спинномозговой грыжи без элементов нервной ткани грыжевом мешке (менингоцеле), с элементами корешков спинного мозга (менингорاديкулоцеле) отсутствием или минимальной неврологической симптоматикой, незначительными нарушениями статодинамических функций с благоприятным прогнозом при своевременной оперативной коррекции</p>
15.1.5.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщепление позвоночника (- 5 позвонков) формированием менингорاديкулоцеле умеренной неврологической симптоматикой, умеренными нарушениями статодинамических функций возможны нарушения сенсорных функций (снижение остроты зрения и/или слуха оценивается в зависимости от степени выраженности); нарушения контроля функции тазовых</p>

						органов
15.1.5.3					<p>Нарушения психических, языковых и речевых; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 210 - 299, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>расщепление позвоночника на любом протяжении вовлечением спинного мозга и/или его элементов (менингомиелоцеле, мелоцистоцеле) с выраженной неврологической симптоматикой, нарушениями сенсорных функций (снижение остроты зрения и/или слуха), нарушением контроля функции тазовых органов, формированием различных деформаций нижних конечностей, приводящих к выраженным нарушениям статодинамических функций.</p> <p>Любой вариант грыжи спинномозговой оболочки сочетающийся с пороками развития головного и/или спинного мозга на другом уровне с выраженными нарушениями функций организма</p>
15.1.5.4					<p>Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>расщепление позвоночника на любом протяжении вовлечением в порок развития</p>

					<p>функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 210 - 299, В 610 - 639</p>	<p>спинного мозга и/или его элементов (менингомиелоцеле, миелоцистоцеле) с значительно выраженной неврологической симптоматикой (нижняя параплегия, значительный выраженный нижний парапарез), с отсутствием контроля функции тазовых органов, с формированием различных деформаций нижних конечностей приводящих к значительным выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант грыжи спинномозговой сочетающийся с пороками развития головного и спинного мозга на любом уровне со значительными выраженными нарушениями функций организма</p>
15.2		Врожденные anomalies (пороки развития) системы кровообращения		Q20 - Q28		
15.2.1			Врожденные anomalies (пороки развития) сердечных камер и соединений, сердечной перегородки, легочного,	Q20 - Q24		

			трехстворчатого, аортального и митрального клапанов. Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца			
15.2.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупные сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока, не приводящие недостаточности кровообращения или незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или стадии, ФК I; без нарушений либо с незначительными нарушениями сердечного ритма и проводимости гемодинамически незначимыми
15.2.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупные сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока умеренными нарушениям

					199, В 210 - 299	<p>гемодинамики и функции сердечно-сосудистой системы: ХСН ПА стадии, ФК (подтвержденные клинико-лабораторными данными, данными инструментальными методами обследования); умеренные нарушения сердечного ритма проводимости: желудочковые экстрасистолы (представленность эктопического ритма от 10 до 20% за сутки по данным суточного ЭКГ-мониторирования) или наджелудочковые экстрасистолы, наджелудочковые тахикардии (представленность эктопического ритма от 20 до 30% за сутки по данным суточного ЭКГ-мониторирования), атриовентрикулярная или синоатриальная блокада степени, требующие постоянной медикаментозной коррекции. Наличие осложнений (рестеноз, дисфункция клапана, реканализация дефекта, инфекционный эндокардит) после оперативной коррекции</p>
--	--	--	--	--	------------------	--

						<p>порока и/или наличия отягощающей сопутствующей патологии с умеренным нарушениями функциями организма. Необходимость в повторном хирургическом вмешательстве, в том числе использованием протезных материалов. Сложные пороки на период проведения этапного хирургического лечения или паллиативного лечения</p>
15.2.1.3					<p>Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупные сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока выраженными нарушениями гемодинамики и функциями сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ, ФК III, выраженные нарушения сердечного ритма и проводимости - трепетания и мерцание предсердий частые желудочковые экстрасистолы (представленность эктопического ритма более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ</p>

						<p>мониторирования) ил наджелудочковые экстрасистолы и залп наджелудочковой тахикардии (представленность эктопического ритма боле 30% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования) атриовентрикулярная блокада 3 степени; наличие осложнений посл оперативной коррекци порока и/или наличи отягощающей сопутствующе патологии с выраженным нарушениями функци организма. Неудовлетворительный результат оперативног лечения сложных пороков необходимость повторны оперативных вмешательств, том числе с использованием протезных материалов</p>
15.2.1.4					<p>Нарушение функций серечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупны сосудов до проведен оперативного лечения и посл радикального оперативног устранения порока с значительно выраженным нарушениями гемодинамики функций серечно-сосудисто</p>

						<p>системы: ХСН III стадии, ФК IV Наличие осложнений посл оперативной коррекци порока и/или наличи отягощающей сопутствующе патологии со значительн выраженными нарушениям функций организма. Возможность проведени только паллиативны операций при сложны сочетанных пороках; неоперабельные порок сердца и крупных сосудов</p>
15.2.2			<p>Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий</p> <p>Врожденные аномалии (пороки развития) крупных вен</p> <p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы периферических сосудов</p> <p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения</p>	<p>Q25</p> <p>Q26</p> <p>Q27</p> <p>Q28</p>		

Примечание к подпункту 15.2.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при ангиодисплазиях проводится с учетом (мальформации капиллярные, артериальные, венозные, артериовенозные, лимфатические и различные их сочетания), локализации и распространенности

(конечности, легкие, головной и спинной мозг, множественные), степени выраженности хронической недостаточности кровообращения в сегменте(ах) или органе(ах), выраженности трофических изменений кожи, мягких тканей и других изменений в пораженных органах, эффективности лечения и наличия осложнений, наличия и степени выраженности вторичных деформаций опорно-двигательного аппарата.

В зависимости от этого выделяют состояния: компенсации (увеличение объема и длины конечности без ее деформации и без трофических нарушений центральной гемодинамики, наличие эффективного коллатерального кровообращения); субкомпенсации (увеличение объема, длины деформация, трофические нарушения кожи без изъязвления, начальные признаки перегрузки правого желудочка, НК 0 или НК I, коллатеральное кровообращение малоэффективно); декомпенсация (увеличение объема конечности на 5 - 6 см и более, длины конечности на 7 - 8 см и более по сравнению с конечностью, деформация конечности, трофические нарушения кожи в виде эрозии, трофических язв, НК I или II, отсутствие коллатерального кровообращения).

15.2.2.1					<p>Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные и распространенные формы ангиодисплазий в фазе компенсации кровообращения (ХАН 0 или 1 степени, ХВН 0 или 1 степени); 0 - 6 лет: увеличение объема конечности на 1,0 - 1,5 см без ее деформации, увеличение длины конечности на 2,0 - 2,5 см, компенсируемое ортопедической стелькой или коском. 7 - 17 лет: увеличение объема и длины конечности до 4,0 см без ее деформации, компенсируемое ортопедической стелькой или коском. Начальные признаки вторичных изменений позвоночника. Незначительное ограничение объема движений в суставах конечности(ей)</p>
----------	--	--	--	--	---	--

15.2.2.2					<p>Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 450, В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные или распространенные формы ангиодисплазий в стадии субкомпенсации кровообращения (ХАН степени, ХВН 2 степени); преимущественная локализация на активных поверхностях конечности (ладони и стопы); 0 - 6 лет: увеличение объема конечности до 2,0 - 4,0 см, увеличение длины конечности на 3,0 - 4,0 см, компенсируемое сложной ортопедической обувью. 7 - 17 лет: увеличение объема конечности на 5,0 см и более, увеличение длины конечности на 5,0 см и более, компенсируемое сложной ортопедической обувью. Статический сколиоз 2 или 3 степени, умеренное ограничение объема движений в суставах конечности(ей), признаки неврологических осложнений (нейропатии), наличие болевого синдрома. Наличие неврологической симптоматики и умеренных нарушений функций организма при локализации</p>
----------	--	--	--	--	---	---

						соустий в головном или спинном мозге
15.2.2.3					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 450, В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: декомпенсация кровообращения пораженной конечности(яв со стойким болев синдромом, с глубоким трофическими нарушениями (длительно незаживающи язвы) кровотечениями различной интенсивности; с тяжелыми деформациями конечности, локализации соустий на открытых частях тела после лечения вторичные изменения суставах и позвоночнике (контрактуры, сколиозы дегенеративно-дистрофические изменения неврологические осложнения (тяжелые нейропатии) Выраженные нарушения функций организма при локализации соустий головном или спинном мозге сердце и легких и при различных их сочетаниях
15.2.2.4					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: декомпенсация кровообращения: обширно

					системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 450, В 710 - 799	поражение системы, тяжелые нарушения, осложнения в виде нарушения мозгового кровообращения в спинномозге с развитием параличей от отсутствием функции тазовых органов
15.3		Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания		Q30 - Q34		
15.3.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: редкие обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний (2 - 3 раза в год продолжительностью в пределах 3 недель), без дыхательной недостаточности (ДН 0) либо наличие ДН степени
15.3.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний 4 - 6 раз в год

					МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559	продолжительностью от 3 до недель; необходимость многоэтапных оперативных коррекциях, осложнении хирургических вмешательств наличие ДН II степени преходящей или постоянно легочной гипертензии (ХСН или ХСН 1 стадии)
15.3.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний 4 - 6 раз в год продолжительностью от 3 до недель; наличие осложнений (стенозы, свищи дыхательной системы), приводящие необходимости дальнейших хирургических вмешательств наличие ДН II, III степени ХСН II А стадии
15.3.4					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженные нарушения функции дыхательной системы обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний более 6 раз в год продолжительностью более

					429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559	недель; последствия осложнения оперативных вмешательств, наличие ДН II степени в сочетании с ХСН I Б или III стадии
15.4		Расщелина губы и неба		Q35 - 37		

Примечание к подпункту 15.4.

Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при челюстно-лицевых аномалиях основывается на оценке распространенности порока, возможности использования ортеза и адаптации к нему, длительности и эффективности реконструктивного оперативного лечения (восстановление анатомической целостности и взаимоотношений структур артикуляционного аппарата на этапах оперативного лечения и после последнего), на оценке нарушений функции пищеварительной системы (оценка параметров физического развития и их возрастная динамика), нарушений артикуляционной моторики (степень ограничения ее при сосании, глотании, жевании, выполнении артикуляционных движений), выраженности речевых синдромов при их наличии (ринолалия, ринофония, дислалия), а также на оценке функции других сопряженных органов (функции, функции носового дыхания).

Степень выраженности речевых синдромов (ринолалия, ринофония, дислалия, синдромы письменной речи) оценивается по заключению логопедической организации (уровень/степень общего или системного недоразвития речи). Принципы количественной оценки нарушений языковых и речевых функций указаны в подпункте 5.1.1. настоящей количественной системы оценки.

15.4.1			Расщелина неба	Q35		
			Расщелина губы	Q36		
			Расщелина неба и губы	Q37		
15.4.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщелина мягкого неба мягкого и частично (задняя треть) твердого неба; изолированная расщелина верхней губы; расщелина мягкого и твердого неба при использовании ортеза адаптации к нему

						<p>незначительное нарушение функций сосания, глотания жевания; параметры физического развития соответствуют возрасту или незначительно снижены. Незначительные нарушения языковых и речевых функций</p>
15.4.1.2					<p>Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полная расщелина твердого мягкого неба, верхней губы (одно- и двусторонняя) в период реконструктивного оперативного лечения неудовлетворительный результат оперативного лечения (грубые деформации послеоперационные изъяны твердого неба, выраженные челюстной дисбаланс, требующие повторных оперативных вмешательств и/или длительного аппаратного ортодонтического лечения умеренное нарушение функций сосания, глотания жевания; умеренное снижение параметров физического развития. Умеренные нарушения языковых речевых функций</p>
15.4.1.3					<p>Нарушения функций</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1</p>

					пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399	лет: сложные врожденные пороки развития челюстно-лицевой области в сочетании с другими аномалиями развития, с выраженными нарушениями функций организма; нарушение акта жевания с возможностью приема только протертой пищи, выраженное снижение параметров физического развития Выраженные нарушения языковых и речевых функций
--	--	--	--	--	---	--

15.5		Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		Q38 - Q45		
------	--	--	--	-----------	--	--

Примечание к подпункту 15.5.

Количественная оценка степени выраженности нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях (пороках развития) желудочно-кишечного тракта зависит от вида и локализации порока, объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения резекции и прочее) объема и видов мероприятий по реабилитации (необходимость бужирования, его частота и эффективность), степени нарушения функции анального сфинктера, наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимость повторных реконструктивных операций), характера заболевания (рестеноз - компенсированный субкомпенсированный, декомпенсированный), поражения других органов (характер, тяжесть), уровня развития ребенка.

15.5.1			Атрезия пищевода без свища	Q39.0		
			Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом	Q39.1		

			Врожденный стеноз и стриктура пищевода	Q39.3		
			Дивертикул пищевода	Q39.6		
			Другие врожденные аномалии пищевода	Q39.8		
15.5.1.1.					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенного одноэтапного оперативного вмешательства с наложением прямого анастомоза. После завершения всех этапов оперативного лечения при отсутствии затруднений приема пищи или незначительными нарушениями функций пищеварительной системы. Необходимость планового бужирования (3 и менее раз в год)
15.5.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, дыхательной системы, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: на весь период этапного хирургического реконструктивного лечения. По завершении всех этапов оперативного лечения при наличии умеренных нарушений функций пищеварительной системы дисфагия с возможностью приема только протертой

						жидкой пищи; необходимость планового бужирования (более 3 раз год). Наличие осложнений, том числе осложнении оперативного лечения, умеренными нарушениям функций организма
15.5.1.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведения первого этапа оперативного лечения (наложение гастростомы) в весь последующий период лечения, включая восстановление анатомической целостности пищевода и его проходимости; после завершения оперативного лечения (пластики пищевода) при наличии выраженных нарушений функций пищеварительной системы. Наличие осложнений, в том числе осложнении оперативного лечения, выраженными нарушениям функций организма. Рестеноз пищевода. Необходимость повторных оперативных вмешательств
15.5.2			Другие	уточненные	Q40.2	

			<p>пороки развития желудка: врожденный кардиоспазм, смещение желудка, дивертикул желудка, желудок в виде песочных часов; удвоение желудка; мегалогастрия; микрогастрия</p> <p>Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки, тощей кишки, подвздошной кишки</p> <p>Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника</p>	<p>Q41.0 - Q41.2</p> <p>Q41.8</p>		
15.5.2.1					<p>Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенного оперативного вмешательства в случаях небольшого протяженности участка резекции кишечника при физиологических параметрах физического развития или незначительных нарушениях функции пищеварительной системы</p>
15.5.2.2					<p>Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенного</p>

						оперативного вмешательства при наличии осложнения (синдром короткой кишки) умеренными нарушениями функции пищеварительной системы
15.5.2.3					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнения (синдром короткой кишки) выраженными нарушениями функции пищеварительной системы. Необходимость повторных оперативных вмешательств при наличии стомы
15.5.3			Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища (заращение прямой кишки) Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищем	Q42.0 Q42.1 Q42.2		

Примечание к подпункту 15.5.3.

Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы организма при врожденных пороках развития прямой кишки и ануса зависит от порока объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, функционирование стомы), эффективности мероприятий по

(нарушение эвакуаторной функции различной степени, объективизированного в условиях стационара), степени недостаточности анальной (объективизированной в условиях стационара), наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимости реконструктивных операций); от поражения сопряженных органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка

15.5.3.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенного реконструктивного оперативного лечения восстановлением анатомических структур аноректальной области: I степень недостаточности функции запирающего аппарата прямой кишки; Отсутствие осложнений показаний к повторному оперативному лечению
15.5.3.2					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при сложных пороках - на весь период этапного оперативного лечения последующей реабилитации. По завершении лечения - при наличии II степени недостаточности функции запирающего аппарата прямой кишки
15.5.3.3					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: с момента диагностики врожденной клоаки на весь период лечения; посл

						завершения лечения нарушение контроля функции тазовых органов. По завершении этапов оперативного лечения другие пороков - при наличии II степени недостаточности функции запирающего аппарата прямой кишки
15.5.4			Болезнь Гиршпрунга (аганглиоз, врожденный (аганглиозный мегаколон)	Q43.1		
15.5.4.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения оперативного лечения восстановление пассажа по толстой кишке; хронический запор самостоятельный стул на фоне диеты или эффективного консервативного лечения (объективизированного условия стационара); I степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная условия стационара); отсутствие осложнений
15.5.4.2					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при многоэтапном

						<p>оперативном лечении (на весь период лечения). После завершения этапного оперативного лечения отсутствие самостоятельного стула на фоне диетотерапии консервативного лечения (объективизированное в условиях стационара). II степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара)</p>
15.5.4.3					<p>Нарушение функций пищеварительной системы МКФ: В 510 - 539</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения хирургического лечения отсутствие самостоятельного стула, формирования копролитов, признаков хронической интоксикации анемии (объективизированные в условиях стационара) III степень недостаточности анального сфинктера. Энкопрез. Необходимость повторных оперативных вмешательств</p>
15.6			<p>Врожденные аномалии (пороки развития) желчного пузыря, желчных протоков и печени</p>	Q44		

			Синдром Алажилля	Q44.7		
<p>Примечание к подпункту 15.6. Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных пороках внутрипеченочных желчных протоков (атрезия, гипоплазия, удвоение, дивертикулы, эктопии протоков) и степени выраженности, варианта течения заболевания (легкое течение, умеренная выраженность симптомов холестаза, механической желтухи, гепатомегалии, симптомов портальной гипертензии, геморрагического синдрома, кишечных кровотечений и других синдромов, степени выраженности необратимых морфологических (структурных) изменений в печени (фиброз, цирроз), нарушений функций других органов и систем организма эффективности лечения.</p>						
15.6.1					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 710 - 799, В 110 - 199, В 210 - 299, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при прогрессирующем течении заболевания с умеренными нарушениями функций организма
15.6.2					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510 - 539, В 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при прогрессирующем течении заболевания с выраженной выраженностью нарушений функций организма

					429, В 710 - 799, В 110 - 199, В 210 - 299, В 610 - 639	
15.6.3					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 710 - 799, В 110 - 199, В 210 - 299, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при прогрессивном течении заболевания со значительными выраженными нарушениями функций организма
15.7		Врожденные аномалии и пороки развития мочевой системы		Q60 - Q64		

Примечание к подпункту 15.7.

Клинико-функциональная характеристика и количественная оценка агенезии и других редукционных дефектов почки, кистозной болезни почек, врожденных нарушений проходимости почечной лоханки и врожденных аномалий мочеточника, указанных в подпунктах 14.4 и 14.6 настоящей классификации, являются основой для оценки.

15.7.1			Экстрофия мочевого пузыря, частичная или тотальная эписпадия	Q64.1		
15.7.1.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: частичная эписпадия - после проведения оперативного лечения при отсутствии или

						незначительных нарушения мочевыделительной функции
15.7.1.2					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: экстрофия мочевого пузыря (тотальной эписпадией или без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения при умеренных нарушениях мочевыделительной функции
15.7.1.3					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: экстрофия мочевого пузыря (тотальной эписпадией и без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения развитием осложнений выраженными нарушениями мочевыделительной функции
15.8		Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы		Q65 - Q79		
15.8.1			Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний	Q65.0 Q65.1		

			Врожденный подвывих бедра односторонний	Q65.3		
			Врожденный подвывих бедра двухсторонний	Q65.4		

Примечание к [подпункту 15.8.1](#)

Количественная оценка степени выраженности нарушений статодинамических функций у детей с врожденными аномалиями развития тазобедренного сустава зависит от формы аномалии (врожденный вывих бедра, врожденный подвывих бедра, дисплазия: одно- или двухстороннее поражение), степени морфологических и структурных изменений в суставе (по результатам УЗИ и Rg-исследования), своевременности диагностики, длительности лечения, эффективности лечения, наличия осложнений, возникающих в период лечения (аваскулярный некроз головки бедра), наличия рецидивов, наличия компенсаторных механизмов опорно-двигательной системы, наличия и характера сопутствующей патологии.

15.8.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 3 года: при своевременной диагностике и адекватном лечении: на весь период лечения (при одностороннем вывихе, одно-двухстороннем подвывихе дисплазии тазобедренных суставов) и при сохранении достигнутого результата (вправление вывиха или подвывиха). Для детей в возрасте 4 - 14 лет: при эффективном оперативном лечении вывиха бедра (одно-двухстороннего); полное восстановление опороспособности конечности(ей); при сохранной структуре
----------	--	--	--	--	---	--

						сустава(ов); отсутствии или незначительном ограничении объема движений тазобедренном(ых) суставе(ах)
15.8.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - года: при наличии осложнений на фоне проводимого лечения рецидив патологии после начала самостоятельной ходьбы; Для детей в возрасте 4 - 1 лет: при поздней диагностике врожденного вывиха бедра на весь период лечения; наличие осложнений на фоне проводимого лечения (кроме аваскулярного некроза головки бедренной кости); наличие вторичных изменений в суставах нижних конечностей, позвоночника (артроз, остеохондроз, спондилоартроз) с умеренным нарушением их функции рецидив вывиха. Последствия проведенного оперативного лечения умеренными нарушениями статодинамических функций
15.8.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 4 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	при наличии осложнений в виде аваскулярного некроза головки бедренной кости на весь период иммобилизации; При двустороннем вывихе бедра после неэффективного лечения (отсутствии центрации головок бедренных костей в вертлужные впадины, формирования неоартрозов) с нарушением опороспособности конечностей
15.8.2			Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная плоская стопа (pes planus). Другие врожденные деформации стопы	Q66.0 Q66.1 Q66.4 Q66.5 Q66.8		

Примечание к подпункту 15.8.2.

Количественная оценка степени нарушений функций опорно-двигательной системы при одно- и двусторонней врожденной косолапости (эквinovая деформация стопы с изменениями на уровне голеностопного, подтаранного, Шопарова и Лисфранкова суставов) зависит от вида деформации (атипичная, изолированная или в структуре системных заболеваний), от степени выраженности и тяжести деформации. Также оценивается эффективность стойкость достигнутого эффекта (наличие или отсутствие рецидива, наличие патологических установок стопы), объем движений в голеностопных суставах, рентгенологических изменений в костях и суставах стопы голеностопных суставах, опороспособность (патологические изменения на подошвенной стоп(пы) в виде гиперкератоза, натоптышей); сопутствующая патология.

15.8.2.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - года: косолапость легкой и средне степени (одно- двухсторонняя) на этап консервативного лечения. Для детей в возрасте 4 - 1 лет: при условии удовлетворительного результата лечения и пр сохранении достигнутог результата по мере роста развития ребенка
15.8.2.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: неудовлетворительный результат лечения (рецидив прогрессирование деформации); нуждаемость в повторны реконструктивных операциях Врожденная двусторонняя плоско-вальгусная стоп тяжелой степени ("стопа качалка")
15.8.3			Синдактилия	Q70		
15.8.3.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: неполная простая форм синдактилии II - V пальце обеих кистей. Полная простая форм

					799	<p>синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей после завершения реконструктивного оперативного лечения.</p> <p>Другие (сложные) формы синдактилии после завершения реконструктивного оперативного лечения при условии полного восстановления или при незначительном нарушении функции кисти/кистей (схватывания и удержания)</p>
15.8.3.2					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полная простая форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей на весь период реконструктивного оперативного лечения.</p> <p>Другие (сложные) формы синдактилии на весь период реконструктивного оперативного лечения или при нарушениях основных функций кисти (схватывания и удержания)</p>
15.8.3.3					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: другие (сложные) формы синдактилии, в том числе</p>

					функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	сочетании с другим пороками развития кисти(ей) с выраженным нарушением функций кисти (схвата удержания)
15.8.4		Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность		Q71		

Примечание к подпункту 15.8.4.

Количественная оценка нарушенных функций при врожденных аномалиях верхних и нижних конечностей зависит от вида порока (фокомелия - значительное недоразвитие проксимальных отделов конечностей, вследствие чего кисти и стопы кажутся прикрепленными непосредственно к туловищу; перомелия - отсутствует конечность, от туловища отходит рудимент пальца; эктромелия - отсутствие одной конечности, двух верхних или всех верхних; гемимелия - отсутствие дистального отдела конечности при нормальном развитии проксимального), тяжести и распространенности патологии (идиопатический порок развития конечности или порок в структуре наследственного синдрома), возможности протезирования и эффективности его, степени адаптации к пороку, а при последующем протезировании - к протезу(ам). Также учитывается возраст, в котором выполнено первичное протезирование, а в дальнейшем - репротезирование.

15.8.4.1			Врожденное полное отсутствие верхней(их) конечности(ей)	Q71.0		
			Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти	Q71.1		
			Врожденное отсутствие предплечья и кисти	Q71.2		
15.8.4.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789: В 798, В	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии грубой аномалии развития одной конечности или при отсутствии кисти; при наличии культ

					799	предплечья, плеча на границе верхней и средней трети, при сохранной функции локтевого и плечевого суставов
15.8.4.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полное отсутствие одной верхней конечности; короткая культя плеча. Экзартикуляция плечевой кости с резекцией части ключицы и/или лопатки
15.8.4.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полное отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч); полное отсутствие одной недоразвитие другой верхней конечности с выраженным или значительно выраженным нарушением ее функции
15.8.4.2			Врожденное отсутствие кисти и пальца(ев)	Q71.3		
15.8.4.2.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие одного пальца (I, II, III, IV или V) кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. Сочетание двух отсутствующих пальцев

						<p>(исключая I) при сохранены пястных костях. Отсутствие I пальца одно кисти. Отсутствие дистальны фаланг пальцев кисти: I, II, III, IV, V</p>
15.8.4.2.2					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие всех фаланг пальца обеих кистей. Отсутствие всех фаланг дву пальцев, включая I палец вместе с пястными костями н одной кисти. Отсутствие всех фаланг тре пальцев, исключая I палец вместе с пястными костями н одной кисти. Отсутствие всех фаланг тре любых пальцев, включая палец. Отсутствие всех фаланг четырёх пальцев, при наличи анатомически функционально полноценног I пальца на одной кисти. Отсутствие всех фаланг пят пальцев на одной руке</p>
15.8.4.2.3					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие двух пальцев включая I палец, вместе пястными костями на обеи</p>

					МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	<p>кистях.</p> <p>Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях.</p> <p>Отсутствие всех фаланг четырех пальцев при наличии анатомически функционально полноценного I пальца на обеих кистях.</p> <p>Отсутствие всех фаланг трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях на период реконструктивно-оперативного лечения.</p> <p>Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях</p>
15.8.4.2.4					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;</p> <p>МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет:</p> <p>отсутствие всех 10 пальцев</p>
15.8.4.3			<p>Продольное укорочение лучевой кости (врожденная косорукость, лучевая косорукость)</p> <p>Продольное укорочение локтевой кости Локтевая косорукость</p>	<p>Q71.4</p> <p>Q71.5</p>		

Примечание к подпункту 15.8.4.3.

Количественная оценка нарушений функций верхней(их) конечности(ей) при косорукости зависит от варианта косорукости (полное или частичное поражение лучевой или локтевой кости на одной или двух конечностях), сохранности кисти, ее положения и функции, степени отклонения кисти в лучевую сторону, функции локтевого сустава, а также величины анатомического укорочения сегмента конечности.

15.8.4.3.1					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при одностороннем двустороннем поражении: лучевая косорукость I степени, I тип кисти; локтевая косорукость I степени; незначительное нарушение функции кисти и сустава верхней конечности</p>
15.8.4.3.2					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при одностороннем двустороннем поражении: лучевая косорукость I степени, II тип кисти; локтевая косорукость I степени; умеренное нарушение функции кисти и сустава верхней конечности. Сочетание косорукости I степени с нормальной кистью на доминантной конечности лучевой косорукости I степени со II типом кисти и локтевой косорукостью I степени на контрлатеральной конечности. Лучевая косорукость II</p>

						степени, III тип кисти локтевая косоруконость II степени, выраженное нарушение функции кисти суставов верхней конечности
15.8.4.3.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Двусторонняя лучево-локтевая косоруконость III степени, II тип кисти; локтево-плечевая косоруконость III степени выраженное нарушение функции кистей и суставов верхней конечности
15.8.4.3.4			Клешнеобразная кисть Врожденное расщепление стопы	Q71.6 Q72.7		
15.8.4.4.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 78, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Клешнеобразные кисти. Клешнеобразные стопы при отсутствии опороспособности на период ортезирования приобретения навыка стояния и ходьбы
15.8.4.4.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 78, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сочетание двух клешнеобразных кистей выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов с двумя

						клевнеобразными стопами нарушением опороспособности
15.8.5		Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность		Q72		
15.8.5.1			Врожденное полное отсутствие нижней(их) конечности(ей)	Q72.0		
			Врожденное отсутствие бедр и голени при наличии стопы (фокомелия)	Q72.1		
			Врожденное отсутствие голени и стопы	Q72.2		
			Продольное укорочение бедренной кости	Q72.4		
			Продольное укорочение большеберцовой кости	Q72.5		
			Продольное укорочение малоберцовой кости	Q72.6		
15.8.5.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 5 лет врожденное укорочение любого сегмента и все нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению с здоровой) при отсутствии других аномалий конечности.

						Дети в возрасте 6 - 17 лет: при анатомическом укорочении до 6 см., функциональном - до 10 см.
15.8.5.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии аномалии развития одной конечности (отсутствие стопы, культя голени на границе верхней и средней трети при сохранности функции коленного тазобедренного суставов). Протезированная культя бедра одной конечности на границе верхней и средней трети голени. Отсутствие обеих стоп на уровне костей предплюсны (уровень сустава Шопара). Врожденное укорочение любого сегмента и всей нижней конечности в целом более чем на 3 см в возрасте до 3 года, более чем на 6 см в возрастном периоде 6 - 17 лет (по сравнению со здоровой конечностью при отсутствии других аномалий конечности). Иное сочетание аномалии развития конечностей умеренным нарушением статодинамических функций
15.8.5.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					<p>и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p>	<p>при наличии аномалии развития двух конечностей отсутствие стоп с костями предплюсны, культы голени на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов после эффективного протезирования приобретения навыка стояния и ходьбы на протезах. Культы обеих голени при двустороннем порочном положении культы на период реконструктивного лечения протезирования. Кухля бедра одной конечности на границе верхней и средней трети при сохранной функции тазобедренного сустава на период протезирования либо при наличии медицинских противопоказаний протезированию. Аномалия развития одной верхней и одной нижней конечности до уровня верхней трети плеча и до границ верхней трети бедра. Аплазия одного из сегментов конечности с нарушением функции смежных суставов на период реконструктивного оперативного лечения протезирования.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Иное сочетание аномалии развития конечностей выраженным нарушением статодинамических функций
15.8.5.1.4					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: культя обеих бедер и голени на любом уровне на период протезирования и адаптации протезам. Короткая культя обеих бедер при наличии медицинских противопоказаний протезированию. Сочетание с другими аномалиями развития конечностей со значительным выраженным нарушением статодинамических функций
15.8.5.2			Врожденное отсутствие стопы и пальца(ев) стопы	Q72.3		
15.8.5.2.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789: В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие всех фаланг пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранением плюсневых костей. Отсутствие пальцев до уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны
15.8.5.2.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие пальцев вместе

					(статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	плюсневыми костями с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа (до возраста 7 лет). Отсутствие пальцев вместе плюсневыми костями с обеих сторон у детей любого возраста
15.8.5.3			Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей) (врожденный лучелоктевой синостоз)	Q74.0		
15.8.5.3.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации пронации в функционально выгодном диапазоне (от 50 - 60° до 150 - 160°) либо анкилоз в среднем положении между пронацией супинацией (около 90 градусов)
15.8.5.3.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789: В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации менее 50 - 60°; либо анкилоз функционально невыгодном положении

15.8.5.4			Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей). Деформация Шпренгеля	Q74.0		
15.8.5.4.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: мышечная форма болезни незначительным нарушением функции плечевого сустава при эффективном консервативного лечения; отсутствие сочетания другими аномалиями развития конечностей или их наличие незначительным нарушением функции пораженного сегмента(ов)
15.8.5.4.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенного оперативного лечения умеренным нарушением функции плечевого сустава в сочетании с другими аномалиями развития конечностей с умеренным нарушением функции пораженного сегмента(ов). После проведенного оперативного лечения выраженным нарушением функции плечевого сустава. При наличии осложнения оперативного лечения, в том

						числе с повреждением плечевого сплетения
15.8.5.5			Врожденные аномалии позвоночника и костей грудной клетки (врожденный спондилолистез)	Q76.2.		

Примечание к подпункту 15.8.5.5

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при спондилолистезе основывается на оценке его стабильности, наличии неврологических осложнений, а также нуждаемости в оперативном лечении и оценке его эффективности.

15.8.5.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спондилолистез I и II степени стабильный, без неврологической симптоматики. Отсутствие сочетания со спондилолизом. Спондилолистез III и IV степени после эффективного оперативного лечения незначительным ограничением подвижности позвоночника
15.8.5.5.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спондилолистез любой степени с наличием неврологических осложнений с умеренными нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения

15.8.5.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спондилолистез любой степени с наличием неврологических осложнений с выраженными нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения
15.8.5.6			Другие пороки развития костно-мышечной системы (синдром Поланда)	Q79.8		
15.8.5.6.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гипоплазия и аплазия большой грудной мышцы, отсутствие деформации или незначительная деформация грудной клетки, отсутствие нарушений или незначительные нарушения функции органов грудной клетки
15.8.5.6.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: левосторонняя аплазия большой грудной мышцы, отсутствие ребер слева с значительной деформацией грудной клетки с умеренными нарушениями функции

						органов грудной клетки. Сочетание с другим аномалиями развития конечности с нарушением функции хвата и удержания предметов
15.8.6			Врожденный множественный артрогрипоз	Q74.3		

Примечание к подпункту 15.8.6.

Количественная оценка нарушенных функций при артрогрипозе определяется степенью деформаций и укорочений верхних и нижних конечностей, выраженностью контрактур крупных суставов, приводящих к нарушению опоры и передвижения, нарушению основных функций кисти. Учитываются также врожденные аномалии развития или метаболические нарушения, симптомы поражения ЦНС.

15.8.6.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: дистальная форма артрогрипоза с умеренным нарушением функции хвата и удержания обеих кистей, умеренным нарушением функции стояния и ходьбы. Генерализованная форма артрогрипоза с наличием умеренных контрактур суставов конечностей
15.8.6.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: формирование выраженных контрактур крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении двусторонняя косолапость

						косорукость, полный высокий двусторонний вывих бедра выраженными нарушениями статодинамических функций. Генерализованная форма артрогрипоза с выраженными нарушениями статодинамических функций
15.8.6.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: формирование анкилозов крупных суставах верхних и нижних конечностей функционально невыгодном положении со значительными выраженными нарушениями статодинамических функций. Генерализованная форма артрогрипоза со значительными выраженными нарушениями статодинамических функций
15.8.7			Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника Ахондрогенезия Точечная хондродисплазия Ахондроплазия Дистрофическая дисплазия	Q78.0 Q77.0 Q77.3 Q77.4 Q77.5		

			Хондрэктодермальная дисплазия	Q77.6		
			Спондилоэпифизарная дисплазия	Q77.7		
			Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба	Q77.8		
			Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная	Q77.9		

Примечание к подпункту 15.8.7

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушенных функций организма, обусловленных группой врожденных наследственных костно-мышечной системы, сопровождающиеся системным поражением скелета - остеохондродисплазиями, включая формы с дефектами роста тру и позвоночника проводится с учетом:

- множественности\комбинации поражения костно-мышечной системы, включая выраженность черепно-лицевого дисморфизма; наличия стой синдрома; нарушение походки; ограничения движений в суставах вследствие контрактур (от умеренной до выраженной степени); степень укорочения; наличия прогрессирующих деформаций с нарушением функциональности конечности с формированием ее функционально невыгодно быстрота прогрессирования деформаций костной системы, мобильность\фиксированность; наличие неврологических осложнений, сенсорны заинтересованности зон роста, риски патологических переломов или их наличие с учетом частоты за календарный год; частота хирургическо прогрессирующем пролиферативном процессе костной ткани.

15.8.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: медленно прогрессирующа деформация костной системь отставание в росте (SDS рост - 1 - 3); укорочение длин конечности до 30% от длин сегмента у детей раннег
----------	--	--	--	--	---	---

					<p>иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439</p>	<p>возраста, у детей школьного возраста - до 4,0 см ограничение объема активны движений в суставах конечностей без нарушени функции схвата и удержани предметов незначительно степени с функциональн выгодным положением конечности с возможностью коррекции деформации/укорочения помощью малосложно ортопедической обуви незначительное ограничени подвижности без стойког болевого синдрома, незначительным нарушением функций конечностей.</p>
15.8.7.2					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующая деформация костной системы отставание в росте (SDS рост - 4); укорочение длины конечности более 30% (д 50%) от длины сегмент конечности у детей раннег возраста, у детей школьног возраста - на 4,0 - 7,0 см ограничение объема активны движений в суставах верхни и/или нижних конечностей умеренной степени пр наличии патологическо</p>

						<p>деформации конечности затрудняющих схват удержание предметов, опору передвижение пр невозможности коррекции деформации/укорочения помощью малосложно ортопедической обувью ограничение подвижност позвоночника с быстры прогрессированием деформации (более 7 градусо за год), ее мобильность, с стойким болевым синдромом возможно, с умеренны парезом конечности (3 балла)</p>
15.8.7.3					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: быстро прогрессирующая деформация костной системы отставание в росте (SDS рост - более 4); укорочение длины конечности более 50% от длины сегмента, у дете школьного возраст укорочение конечности боле 7,0 см; ограничение объем активных движений суставах верхних и\ил нижних конечностях выраженной степени, наличи стойких контрактур затрудняющих схват удержание предметов, опору передвижение (пр</p>

						двустороннем поражении выраженная деформация позвоночника со стойкими болевым синдромом.
15.8.7.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: множественные грубые деформации скелета с стойкими выраженным контрактурами в порочном положении конечностей невозможностью самостоятельного схвата удержания предметов, опоры и передвижения.
15.8.8			Другие остеохондродисплазии	Q78.0		
			Незавершенный остеогенез	Q78.0		
			Полиостозная фиброзная дисплазия	Q78.1		
			Остеопетроз	Q78.2		
			Прогрессирующая диафизарная дисплазия	Q78.3		
			Энхондроматоз	Q78.4		
			Метафизарная дисплазия	Q78.5		
			Множественные врожденные экзостозы	Q78.6		

			Другие уточненные остеохондродисплазии	Q78.8		
			Остеохондродисплазия неуточненная	Q78.9		

Примечание к [подпункту 15.8.8](#)

Количественная оценка нарушенных функций при незавершенном остеогенезе зависит от частоты и тяжести переломов костей различной локализации и степени деформации длинных трубчатых костей и позвоночника; от нарушения функции суставов (нестабильность, наличие контрактур), наличия снижения слуха; от нарушения функции органов брюшной полости при наличии грыж передней брюшной стенки.

15.8.8.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или незначительные (менее 1 градусов) деформации осей конечности или позвоночника без нарушения или незначительным нарушением их функций. Отсутствие или незначительное отставание физическом развитии. Z критерий по данным денситометрии -1,0. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
15.8.8.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: переломы длинных трубчатых костей. Консолидация перелома(ов) деформацией оси конечности

					сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639	более 10°, но менее 20°, укорочением конечности; деформация оси позвоночника (сколиоз или кифоз 2 или 3 ст) с умеренным нарушением функций. Умеренное отставание физического развития. Z критерий по данным денситометрии - 1,0 - 2,5 Умеренные нарушения функции организма
15.8.8.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия повторных переломов длинных трубчатых костей выраженными нарушениями статодинамических функций. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, деформация оси позвоночника с выраженным нарушением его функции. Выраженное отставание физического развития. Выраженные нарушения функций организма. Z критерий по данным денситометрии < -2,5 наличием повторных переломов длинных трубчатых костей

15.8.8.4					<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: повторные переломы длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках. Наличие множественных металлических конструкций после проведенных операций. Выраженные деформации конечностей, требующие оперативного лечения. Значительно выраженные нарушения функции суставов конечностей (нестабильность до степени разболтанности контрактуры). Значительно выраженная задержка физического развития. Значительные нарушения функции организма. Z критерий по данным денситометрии < -2,5</p>
15.9		<p>Другие врожденные аномалии</p> <p>Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках</p>		<p>Q80 - Q89</p> <p>Q90 - Q99</p>		

Примечание к подпункту 15.9.

Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при других врожденных и хромосомных аномалиях, не классифицированных в других рубриках, зависит от характера аномалии, клинико-функциональных проявлений (клинического полиморфизма симптоматики) - нарушения слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем, от степени выраженности неврологического дефицита; наличия когнитивного интеллектуального снижения, судорожных пароксизмов (их вида, частоты, тяжести) и других нарушений, прогрессивности течения заболевания, также клинический прогноз, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, наличие осложнений.

15.9.1			<p>Факоматозы, не классифицированные в других рубриках (болезнь Реклингхаузена, туберозный склероз, болезнь Бурневилля, эпилепсия; болезнь Пейтца-Егерса, Страджа-Вебера, Гиппеля-Ландау)</p> <p>Другие уточненные синдромы врожденных аномалий (пороков развития), затрагивающих несколько систем (синдром Аперта, синдром Гольденхара; Мебиуса; Робена; синдром Прадера-Вилли; Рассела-Сильвера; синдром Холта-Орама, Рубинштейна-Тейби; Беквита-Видемана; Сотоса, Уивера, Синдром Марфана, синдром Альпорта, Лоренса-Муна-Бидля, Зелвегера и другие синдромы)</p>	<p>Q85</p> <p>Q87</p>		
--------	--	--	--	-----------------------	--	--

			<p>Синдром Дауна Q90</p> <p>Синдром Эдвардса и синдром Патау Q91</p> <p>Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках (несбалансированные транслокации и инсерции) Q92</p> <p>Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках Q93</p> <p>Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные в других рубриках Q95</p> <p>Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках Q99</p>		
15.9.1.1					<p>Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p> <p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессивное течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией при наличии незначительных нарушений функций</p>

					<p>функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>организма, в том числе: 0 - 3 года - незначительная задержка физического психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - незначительное когнитивное снижение отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта - 4 - 15 лет: IQ 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов незначительные нарушения устной и письменной речи</p>
15.9.1.2					<p>Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогредиентное течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией при наличии умеренных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года - умеренная задержка физического психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - умеренное когнитивное снижение умеренное снижение интеллекта - 4 - 15 лет: IQ 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов; умеренные</p>

						нарушения устной письменной речи
15.9.1.3					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессивное течение заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапией при наличии выраженных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года - выраженная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - наличие выраженного когнитивного снижения, выраженное снижение интеллекта (IQ = 3 - 49 баллов); выраженные нарушения устной письменной речи. Нарушение контроля функций тазовых органов
15.9.1.4					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессивное течение заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапией при наличии значительн

					<p>пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p>	<p>выраженных нарушений функций организма: 0 - 3 года - значительная выраженная задержка физического, психомоторного речевого развития, отсутствия формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - значительное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов), отсутствие устной письменной речи. Отсутствие контроля функций тазовых органов</p>
16	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI)			S00 - T98		
16.1		Термические и химические ожоги глаза и других		T26 - T28		

		внутренних органов				
16.1.1			Термический ожог пищевода	T28.1		
			Химический ожог пищевода	T28.6		

Примечание к подпункту 16.1.1.

При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций при ожогах пищевода необходимо учитывать вид ожога (термический, химический: кислотой, щелочью - более тяжелые), степень ожога, распространенность ожога, длительность и эффективность бужирования и его осложнения (степень рубцового сужения пищевода), необходимость оперативного лечения, объем его, исход, наличие осложнений.

16.1.1.1					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода I или II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тела
16.1.1.2					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования. Наличие искусственного пищевода с умеренными нарушениями функции пищеварительной системы

16.1.1.3					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени и выпячиванием (декомпенсация) нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие осложнений (свищи) с выраженными нарушениями функций организма
16.1.1.4					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяжелые последствия болезни неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств
16.1.2		Последствия термических и химических ожогов и отморожений		T95		
16.1.2.1			Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи	T95.0		
			Последствия	T95.1		

			термического и химического ожога и отморожения туловища			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности	T95.2		
			Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности	T95.3		

Примечание к подпункту 16.1.2.1.

При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при термических т локализации необходимо учитывать степень, площадь и локализацию ожога (отморожения); поражение других органов - верхних дыхательных пут объем лечения (консервативное, реконструктивное хирургическое, косметические операции) и его эффективность (приживление трансплант восстановленного кожного покрова), качество образовавшихся рубцов (поверхностные, глубокие, плоские, келлоидные, их растяжимость ил формирование контрактур суставов, кисти и их степень, наличие косметического дефекта, показания для реконструктивно-пластических опер нарушения функций организма подробно изложены в соответствующих разделах.

16.1.2.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия термически поражений III степени н ограниченных участка туловища и конечностей вовлечением одного-дву смежных суставов ("стягивающие рубцы") формированием умеренно контрактур в функциональн выгодном положении
------------	--	--	--	--	--	--

					299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899	
16.1.2.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия термически поражений III степени вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений умеренными нарушениями функций организма
16.1.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия термически поражений III степени вовлечением 2 и более суставов ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраженных контрактур и/или анкилозов функционально невыгодном положении. Наличие осложнений выраженными нарушениями функций организма

					639, В 810 - 899	
16.1.2.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия распространенных термических поражений П степени и вид множественных порочных установок крупных суставов ригидных деформации скелета. Наличие осложнений с значительно выраженными нарушениями функций организма
16.2		Последствия травм головы		T90		
16.2.1			Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.1 T90.2		
16.2.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: дефект костей череп размером 3 x 3 см и менее пластикой и без нее
16.2.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	дефект костей череп размером более 3 х 3 см при наличии пульсации ТМО области дефекта
16.2.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительный дефект костей черепа размером 10 х 10 см и более
16.3		Последствия травм шеи и туловища		T91		
16.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия неосложненных переломов позвоночника незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника)
16.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия осложненных переломов позвоночника наличием неврологической симптоматики, достигающе

					функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539	умеренной степени. Нестабильность металлоконструкции любой протяженности после проведенного оперативного лечения
16.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия осложненных переломов позвоночника выраженной неврологической симптоматикой
16.3.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия осложненных переломов позвоночника полным анатомическим прерыванием спинного мозга со значительно выраженной неврологической симптоматикой, нарушение функции тазовых органов
16.4		Родовая травма периферической нервной системы		P14		

Примечание к подпункту 16.4.

При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при родовой травме периферической нервной системы необходимо учитывать вид пареза (Эрба-Дюшена - проксимальный паралич верхней конечности, Дежер...

дистальный парез верхней конечности, тотальный парез), степень двигательных нарушений (преимущественно при параличе Эрба-Дюшана патологической установки; степень нарушения функции кисти (схват и удержание предметов)

16.4.1			Паралич Эрба-Дюшана при родовой травме Паралич Дежерин-Клюмпке при родовой травме	P14.1 P14.2		
16.4.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие патологически установок конечности незначительное ограничение движений в плечевом и локтевом суставах, вследствие контрактуры или пареза (снижение силы мышц до баллов), сохранной основной функции кисти
16.4.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренный вялый парез доминантной конечности (снижение силы мышц до баллов в проксимальном, до баллов в дистальном отделах) с ограничением объема активных движений укорочением конечности (более 7 см) с нарушением схвата и удержания предметов
16.4.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	отсутствие движений в любой верхней конечности (плегия) полным отсутствием функции конечности
16.5			Травмы, захватывающие несколько областей тела. Последствия травм верхней конечности Последствия травм нижней конечности Последствия травм, захватывающие несколько областей тела	T00 - T07 T92 T93 T94		
16.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти. Отсутствие I пальца одной кисти на любом уровне; в том числе с пястной костью. Функциональное укорочение верхней конечности до 7 см (по сравнению со здоровой) вследствие различных причин без нарушения функции крупных суставов конечностей, без нарушения функции кисти (схвата и удержания). Функциональное укорочение любого сегмента или все

						<p>нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению с здоровой) в результате неправильно сросшихся переломов.</p> <p>Незначительные (менее 10°) деформации оси конечности в результате неправильно сросшегося перелома длинных трубчатых костей без нарушения или незначительным нарушением их функций.</p> <p>Отсутствие одного или двух пальцев (любых) одной стопы или обеих стоп на любом уровне.</p> <p>Отсутствие пальцев обеих стоп или одной стопы сохранными плюсневыми костями.</p> <p>Отсутствие всех пальцев дорсального уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны.</p> <p>Анкилоз одного сустава функционально выгодном положении.</p> <p>Эндопротез одного тазобедренного или одного коленного сустава (при правильном его положении стабильности всех компонентов).</p> <p>Последствия изолированных переломов костей таза без</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>нарушения целостности тазового кольца. Любые иные последствия травм конечностей различного их сочетании незначительными нарушениями статодинамических функций организма</p>
16.5.2					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Отсутствие I пальца на обеих кистях Отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе пястными костями. Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе пястными костями. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, при наличии пястных костей на одной кисти. Отсутствие всех четырех пальцев на любом уровне на одной кисти при сохранении пястных костей и наличии анатомически функционально полноценного I пальца. Отсутствие сегмента(ов) верхней конечности (кисти предплечья на границе верхней и средней трети) при сохранной функции локтевого</p>

						<p>и плечевого суставов.</p> <p>Отсутствие сегмента(ов) нижней конечности (стопа голени на границе верхней средней трети) при сохранности функции коленного тазобедренного суставов.</p> <p>Отсутствие стопы на уровне костей предплюсны с обеих сторон у детей любого возраста.</p> <p>Отсутствие стопы на уровне костей предплюсны или на уровне нижней трети плюсневых костей с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа.</p> <p>Протезированная культя бедра одной конечности при сохранности функции тазобедренного сустава (при хорошей адаптации к протезу и приобретении навыков ходьбы на нем) с уровнем двигательной активности или выше.</p> <p>Укорочение нижней конечности в целом на 4 см более (по сравнению с здоровой) или деформация оси конечности более 10°, не менее 20° с умеренными нарушениями их функций</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>результате неправильных сросшихся переломов. Анкилоз одного сустава функционально невыгодном положении. Эндопротез тазобедренных или двух коленных суставов эндопротез тазобедренного сустава на одной конечности и эндопротез коленного сустава на другой конечности (при правильном положении и стабильности всех компонентов). Последствия переломов костей таза с нарушением целостности тазового кольца повреждением крестцово-подвздошного сочленения неврологическими осложнениями (с умеренным парапарезом, монопарезом выраженным проксимальных, умеренным дистальных отделах нижней конечности); Любые иные последствия травм конечностей различного их сочетании умеренным нарушением статодинамических функций организма</p>
16.5.3					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					<p>и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799</p>	<p>Отсутствие двух пальцев включая I палец, вместе пястными костями на обеих кистях.</p> <p>Отсутствие трех пальцев исключая I палец, вместе пястными костями на обеих кистях.</p> <p>Отсутствие четырех пальцев на обеих кистях на уровне головок пястных костей при наличии анатомически функционально полноценного I пальца;</p> <p>Короткая культя плеча экзартикуляция на уровне плечевого сустава при сложности или невозможности протезирования; на период протезирования и адаптации к протезу.</p> <p>Культи обеих голени на границе верхней и средней трети на период протезирования и адаптации к протезам.</p> <p>Культи бедра одной конечности на период протезирования и адаптации к протезу.</p> <p>Культи одной верхней и одной нижней конечностей на период протезирования и адаптации к протезу.</p> <p>Любые иные последствия</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>травм конечностей различном их сочетании выраженным нарушением статодинамических функций организма</p>
16.5.4					<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие трех пальцев пястными костями, включая палец, на обеих кистях. Отсутствие всех пальцев на обеих кистях. Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (обеих кистей, предплечий, обоих плеч); Отсутствие обеих голеней при двустороннем функционально невыгодном положении культи на период реконструктивного оперативного лечения протезирования. Культы обеих бедер на любом уровне на период протезирования и адаптации протезам. Короткая культя обеих бедер при наличии медицинских противопоказаний протезированию. Отсутствие трех конечностей на любом уровне в различных сочетаниях. Любые иные последствия</p>

						травм конечностей различном их сочетании с значительно выраженным нарушением статодинамических функций организма
--	--	--	--	--	--	---
